

## Beiträge zur Käferfauna des westfälisch-lippischen Weserberglandes

⟨Adephaga: II. Teil, Polyphaga: Staphyloidea⟩

---

Von Korv.-Kapt. ⟨Ing.⟩ a.D. Fr. Peetz-Pr. Oldendorf, Westfl.

Die vorliegende Arbeit ist das Sammelergebnis eines Zeitraumes von etwa 30 Jahren (1900—1930). Sie umfaßt das Gesamtgebiet der *Coleoptera*. Infolge ihres Umfanges kann bei dem zur Verfügung stehenden Raume jährlich nur ein Abschnitt gebracht werden. Dieser erste Beitrag enthält den zweiten Teil der *Adephaga*, echte Wasserkäfer (*Dytiscidae*, *Haliplidae*, *Gyrinidae*) und aus der Abteilung der *Polyphaga* die Familienreihe der *Staphyloidea*. Die Bearbeitung der fehlenden Familien *Cicindelae* und *Carabidae* hat Herr Hauptlehrer K. Barner, Eickum, übernommen, der sich schon seit Jahren auf das Studium dieser beiden Familien spezialisiert hat.

Das Sammelgebiet umfaßt das lippisch-westfälische Weserbergland mit etwa folgenden Begrenzungen: im Norden die Verbindungslinie zwischen Steinhuder Meer und Dümmersee, im Westen die Linie vom Dümmersee bis etwa Gütersloh, im Süden eine Linie von Gütersloh über Horn und Blomberg bis Pymont und von dort im Osten die Linie bis zum Steinhuder Meer. Dieses Gebiet wird durchzogen vom Teutoburger Wald, dem Weser- und Wiehengebirge mit seinen Ausläufern und enthält viele charakteristische Fundorte, wie z. B. das alluviale Werretal, die Herforder Liasmulde, das „Große Moor“ bei Nettelstedt, das Gebiet des Dümmersee mit der Hunte, das Steinhuder Meer, die Senne bei Bielefeld und das Hochmoor bei Hiddesen (Hiddeser Bent). Es wird von der Weser mit ihren Nebenflüssen durchflossen, von denen die Werre mit Else, die Bastau, die Osper und Aue besonders genannt seien.

Die aufgeführten Funde stützen sich in erster Linie auf die reichhaltige, mir zur Verfügung stehende Sammlung des Herrn K. Barner. Diese Sammlung wurde von Herrn Barner und den Herren Musikdirektor Schwier, seiner Zeit Petershagen und Lehrer Büsching, Eldagsen, zusammengebracht. Dem Wohnsitze dieser Herren entsprechend stammen die meisten Funde aus der Gegend von Petershagen, Mennighüffen, Löhne und Eickum bei Herford. Die in den „Beiträgen zur Käferfauna des westfälisch-lippischen Weserberglandes von K. Barner“, welche im Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Bielefeld 1922 veröffentlicht wurde, angeführten Fundorte sind auch in vorliegender Arbeit berücksichtigt. Verfasser dieses sammelte in den letzten 10 Jahren hauptsächlich in der Umgebung seines Wohnsitzes Pr. Oldendorf, Kr. Lübbecke.

Die Bestimmung der Tiere habe ich mit der größtmöglichen Genauigkeit vorgenommen bzw. nachgeprüft und nur solche Funde aufgenommen, für welche Belegexemplare in meiner Sammlung vorhanden sind. Zweifelhafte, insbesondere bei der sehr schwierigen Familie der *Aleocharinae*, habe ich zurückgestellt. Die von Herrn Pfarrer Hubental bestimmten Tiere der Sammlung Barner habe ich durch: „(Hub)“ gekennzeichnet. Die Aufführung der Familien folgt der *Fauna Germanica* von Reitter.

Für häufig wiederkehrende Fundorte benutze ich folgende Abkürzungen: Pthg = Petershagen, Mghf = Mennighüffen, Eick = Eickum bei Herford, PrOld = Pr. Oldendorf am Wiehengebirge, Kr. Lübbecke. Die aus der Sammlung Barner (Schwier, Büsching) stammenden Funde sind durch vorgesetztes „Ba:“ gekennzeichnet.

### III. Familie: Haliplidae

#### *Haliphus* Latr.

*conjinis* Steph.

Dümmersee b. Hüde.

*fulvus* F.

Gevinghausen b. Bünde; i. Fischteich.

*flavicollis* Strm.

Bünde, i. d. Else.

*fulvicollis* Er.

Dümmersee b. Hüde; Großes Moor b. Nettelstedt.

*rujicollis* v. Heydeni

Wehnke

Bünde, Gevinghauser Fischteich.

*fluvialilis* Aubé

Bünde, i. d. Else; Nettelstedter Moor.

— *a. striatus* Sharp

Dümmersee b. Lembruch.

— *v. Wehnkei* Gerh.

Bünde, Else b. Hunnebrock.

*immaculatus* Gerh.

Dümmersee b. Lembruch.

*lineatocollis* Mrsh.

Ba: Pthg (Schwier).

#### *Cnemidotus* Illig.

*caesus* Dft.

Bünde, Gevinghauser Fischteich.

### V. Familie: Dytiscidae

#### *Hyphydrus* Illig.

*ferrugineus* L.

Stift Quernheim, sumpfiger Teich; Werffen b. Bünde; Dümmersee b. Lembruch; Nettelstedter Moor, Moorteich.

#### *Hygrotus* Stephens.

*inaequalis* F.

Werffen b. Bünde; Dümmersee b. Lembruch u. Hüde; Nettelstedter Moor, Moorteich.

*impressopunctatus* Schall.

Ba: Teutob. Wald.

#### *Hydroporus* Clairville.

*pictus* F.

Bünde, Stift Quernheim, Else b. Hunnebrock.

*flavipes* Oliv.

Ba: Pthg.

*platynolus* Grm.

Ba: Brackwede b. Bielefeld.

*elegans* Panz.

Bünde, Gevinghauser Fischteich, Else b. Hunnebrock.

- duodecimpustulatus* F. Bünde, Stift Quernheim u. i. d. Else, nicht selt.  
*halensis* F. Ba: Pthg (Schwier).  
*lineatus* F. Ba: Pthg (Schwier); Dümmersee b. Hüde.  
*palustris* L. überall häufig.  
*notatus* Strm. Bünde, Stift Quernheim.  
*piceus* Steph. Bünde, Stift Quernheim.  
*melanocephalus* Gyll. Bünde, Stift Quernheim; Ba: Mghf.  
*tristis* Payk. Ba: Pthg (Schwier).  
*elongatulus* Strm. Ba: Pthg (Schwier).  
*obscurus* Strm. Bünde, Gevinghauser Fischteich; Großes Moor b. Nettelstedt.  
Ba: Pthg (Schwier).  
*erythrocephalus* L. Bünde, i. d. Else; Hiddeser Bent; Großes Moor b.  
*fuscipennis* Schaum. Nettelstedt; Ba: Mghf.  
Ba: Pthg (Schwier).  
*planus* F. PrOld; Ba: Brackwede b. Bielefeld.  
*pubescens* Gyll. Ba: Mghf.  
*ferrugineus* Stephens Bünde, i. d. Else.
- Noterus Claiv.**  
*crassicornis* Müll. Bünde, i. d. Else; Nettelstedter Moor.
- Laccophilus Leach.**  
*obscurus* Panz. Bünde, Gevinghauser Fischteich.  
*hyalinus* Degeer Werffen u. Gevinghausen b. Bünde u. i. d. Else.
- Agabus Leach.**  
*bipustulatus* L. Bünde, i. d. Else u. Gevinghauser Fischteich.  
*melanarius* Aubé Ba: Pthg, Weser.  
*Sturmi* Gyll. Stift Quernheim; Hiddeser Bent.  
*guttatus* Payk. Ba: Weserkette, Schneegrund.  
*undulatus* Schrank. Stift Quernheim; Ba: Pthg.  
*affinis* Payk. PrOld.  
*unguicularis* Thoms. Ba: Mghf.  
*paludosus* F. Ba: Pthg (Schwier).  
*congener* Payk. Ba: Pthg (Schwier).
- Platambus Thoms.**  
*maculatus* L. Bünde, Spradower Bach u. Else; Ba: Eick; Mghf.  
— v. *inaequalis* Ba: Mghf.
- Copelatus Erichs.**  
*rujicollis* Schall. Ba: Pthg (Schwier).
- Illybius Erichs.**  
*juliginosus* F. Bünde, i. d. Else u. Gevinghauser Fischteich.  
*gutliger* Gyll. Ba: Pthg (Schwier).  
*ater* Degeer überall nicht selten.  
*fenestratus* F. Ba: Pthg (Schwier).  
*subaenaeus* Er. Donoper Teich b. Detmold; Bünde, i. d. Else.
- Rhantus Lacord.**  
*punctatus* Geoffr. Ba: Pthg (Schwier).  
*bistriatus* Er. Bünde, Else b. Hunnebrock.

*Colymbetes Clairville.*

*fuscus* L.

Bünde, Else u. Gevinghauser Fischteich; PrOld;  
Dümmersee b. Hüde.

*striatus* L.

Bünde, Spradower Bach; Ba: Eick.

*Acilius Leach.*

*sulcatus* L.

überall häufig.

*canaliculatus* Nicol.

Ba: Pthg (Schwier).

*Dytiscus Lin.*

*latissimus* L.

Rietberg i. W., einmal im Jan. 1887 unter dem Eise  
der Torfstiche der Emsniederung sehr zahlreich;  
Ba: in der Düpe b. Pthg, 1898/99 u. 1900 unter dem  
Eise zahlreich, sonst selten.

*punctulatus* F.

Bünde, Stift Quernheim, in Fischteichen; PrOld.

*dimidiatus* Bergst.

PrOld.

*marginalis* L.

überall häufig.

*circumcinctus* F.

Werffen b. Bünde u. i. d. Else; PrOld.

*Cybister Curtis.*

*laterimarginalis* Degeer

Rietberg i. W., im Gebiet im allgem. selten.

VI. Familie: Gyrinidae

*Aulogyrinus Regimb.*

*concinus* Klug.

Bünde, i. d. Else sehr häufig.

*Gyrinus Lin.*

*marinus* Gyll.

Bünde, i. d. Else u. überall häufig.

— *v. opacus*

Bünde, i. d. Else.

*natator* L.

Rödinghausen a. Wiehengeb.; Nettelstedter Moor.

*Orectochilus Lacord.*

*villosus* Müll.

Bünde, i. d. Else; Weserufer b. Porta, unter Steinen,  
sehr zahlreich.

II. Polyphaga

1. Familienreihe: Staphylinoidea

1. Familie: Staphylinidae

1. Unterfamilie: Aleocharinae

*Ocalea Er.*

*badia* Er.

PrOld.

*picata* Steph.

PrOld, gesiebt.

*Illyobates Kr.*

*propinquus* Aubé

Ba: Eick.

*Chilopora Kraatz.*

*longitarsis* Er.

PrOld.

*rubicunda* Er.

PrOld.

- Phloeopora Er.*  
*testacea Mnnh.* PrOld.
- Aleochara Grav.*  
*curtula Goeze.* Ba: Polle, Weserufer; Eick; Pthg.  
*brevipennis Grav.* Hiddeser Bent.  
*languinosa Grav.* Ba: Schnathorst.  
*spadicea Er.* Hunteburg, Bachufer.
- Ocyusa Kraatz.*  
*incrassata Rey.* Ba: Mghf, gesiebt (Hub).
- Ischnoglossa Kr.*  
*prolixa Grav.* Ba: Mghf, gesiebt (Hub).
- Euryalia Rey.*  
*decumana Er.* Doberg b. Bünde.
- Oxypoda Mnnh.*  
*spectabilis Maerkel* PrOld, i. Maulwurfsnest; Ba: Eldagsen.  
*lividipennis Mnnh.* PrOld, i. Maulwurfsnest u. i. Compost.  
*opaca Grav.* PrOld; Ba: Mghf, Langenhagen.  
*elongatula Aubé* PrOld.  
*sericea Heer* PrOld; Doberg b. Bünde.  
*exigua Er.* PrOld.  
*alternans Grav.* PrOld, in alten Pilzen.  
*lucens Rey.* PrOld, in Pilzen.  
*filiformis Redtb.* PrOld, gekätschert.  
*annularis Mnnh.* PrOld; Wellingholzhausen, gekätschert.
- Dasyglossa Kr.*  
*prospera Er.* Ba: Eick.
- Myrmedonia Er.*  
*limbata Payk.* Ba: Pthg; Umgegend v. Minden, bei Lasiusarten.
- Atheta Thoms.*  
*brunnea F.* Bünde, Elseufer.  
*nalis Grav.* PrOld, Garten.  
*gregaria Er.* PrOld.  
*linearis Grav.* Ba: Pthg, Langenhagen; Mghf, Ulenburg, unter Laub (Hub).  
*angustula Gyll.* PrOld, unter trockener Buchenrinde.  
*aequata Er.* PrOld, unter trockener Buchenrinde.  
*melanocera Thoms.* Ba: Haeverstedt, unter Rinde.  
*castanoptera Mnnh.* Ba: Mghf, gesiebt, an Gräben.  
*longicornis Grav.* PrOld, in Pilzen.  
*sordida Marsh.* Ba: Mghf, aus Laub gesiebt (Hub).  
*laticollis Steph.* Ba: Pthg, häufig.  
*jungi Grav.* Ba: Mghf, im Frühjahr gesiebt (Hub).  
Ba: Mghf; Eick, in Pilzen häufig.
- Falagria Mnnh.*  
*sulcata Payk.* PrOld, i. Compost.  
*sulcatula Grav.* PrOld.

- Cardiola Rey.*  
*obscura Grav.* PrOld; Ba: Eick.
- Astilbus Steph.*  
*canaliculatus F.* Hiddeser Bent; Nettelstedter Moor; PrOld; Ba: Pthg;  
Eick, nicht selten.
- Autalia Mnnh.*  
*impressa Ol.* PrOld, in Pilzen.
- Gyrophæna Mnnh.*  
*nana Payk.* Ba: Mghf, im Frühjahr gesiebt (Hub).  
*bihamata Thoma.* Ba: Mghf, im Winter gesiebt (Hub).
- Gymnusa Grav.*  
*brevicollis Payk.* Ba: Pthg, unterhalb des Hopfenberges auf sumpf-,  
moorig. Boden.
- 4. Unterfamilie: Tachyporinae**
- Hypocyptus Mnnh.*  
*longicornis Payk.* Ba: Eick, im Winter aus Laub gesiebt; Mghf; Weser-  
berge.
- Conosoma Kraatz.*  
*bipunctatum Grav.* PrOld, in Pilzen; Ba: Pthg.  
*litoreum L.* Ba: Eick, unter Moos; Mghf; Wiehengeb. b. Schnathorst.  
*pubescens Grav.* Ba: Pthg, unt. Moos, Anspülicht der Osper.  
*immaculatum Steph.* PrOld.
- Tachyporus Gravenh.*  
*obtusus L.* überall häufig.  
*solutus Er.* überall häufig.  
*chrysoelinus L.* gemein.  
*atriceps Steph.* Ba: Schaumburger Wald; Bergkirchen; Mghf; Böhn  
b. Möllbergen.  
*transversalis Grav.* Wiehengeb. b. Linne, gekätschert.  
*hypnorum F.* gemein.  
*pusillus Grav.* Bünde, Doberg; Ba: Pthg; Mghf; Eick.  
*nitidulus F.* häufig.
- Tachinus Grav.*  
*flavipes F.* Ba: Pthg, häufig.  
*humeralis Grav.* PrOld, gesiebt aus Laub.  
*proximus Kr.* PrOld, gesiebt.  
*marginatus Gyll.* PrOld, Garten.  
*pallipes Grav.* Ba: Eick.  
*rufipes Degeer* überall häufig.  
*subterraneus L.* Ba: Eick; Süntel, Roter Stein.  
— *v. bicolor Grav.* PrOld; Ba: Eick.  
*fimetarius Grav.* PrOld; Bünde, Doberg, gekätschert.  
*laticollis Grav.* Ba: Pthg; Mghf, Langenhagen; Süntel, im Totental.  
(Im Dung u. an Aas.)  
*collaris Grav.* Ba: Pthg, Messlingen, Anspülicht der Osper.  
*elongatus Gyll.* Ba: Hohenstein i. Wellengrund.

### *Leucoparyphus Kraatz.*

*silphoides L.*

PrOld, Garten, unter welchem Unkraut.

### *Habrocerus Er.*

*capillaricornis Grav.*

PrOld, gesiebt; Ba: Mghf, aus Laub gesiebt.

### *Mycetoporus Mnnh.*

*splendidulus Grav.*

Ba: Eick.

*brunneus Marsh.*

PrOld, Garten, im Fangeimer.

*Baudueri Rey*

Ba: Eick.

### *Bolitobius Steph.*

*lunulatus L.*

Ba: Mghf, Torlak, im Winter gesiebt; Teutob. Wald, Ravensburg; Detmold (in Pilzen).

*pulchellus Mnnh.*

Ba: Örlinghausen.

*bicolor Grav.*

Ba: Eick.

*trinotatus Er.*

PrOld, in Pilzen; Ba: häufig überall.

*pygmaeus F.*

überall häufig.

### *Byrocharis Lac.*

*analis Payk.*

Ba: Pthg, Marsch, unter Moos.

*inclinans Grav.*

Ba: Eick; Wiehengeb. b. Bergkirchen.

*formosa Grav.*

Ba: Wiehengeb. b. Wallücke.

## 5. Unterfamilie: Staphylininae

### *Quedius Steph.*

*lateralis Grav.*

Ba: Pthg, in fauler Eiche.

*scitus Grav.*

PrOld; Ba: Eick.

*xanthopus Er.*

Ba: Pthg.

*mesomelinus Mrsh.*

überall verbreitet.

*ochripennis Mén.*

Ba: Eick.

*cruentus Oliv.*

Ba: Eick, mehrfach.

*cinctus Payk.*

PrOld, gesiebt; Ba: Pthg, im Winter unt. Baumrinde; Süntel; Eick.

*juliginosus Grav.*

Bünde, Doberg; PrOld; Ba: Eick; Mghf.

*tristis Grav.*

Bünde, Doberg; Ba: Eick.

*molochinus Grav.*

Ba: Hiddeser Bent; Pthg, mehrfach.

*umbrinus Er.*

PrOld.

*obliteratus Er.*

Ba: Eick, einmal.

*humeralis Steph.*

Ba: Süntel, i. Höllental; Mghf.

*picipennis Heer*

Ba: Pthg, Anspülicht der Osper, im Jan.

*fulvicollis Steph.*

Ba: Pthg, Anspülicht der Osper.

### *Creophilus Mnnh.*

*maxillosus L.*

Ba: Pthg; Eick.

### *Ontholestes Ganglb.*

*tesselatus Geoffr.*

PrOld; Ba: Pthg; Bückeberg; Weserberge b. Häverstedt; Mghf; Eick;

*murinus L.*

PrOld; Ba: Pthg, nicht selten.

## *Staphylinus L.*

*pubescens* Degeer  
*jossor* Scop.

*fulvipes* Scop.  
*stercorarius* Oliv.  
*caesareus* Cederh.  
*erythropterus* L.

*juscatus* Grav.  
*aenaeocephalus* Degeer  
*brunnipes* F.  
*ophthalmicus* Scop.

*olens* Müll.

*similis* F.  
*gobbulifer* Geoffr.

## *Neobisnius Ganglb.*

*procerulus* Grav.

## *Philonthus Curtis.*

*splendens* F.  
*intermedius* Boisd.  
*laminatus* Creutz.  
*chalceus* Steph.  
*aenaeus* Rossi  
*atratus* Grav.

*carbonarius* Gyll.  
*temporalis* Rey  
*rotundicollis* Mén.  
*umbratilis* Grav.  
*cephalotes* Grav.  
*sordidus* Grav.  
*fimelarius* Grav.

*marginatus* Ström.

*juscipennis* Munnh.

*Mannerheimi* Fauv.  
*varius* Gyll.

*immundus* Gyll.

*sanguinolentus* Grav.

Ba: Pthg; Süntel.

Ba: Eick; Weserbergland, Ottensteiner Plateau, Velmerstot (selten i. Wäldern).

Ba: im Vogeler b. Rühle.

PrOld; Bünde, Doberg; Ba: Pthg, einmal; Dörentrup i. L. häufig.

Wiehengeb. b. Bad Essen; PrOld; Ba: Pthg; Wiehengeb. b. Schnathorst; Teutob. Wald b. Örlinghausen; Eick (nicht selten).

Ba: Eick; Teutob. Wald; Pthg.

Bünde, Doberg; Ba: Senne; Eick; Pthg; Mghf.

PrOld.

Bünde, Doberg; Ba: Eick; Pthg; Weserberge b. Rotenuffeln.

Ba: Süntel, Hohenstein; Ottensteiner Plateau; Exter; Lemgoer Mark; Eick, ein Stk. (selten, im O. des Gebietes häufiger).

überall nicht selten.

Bünde, Doberg; Ba: Mghf; Pthg; Eick; Oldentrup i. L.

Elseufer b. Bünde; Ba: Pthg, i. April unt. Eichenrinde.

Nettelstedter Moor; Ba: Pthg (nicht häufig).

Ba: Pthg; Mghf (April u. Mai).

Ba: Eick. Eldagsen b. Pthg.

Hücker Moor b. Bünde; PrOld.

überall häufig.

Weserufer b. Porta; Elseufer b. Bünde; Ba: Pthg, Weser; Polle, Weser.

überall häufig.

PrOld; Weserufer b. Porta.

PrOld, nicht selten; Ba: Eick (Hub).

PrOld.

PrOld; Ba: Eick.

Ba: Eick (Hub).

PrOld; Elseufer b. Bünde; Dümmersee b. Lehmbruch; Ba: Eick; Pthg; Mghf; Minden.

Ba: Vierenberg b. Salzuflen; Ötinghausen b. Herford, je einmal.

Ba: Umgeg. v. Herford; Pthg; Mghf; Süntel, Katzen-nase; Weserkette, Iberg, Schnathorst (i. Steinbruch u. Steinen März 12 sehr häufig). Eick; Enger.

Ba: Klus b. Minden (Hub).

Dümmersee b. Lembruch; Ba: Eick; Pthg; Weserkette b. Schnathorst, Katzen-nase.

Dümmersee b. Lembruch u. Hüde; Steinhuder Meer;

PrOld; Ba: Pthg, Heisterholz, Anspüllicht der Osper.

Dümmersee b. Lembruch; Ba: Mghf; Pthg; Wiehengeb. b. Häverstedt (aus Laub gesiebt).

- coruscus* Grav. Dümmersee b. Lembruch; Ba: Mghf; Süntel, Katzennase.  
*dimidiatus* Sahlb. Dümmersee b. Lembruch u. Hüde.  
*concinus* Grav. Weserufer b. Porta; Elseufer b. Bünde; Donoper Teich  
b. Detmold; Dümmersee b. Hüde; PrOld.
- *a. ochropus* Grav. Dümmersee b. Hüde; PrOld.  
*ebenius* Grav. Ba: Eick; Pthg, Eldagsen.  
*discoideus* Grav. PrOld; Ba: Eldagsen; Löhne; Bischofshagen.  
*ventralis* Grav. Dümmersee; Steinhuder Meer; PrOld; Elseufer b. Bünde.  
*quisquiliarius* Gyll. Nettelstedter Moor; Ba: Blomberg i. L.  
*longicornis* Steph. PrOld; Ba: Pthg (Hub).  
*varians* Payk. Dümmersee b. Lembruch; Nettelstedter Moor; PrOld;  
Ba: Pthg, Anspüllicht der Osper; Wiehengeb. b.  
Häverstedt; Eick.
- *a. unicolor* Steph. Ba: Weserberge.  
*fumarius* Grav. Ba: Eick.  
*micans* Grav. Weserufer b. Porta; Hücker Moor b. Bünde.  
*fulvipes* F. Weserufer b. Porta; Elseufer b. Bünde; Nettelstedter  
Moor; Ba: Eick, am Mühlenbach (an fließendem  
Wasser sehr häufig).
- splendidulus* Grav. Ba: Umgegend v. Herford; Stukenberg; Pthg, u. Kiefern-  
rinde; Eick.  
*nigritulus* Grav. PrOld; Hiddeser Bent; Nettelstedter Moor; Ba: Mghf,  
Ulenberg, Torlak; Eick, im Winter gesiebt.  
*rubripennis* Kiesw. Bünde, Doberg; PrOld, Garten.
- Othius** Stephens.
- punctulatus* Goeze PrOld; Ba: Pthg; Weserkette, Katzennase, Totental,  
Hohenstein; Mghf; Eick; Lemgoer Mark.  
*melanocephalus* Grav. PrOld; gesiebt; Ba: Süntel, Totental, Hohenstein; Mghf;  
Eick.  
*myrmecophilus* Kiesw. Ba: Eick (Hub).
- Baptolinus** Kraatz.
- affinis* Payk. Ba: Pthg; Weserkette, Osterberg, Bergkirchen, Schnat-  
horst; Mghf; gesiebt; Eick.
- Xantholinus** Serv.
- lentus* Grav. Ba: Schaumburger Wald, einmal unter Rinde (Hub).  
*punctulatus* Payk. PrOld; Hiddeser Bent; Nettelstedter Moor; Ba: Eick  
(häufig).  
*atratus* Heer PrOld.  
*angustatus* Steph. PrOld; Ba: Pthg, nicht selten.  
*glabratus* Grav. PrOld; Ba: Wiehengeb. b. Schnathorst; Mghf; Eick,  
mehrfach.  
*linearis* Ol. Weserufer b. Porta; PrOld; Doberg b. Bünde; Ba:  
Pthg; Schnathorst; Schaumb. Wald.  
— *v. longiventris* Heer Ba: Pthg; Eick; Süntel.  
*distans* Rey PrOld, gesiebt, selten.  
*tricolor* F. Bünde, Doberg; Ba: Pthg; Süntel; Weserkette, Jakobs-  
berg, Wittekindsberg, Oberlübbe; Eick; Blomberg  
i. L.; Teutob. Wald, Ravensburg, n. selt.

## 6. Unterfamilie: Paederinae

### *Lathrobium* Grav.

*multipunctatum* Grav.

Ba: Pthg, Anspülicht der Weser; Ottensteiner Plateau i. Glessetal i. April; Bega i. L., i. Juli (selten).

*quadratum* Payk.

Ba: Pthg, Anspülicht der Osper.

*terminatum* Grav.

Ba: Pthg, Anspülicht der Osper, einmal i. Mai.

*julvipenne* Grav.

PrOld; Kalksteinbruch b. Hiddesen; Ba: Pthg; Eick; Vlotho.

— v. *Letzneri* Gerh.

Ba: Mghf; Eick; Pthg; Schnathorst; Süntel.

*laevipenne* Heer

Bünde, Doberg, einmal.

*ripicola* Czwalina

Ba: Velmerstot (Hub).

*elongatum* L.

Ba: Pthg; Mghf; Eick.

*geminum* Kraatz

PrOld; Ba: Ptg; Süntel.

*brunnipes* F.

PrOld; Ba: Pthg; Lemgoer Mark, Lattberg (meist unter Rinde).

*jiliforme* Grav.

Dümmersee b. Lembruch; Ba: Pthg.

*spadiceum* Er.

Bünde, Doberg, einmal.

### *Domene* Fauvel.

*scabricollis* Er.

Ba: Weserbergland; Pymont (je einmal).

### *Medon* Steph.

*brunneus* Er.

PrOld, einmal gesiebt.

*jusculus* Mnnh.

PrOld, gesiebt.

*dilutus* Er.

Ba: Süntel, gesiebt.

### *Litocharis* Lac.

*ochracea* Grav.

PrOld, Garten, unter trockenem Unkraut.

### *Scopaeus* Kraatz.

*cognatus* Rey

PrOld, Garten, einmal.

### *Stilicis* Latr.

*subtilis* Er.

Ba: Eick; Eldagsen, Osper; Süntel, Katzennase.

*rufipes* Germ.

Ba: Süntel, Katzennase; Eick.

*similis* Er.

Ba: Pthg.

*geniculatus* Er.

PrOld; Ba: Schnathorst.

*orbiculatus* Payk.

Ba: Eick.

### *Paederus* Fabr.

*litoralis* Grav.

Ba: überall häufig.

*riparius* L.

Dümmersee b. Lembruch; Ba: Eick; Pthg; Mghf.

*limnophilus* Er.

Ba: Mghf; in der Gegend v. Löhne u. im Werretal.

*gemellus* Kraatz

Ba: Pthg, einmal bei Eldagsen nahe der Osper auf Sandboden i. gr. Menge; Wissingen b. Melle, einmal auf sandigem, feuchtem Boden zahlreich.

## 8. Unterfamilie: Steniae

### *Stenus* Latr.

*biguttatus* L.

überall häufig.

*bipunctatus* Er.

ebenfalls häufig.

*guttula* Müll.

Ba: Pthg; an der Osper b. Eldagsen, i. Mai.

<i>bimaculatus</i> Gyll.	überall häufig.
<i>fossulatus</i> Er.	Ba: Süntel, Roter Stein, i. Mai (Hub).
<i>asphaltinus</i> Er.	Ba: Wesergeb., Schaumburg i. Mai (Hub).
<i>Juno</i> Payk.	überall nicht selten.
<i>ater</i> Mnnh.	Ba: Mghf.
<i>clavicornis</i> Scop.	Bünde, Doberg; PrOld; Ba: Pthg; Süntel, Osterberg, Roter Stein; Hoher Nacken, Hohenstein; Wiehengegeb. b. Oberlütbe; Eick.
<i>providus</i> Er.	Bad Essen a. Wiehengegeb.; Ba: Eick; Pthg, Anspülicht der Osper.
<i>pusillus</i> Steph.	PrOld.
<i>nanus</i> Steph.	Ba: Süntel, Hohenstein; Eick.
<i>carbonarius</i> Gyll.	Ba: Minden-Ravensberg (genauer Fundort unbekannt) 1915 — 3 Stk.
<i>incrassatus</i> Er.	Ba: Pthg, Weserufer (sehr selten) (Hub).
<i>buphthalmus</i> Grav.	überall häufig.
<i>melanarius</i> Steph.	PrOld.
<i>atratus</i> Er.	Ba: Pthg, Anspülicht der Osper, einmal im Januar.
<i>morio</i> Grav.	Ba: Süntel, Ramsnacken (Bénitz).
<i>juscipes</i> Grav.	Ba: Pthg, häufig.
<i>argus</i> Grav.	Ba: Pthg, an der Osper.
<i>binotatus</i> Ljungh.	Hiddeser Bent; Ba: Pthg, an der Weser zwischen Schilf, März, April.
<i>geniculatus</i> Grav.	PrOld.
<i>opticus</i> Grav.	Ba: Pthg, Anspülicht der Osper, i. Jan.
<i>crassus</i> Steph.	Bünde, Elseufer.
<i>nigritulus</i> Gyll.	Ba: bei Tengern, einmal unter Stein.
<i>brunnipes</i> Steph.	Ba: Pthg, Anspülicht der Osper (Hub).
<i>latifrons</i> Er.	Ba: Pthg; Anspülicht der Osper (Hub).
<i>tarsalis</i> Ljungh.	PrOld; Wiehengegeb. b. Linne; Wellingholzhausen, gekätschert; Ba: Eick.
<i>similis</i> Hrbst.	Wiehengegeb. b. Linne, gekätschert; Ba: Mghf, aus Laub gesiebt.
<i>cicindeloides</i> Schall.	Ba: Anspülicht der Osper u. Weser.

## 9. Unterfamilie: Oxyporinae

### *Oxyporus* Fbr.

*rufus* L. überall häufig, hauptsächlich an Pilzen.

## 11. Unterfamilie: Oxytelinae

### *Bledius* Mnnh.

*tricornis* Hrbst. Ba: Pthg, 1898 einmal, sonst Salztier.  
*bicornis* Germ. PrOld, einmal, sonst Salztier.  
*opacus* Block. Ba: Eick; Löhne, einmal an der Werre 3 Stk. (Hub).

### *Haploderus* Steph.

*caelatus* Grw. PrOld, gesiebt.

*Platystethus* Mnnh.

*arenarius* Grav.

Pyrmont, Waldblöße, gekätschert; Wellingholzhausen, gekätschert; Nettelstedter Moor; Ba: Eick.

*cornutus* Grav.

Bünde, Elseufer; Ba: Weserkette, Ramsnacken; Löhne, an der Werre; Hillentrup i. L.

*alutaceus* Thoms.

Ba: Eick.

*nitens* Sahlb.

Ba: Hiddeser Bent.

*Oxytelus* Grav.

*rugosus* F.

überall gemein.

— *a. pulcher* Grav.

Bünde, Elseufer; Ba: Pthg.

*laqueatus* Marsh.

Ba: Pthg, Anspülicht der Osper, April 99.

*sculptus* Grav.

PrOld.

*inustus* Grav.

PrOld, i. Maulwurfsnest u. gesiebt; Bünde, Doberg, auf Mergel.

*sculpturatus* Grav.

überall häufig.

*nitidulus* Grav.

PrOld; Bünde, Doberg.

*complanatus* L.

PrOld.

*clypeonitens* Pand.

PrOld.

*tetracarinatus* Block.

PrOld; Bünde, Doberg; Ba: Eick; Mghf.

*pumilus* Er.

Hücker Moor b. Bünde; PrOld.

*Trogoploeus* Mnnh.

*riouularis* Motsch.

PrOld, gesiebt.

*Coprophilus* Latr.

*striatulus* F.

PrOld; Ba: Eick, Schulgarten; Pthg.

*Deleaster* Er.

*dichrous*, Grav.

Nettelstedter Moor; Ba: Gohfeld, an der Werre; Eick.

13. Unterfamilie: Omalinae

*Anthophagus* Grav.

*bicornis* Block.

Ba: Süntel, Schaumburg, im östl. Teil der Weserkette, auf Crataegus, Mai 15 sehr häufig.

— *a. nivalis* Rey

Ba: Süntel; Hohenstein.

*Lesteva* Latr.

*pubescens* Mnnh.

PrOld.

*longelytrata* Goeze

PrOld; Bad Essen, Wiehengeb.

*Orochares* Kraatz.

*angustata* Er.

PrOld., Wiehengeb., gekätschert.

*Acidota* Mnnh.

*crenata* F.

Ba: Pthg, Anspülicht der Osper, einmal.

*Olophrum* Er.

*piceum* Gyll.

Ba: Weserkette, Gr. Süntel.

*assimile* Payk.

Ba: Pthg.

*Arpedium* Er.

*quadrum* Grav.

Ba: Weserberge; Pthg, Anspülicht der Osper.

- Lathrimaenum Er.**  
*melanocephalum* Illig. PrOld, in alten Pilzen.  
*atrocephalum* Gyll. PrOld, gesiebt; Ba: Eick, gesiebt.  
*unicolor* Marsh. Ba: Löhne, im Torlak; Eick (selten).
- Xylodromus Heer.**  
*depressus* Grav. Ba: Schnathorst, i. August.
- Omalium Grav.**  
*rioulare* Payk. PrOld, gesiebt u. i. Pilzen, häufig; Ba: Eick; Pthg.  
*septentrionis* Thoms. Ba: Eldasen (Büsching).  
*caesum* Grav. PrOld, gesiebt.
- Phyllodrepa Thoms.**  
*floralis* Payk. PrOld, gesiebt; Bünde, Doberg; Ba: Löhne, i. Früh-  
jahr, mehrfach.  
*melanocephala* F. Ba: Eldagsen (Büsching).
- Anthobium Steph.**  
*abdominale* Grav. PrOld, v. Blüten gekätschert; Ba: Wesergeb. b. Schnat-  
horst i. April.  
*signatum* Märkel Ba: Pthg, Heisterholz (Mai); Wiehengeb. b. Dehme,  
auf Kirschblüte (April) (Hub).  
*limbatum* Er. PrOld.  
*minutum* F. Ba: Pthg.  
*torquatum* Marsh. Ba: Pthg.  
*sorbi* Gyll. PrOld, v. Blüten gekätschert; Ba: Weserbergland, Porta.  
*rectangulum* Fauv. Ba: Mghf, b. Ulenburg an Lonicera (Hub).
- Megarthrus Steph.**  
*sinuato-collis* Laé. PrOld, gekätschert.  
*denticollis* Beck. Ba: Wiehengeb. b. Häverstedt.
- Microplepus Latr.**  
*porcatus* F. PrOld, gekätschert, zweimal.
- 3. Familie: Pselaphidae**
- Euplectus Leach.**  
*Fischeri* Aubé PrOld, im Compost.  
*signatus* Reichenb. Ba: Süntel, Hohenstein, an faulem Baumstamm.
- Amauronyx Reitt.**  
*Maerkeli* Aubé Ba: Westfalen (genaue Fundortangabe fehlt).
- Byraxis Leach.**  
*sanguinea* Leach. Wellingholzhausen, Teutob. Wald, gekätschert; Ba:  
Pthg, Anspüllicht der Osper, Mai 99, sehr häufig;  
in der Marsch auf *Sium*, einmal.
- Reichenbachia Leach.**  
*fossulata* Reichenb. Ba: Pthg, einmal u. großem Stein, am Waldrand.  
*juncorum* Leach. Ba: Mghf, im Anspüllicht des Mühlbaches; Eick, aus  
Laub gesiebt.

*Bythinus* Leach.

*puncticollis* Denny  
*securiger* Rchbch.

Ba: Mghf, aus Laub gesiebt.  
PrOld, im Compost.

*Pselaphus* Hrbst.

*Heisei* Hrbst.

Ba: Pthg (Büsching).

4. Familie: Scydmaemidae

*Neuraphus* Thoms.

*elongatulus* Müll.

Ba: Johannisberg b. Biefeld, aus Laub gesiebt.

*Euconnus* Thoms.

*hirticollis* Ill.

Ba: Eick, einmal.

*Scydmaenus* Latr.

*tarsatus* Müll.

PrOld, im Compost.

6. Familie: Silphidae

*Choleva* Latr.

*spadicea* Strm.

*Sturmi* Bris.

*oblonga* Latr.

*cisteloides* Fröl.

Ba: Bielefeld, Johannisberg, aus Laub gesiebt.

Ba: Uchte.

Ba: Schnathorst.

PrOld, im Maulwurfsnest; Ba: Mghf; Niedermehnen;  
Süntel am Süntelturm, Totental, Hohenstein; Witte-  
kindsberg; Löhne; Eick.

Ba: Pthg, im Walde i. April (Hub).

*agilis* Ill.

*Nargus* Thoms.

*Wilkeni* Spence.

*anisotomoides* Spence.

Ba: Pthg, im Walde, i. April.

Ba: Süntel, Hohenstein, Totental (April u. Mai).

*Catops* Payk.

*jumatus* Spence.

*Watsoni* Spence.

— *v. amoenus* Reitt.

*picipes* Fabr.

*fuliginosus* Er.

*chrysomeloides* Panz.

*tristis* Panz.

*alpinus* Gyll.

Ba: Eick, Fangbecher i. Walde.

Ba: Pthg; Eick; Mghf (an kl. Kadavern) häufig.

Ba: Mghf.

Ba: Eldagsen (Büsching).

Ba: Pthg; (Hub).

Ba: Pthg (Büsching).

Hiddesen, an Hasenfell; Ba: Eick.

Ba: Teutob. Wald, nahe der Ravensburg; Eick, Fang-  
becher i. kl. Walde.

*Necrophorus* Fabr.

*germanicus* L.

Rödinghausen a. Wiehengeb., einmal; Ba: Pthg, b.  
Lahde, einmal (sehr selten).

*humator* Goeze

überall u. n. selten.

*interruptus* Steph.

Ba: Pthg, einmal.

*vespilloides* Hrbst.

Ba: Pthg; Bergkirchen, meist an faulen Pilzen.

*vespillo* L.

überall häufig.

*vestigator* Herschel

Börninghausen a. Wiehengeb.

*Necrodes* Leach.

*litoralis* L.

Ba: Pthg; Wiehengeb.; Eick (an größeren Kadavern  
n. selten).

*Thanatophilus Samouelle.*

- rugosus* L. Ba: Pthg; Mghf.  
*sinuatus* F. überall häufig, an Aas.  
*dispar* Hrbst. Ba: Mghf, einmal.

*Oeceoptoma Samouelle.*

- thoracica* L. Ba: Pthg; Mghf; Eick (n. selten).

*Blitophaga Reitt.*

- opaca* L. überall häufig.  
*undata* Müll. häufig.

*Xylodrepa Thoms.*

- quadripunctata* L. bei Salzuflen, i. Buchenwäldern häufig.

*Silpha* L.

- tristis* Illig. PrOld; Ba: Eick.  
*obscura* L. überall n. selten.

*Phosphuga Leach.*

- atrata* L. überall häufig, gern in der Nähe v. Wasser.  
— *a. brunnea* Hrbst. überall häufig.

*Anisotoma Ill.*

- humeralis* Fabr. Ba: Weserbergland; Beverungen; Pthg.  
*axillaris* Gyll. Ba: Schloß Holte, u. Kiefernrinde (Hub).

*Agathidium Ill.*

- nigripenne* F. Ba: Süntel, a. d. Südwehe, u. verpilzter Buchen- u.  
Eichenrinde, zweimal i. Mai  
*seminulum* L. PrOld, aus Laub gesiebt; Ba: Mghf, im Torlak;  
Wiehengeb. b. Nettelstedt.  
*rotundatum* Gyll. Ba: Eick.

10. Familie: Ptiliidae

*Pteryx Matth.*

- suturalis* Heer Ba: Mghf, aus Laub gesiebt.

*Acrotrichis Motsch.*

- grandicollis* Mnnh. PrOld, gesiebt.  
*intermedia* Gillm. Ba: häufig, im Winter im Laube.  
*fascicularis* Hrbst. Ba: Bielefeld, Teutob. Wald; Mghf, aus Laub gesiebt,  
im Februar.

12. Familie: Scaphidiidae

*Scaphidium Oliv.*

- quadrimaculatum* Oliv. Ba: Pthg; Wesergeb. b. Steinbergen, unter fauler  
Rinde, nicht häufig.

*Scaphosoma Leach.*

- agaricinum* L. Ba: Hohenstein; Löhne; Eick; Teutoburger Wald b.  
Örlinghausen (häufig).

## 14. Familie: Histeridae

### *Platysoma* Leach.

*frontale* Payk.

Ba: Pthg, unter Birkenrinde; Teutob. Wald b. Örlinghausen.

*compressum* Hrbst.

Ba: Pthg, unter Eichenrinde; Weserkette, Baumgarten; Süntel, Hohenstein.

*angustatum* Hoffm.

Ba: Schloß Holte, unter Kiefernrinde.

### *Hister* L.

*unicolor* L.

Nettelstedter Moor; PrOld; Ba: Pthg.

*terricola* Germ.

PrOld, i. Maulwurfsnest; Nettelstedter Moor; Ba: Mghf.

*merdarius* Hoffm.

PrOld; Ba: Mghf.

*cadaverinus* Hoffm.

überall sehr häufig.

*striola* Sahlbg.

Ba: Pthg, Eldagsen, zweimal.

*fimetarius* Hrbst.

Ba: Pthg, nicht selten.

*stercorarius* Hoffm.

PrOld; Ba: Pthg; Wiehengeb., Limberg.

*marginatus* Er.

Ba: an faulen Pflanzen, selten (Hub).

*ruficornis* Grimm.

Ba: Pthg, selten (Hub).

*purpurascens* Hrbst.

PrOld; Ba: Sieker, Senne; Pthg; Mghf; Eick.

— *a. niger* Schmidt

Ba: Pthg.

*ventralis* Marsh.

PrOld.

*neglectus* Germ.

PrOld; Ba: Pthg, mehrfach; Schnathorst; Eldagsen, Eick.

*carbonarius* Hoffm.

PrOld; Ba: Schildesche; Pthg; Schaumburger Wald.

*bimaculatus* L.

Ba: Eick, einmal i. Wassertümpel; Vermold.

### *Paromalus* Leach.

*paralleleptipedus* Hrbst.

Ba: Pthg, unter Kiefernrinde, März 13 u. Okt. 18 (8 Stk).

### *Dendrophilus* Leach.

*punctatus* Hrbst.

PrOld, im Kompost.

### *Gnathoncus* Duval.

*punctulatus* Thoms.

Ba: Pthg, Eldagsen (Büsching); Gr. Süntel; Eick, am Fenster eines Viehstalles sehr zahlr.

*rotundatus* Kug.

Ba: Kahler Asten.

### *Saprinus* Er.

*semistriatus* Scriba

Ba: Pthg; Wesergeb.; Eick; Teutob. Wald.

*aenaeus* Fabr.

Ba: Wald b. Südfelde, im Juni.

### *Plegaderus* Er.

*vulneratus* Panz.

Ba: Pthg, unter Kiefernrinde, mehrfach, März 13 und Okt. 18.

### *Onthophilus* Leach.

*striatus* Förster

überall ziemlich häufig.

*sulcatus* Fabr.

PrOld, im Compost; Ba: Eick (nicht selten).

Fortsetzung folgt.