

Abhandlungen
aus dem
Westfälischen Museum
für Naturkunde

63. Jahrgang · 2001 · Heft 5

Klaus Renner

Coleoptera Westfalica:
Familia Staphylinidae, Subfamilia Aleocharinae

Westfälisches Museum für Naturkunde Münster



Landschaftsverband
Westfalen-Lippe

Hinweise für Autoren

In der Zeitschrift **Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde** werden naturwissenschaftliche Beiträge veröffentlicht, die den Raum Westfalen betreffen.

Druckfertige Manuskripte sind an die Schriftleitung zu senden.

Aufbau und Form des Manuskriptes

1. Das Manuskript soll folgenden Aufbau haben: Überschrift, darunter Name (ausgeschrieben) und Wohnort des Autors, Inhaltsverzeichnis, kurze Zusammenfassung in deutscher Sprache, klar gegliederter Hauptteil, Literaturverzeichnis (Autoren alphabetisch geordnet), Anschrift des Verfassers.
2. Manuskriptblätter einseitig und weitzeilig in Maschinenschrift; zusätzlich als PC-Diskette (MS-DOS oder MAC; gängiges Programm, etwa WORD).
3. Die Literaturzitate sollen enthalten: Autor, Erscheinungsjahr, Titel der Arbeit, Name der Zeitschrift in den üblichen Kürzeln, Band, Seiten; bei Büchern sind Verlag und Erscheinungsort anzugeben.

Beispiele:

KRAMER H. (1962): Zum Vorkommen des Fischreiher in der Bundesrepublik Deutschland. – J. Orn. **103**: 401-417.

RUNGE, F. (1992): Die Naturschutzgebiete Westfalens und des früheren Regierungsbezirks Osnabrück. 4. Aufl. – Aschendorff, Münster.

Bei mehreren Autoren sind die Namen wie folgt zu nennen:

MEYER, H., A. HUBER & F. BAUER (1984): . . .

4. Schrifttypen im Text:

einfach unterstrichen = **Fettdruck**

unterstrichelt oder *g e s p e r r t* = *S p e r r d r u c k*

wissenschaftliche Art- und Gattungsnamen sowie Namen von Pflanzengesellschaften untersträngeln = *Kursivdruck*

Autorennamen in GROSSBUCHSTABEN / KAPITÄLCHEN

Abschnitte, die in Kleindruck gebracht werden können, an linken Rand mit „petit“ kennzeichnen.

Abbildungsvorlagen

5. Die Abbildungsvorlagen (Fotos, Zeichnungen, grafische Darstellungen) müssen bei Verkleinerung auf Satzspiegelgröße (12,6 x 19,7 cm) gut lesbar sein. Größere Abbildungen (z. B. Vegetationskarten) können nur in Ausnahmefällen nach Rücksprache mit der Schriftleitung gedruckt werden.
6. Fotos sind in schwarzweißen Hochglanzabzügen vorzulegen.
7. Die Beschriftung der Abbildungsvorlagen muß in Anreibebuchstaben auf dem Original oder sonst auf einem transparenten Deckblatt erfolgen.
8. Die Unterschriften zu den Abbildungen sind nach Nummern geordnet (Abb. 1, Abb. 2 . . .) auf einem separaten Blatt beizufügen.

Korrekturen

9. Korrekturfahnen werden dem Autor einmalig zugestellt. Korrekturen gegen das Manuskript gehen auf Rechnung des Autors.

Für den Inhalt der Beiträge sind die Autoren allein verantwortlich.

Jeder/s Autor/Autorenteam erhält 50 Freixemplare/Sonderdrucke seiner Arbeit. Liegen die Herstellungskosten (incl. Mehrwertsteuer) pro Exemplar über 30,- DM, so verringert sich die Anzahl der Freixemplare auf 30 Stück, bei Produktionskosten über 50,- DM auf 20 Stück.

Schriftleitung Abhandlungen:

Dr. Brunhild Gries

Westfälisches Museum für Naturkunde

Sentruper Straße 285

48161 Münster

Abhandlungen
aus dem
Westfälischen Museum
für Naturkunde

63. Jahrgang · 2001 · Heft 5

Klaus Renner

Coleoptera Westfalica:
Familia Staphylinidae, Subfamilia Aleocharinae

Westfälisches Museum für Naturkunde
Landschaftsverband Westfalen-Lippe
Münster 2001

Impressum

Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde

Herausgeber: Dr. Alfred Hendricks
Landschaftsverband Westfalen-Lippe
Westfälisches Museum für Naturkunde
Sentruper Str. 285, 48161 Münster
Telefon; 02 51 / 5 91-05, Telefax: 02 51 / 5 91 60 98

Druck: LINDEN Print & Media GmbH

Schriftleitung: Dr. Brunhild Gries

© 2001 Landschaftsverband Westfalen-Lippe

ISSN 0175-3495

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Coleoptera Westfalica: Familia Staphylinidae, Subfamilia Aleocharinae

Klaus Renner, Bielefeld

Inhaltsverzeichnis

I. Einleitung	3
II. Methodische Hinweise	4
III. Faunistik	5
IV. Diskussion	204
V. Literatur	204
VI. Verzeichnis der Arten	210

I. Einleitung

Die Staphyliniden, und unter ihnen ganz besonders die Aleocharinen, gehörten bis in jüngere Zeit bei den Koleopterologen zu den weniger begehrten Käfern und sind deshalb in den meisten Sammlungen deutlich unterrepräsentiert. Nicht zuletzt durch das Wirken von Altmeister LOHSE hat sich die Situation erheblich verbessert; die Zahl der Koleopterologen, deren Arbeit bevorzugt auf die Staphyliniden ausgerichtet ist, hat beträchtlich zugenommen.

Aleocharinen sind praktisch in sämtlichen Biotopen anzutreffen. Sogar in unseren Städten wurde durch eingehende Analysen eine erstaunlich hohe Artenvielfalt festgestellt (ASSING 1988, 1992, STRZELCZYK 1988, KACHE & ZUCCHI 1993, HENNICKE & MÜLLER-MOTZFELD 1998). Komposthaufen zeigen oft ein reichhaltiges Staphyliniden-Spektrum (RENNER 1981), ebenso Taubenschläge (ASSING 1992a) oder Kaninchenställe (GOLLEKOWSKI 1995), und es trifft auch auf Müllkippen zu (LOHSE 1962, TOPP 1971, VOGEL 1986). Einige besonders spezialisierte Arten leben in ganz bestimmten Säugetierbauen, Vogelnestern, auf dünnen Sandböden, in Kaltluft-Blockhalden (MOLENDEN 1989), an Gletscherrändern, in Höhlen der Alpen oder sogar in der Gezeitenzone (Gattung *Diglotta*). Detaillierte Untersuchungen haben gezeigt, daß Raumstruktur und Mikroklima oft entscheidende Faktoren für die Habitatwahl einer Art sind (MEISSNER 1998).

Die Aleocharinen ernähren sich saprophag, mycetophag oder carnivor, auch parasitische Lebensweise kommt vor (Gattung *Aleochara*). Die Vertreter zahlreicher Gattungen wie z. B. *Gyrophaena* und *Bolitochara* haben enge Beziehungen zu oft ganz bestimmten Pilzen entwickelt, andere kann man am ehesten an Aas oder Exkrementen finden. Bodenfallen mit Konservierungsmitteln auf Äthanol-Basis (RENNER 1980) sind besonders für Arten, die Safftflüsse und andere gärende Substrate bewohnen, hoch attraktiv. Für die früher als sehr selten geltende *Megaloscapa punctipennis*, die inzwischen in vielen Regionen in Bodenfallen gefangen wurde, konnte die Attraktivität von Äthanol direkt nachgewiesen

werden (VOGEL 1983). Für die Mehrzahl der Arten gilt leider noch immer, daß wir über ihre Lebensansprüche wenig Genaues wissen.

Einige Aleocharinen gehören zu den häufigsten Käfern überhaupt, von anderen wurden in Mitteleuropa nur wenige Einzelexemplare gefunden. Aus Deutschland sind etwa 670 Arten bekannt, davon sind in Westfalen 450 nachgewiesen. Etwa 50 weitere Arten sind hier zu erwarten, da ihr Verbreitungsgebiet die hiesige Region zumindest teilweise mit einschließt. Die meisten Aleocharinen zeigen hohe Flugaktivität, und dies macht den Einsatz des Autokeschers als Sammelmethode besonders effektiv. Mit ihm wurden vom Autor in den letzten zehn Jahren zahlreiche Arten für Westfalen erstmalig nachgewiesen.

Nach der Arbeit von WESTHOFF (1881/82) „Die Käfer Westfalens“ hat es noch bis 1931 einige faunistische Bearbeitungen kleinerer Regionen gegeben. Die 1941 zunächst für Deutschland begonnene, später fast ganz Mitteleuropa umfassende Faunistik von A. HORION wurde nicht mehr vollendet. In dem 1967 erschienenen Band blieben die Athetini und damit fast 50% der Aleocharinae ausgespart.

Wegen der Fülle inzwischen erfolgter Neumeldungen und nomenklatorischer Änderungen soll nun der Versuch einer neuen Zusammenstellung für Westfalen unternommen werden.

II. Methodische Hinweise

Diese faunistische Arbeit basiert auf den Funddaten zahlreicher privater Sammler, auf deren Veröffentlichungen sowie auf dem Material einiger Museumssammlungen. Mein herzlicher Dank gilt allen, die ihre Daten oder auch Käfer zur Überprüfung zur Verfügung stellten. Besonders danken möchte ich V. Assing für Literaturhinweise und so manche Determinationskontrolle sowie Dr. H. Terlutter für Tips zur Datenverarbeitung auf dem Computer.

Abweichend von der Aufgliederung Westfalens in vier Naturräume (ANT 1971) werden hier fünf unterschieden (siehe TERLUTTER 1995), indem die westfälischen Tieflandgebiete nördlich des Wiehengebirges separat als „Dümmer-Geest-Niederung“ (DGN) geführt werden.

Die Nomenklatur folgt KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) sowie einigen Nachträgen (ASSING & SCHÜLKE 1999, ASSING 1999). Die systematische Reihenfolge der Gattungen entspricht der im Käferverzeichnis (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998); auf eine Umstellung entsprechend den Anmerkungen in FHL12, S. 185 f (LOHSE & LUCHT 1989) wurde aus praktischen Erwägungen heraus verzichtet.

Die Angaben zur Verbreitung der Arten in Deutschland basieren auf dem Verzeichnis der Käfer Deutschlands (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) sowie Horions Faunistik (HORION 1967), die auch für die Notizen zur Ökologie der Käfer herangezogen wurde.

Arten, die in Westfalen noch nicht nachgewiesen sind, deren Verbreitungsgebiet aber diese Region zumindest teilweise mit einschließt, werden in Kleindruck aufgenommen. Dies gilt auch für anzuzweifelnde oder unrichtige Einzelmeldungen sowie für die aus Nachbargebieten aufgeführten Funde.

Abkürzungen

1. Sammlungen

CAH	Assing, Hannover	CRB	Renner, Bielefeld
CBoP	Borcherding, Porta (jetzt Husum)	CRE	Röwekamp, Enniger
CBP	Braun, Paderborn	CSB	Schulze, Bielefeld
CDH	Drees, Hagen	CSiB	Siede, Bonn (jetzt Kasseburg)
CERL	Erbeling, Letmathe (jetzt Schmalenberg)	CSW	Starke, Warendorf
CFM	Feldmann, Münster	CSR	Stock, Roth
CFH	Folwaczny, Hersfeld (jetzt Sammlung Braun, Tübingen)	CTM	Terlutter, Münster (jetzt Billerbeek)
CGR	Gerhard, Reichshof	CWL	Wasner, LÖBF Recklinghausen
CGS	Gräf, Solingen	CWB	Wagner, Bonn
CGL	Grundmann, Leopoldshöhe (jetzt Schmallenberg)	CWR	Wenzel, Radevormwald
CHF	Hellweg, Finnentrop (jetzt Bonn)	LMM	Westf. Museum f. Naturkunde, Münster
CHE	Hozmann, Essen	LMO	Landesmuseum Oldenburg
CHM	Hetzel, Münster (jetzt Darmstadt)	MKB	Museum A. Koenig, Bonn
CJB	Jankowski, Barkhausen (jetzt Naturkunde-Museum Bielefeld)	SMB	Naturkunde-Museum, Bielefeld
CKB	Köhler, Bornheim	SMO	Museum am Schölerberg, Osnabrück
CLD	Lakmann, Delbrück		
CRD	Rehage, Dortmund (jetzt Münster)		

2. Sonstige

D.	Deutschland	OWB	Oberes Weserbergland
Westf.	Westfalen	SBL	Süderbergland
DGN	Dümmer-Geest-Niederung	NSG	Naturschutzgebiet
WTL	Westfälische Tieflandsbucht	leg.	legit, gesammelt von
UWB	Unteres Weserbergland	i.l.	in literis, briefliche Mitteilung

III. Faunistik

Deinopsis erosa (Steph., 1832)

23-121-001-

D.: in ganz Deutschland, nach Süden und Westen seltener werdend.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

An sumpfigen, moorigen Stellen.

DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1955/56, CJB) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 1993, CTM; Feldmann leg. 1998, CFM).

WTL: Oelde (Dahms leg. 1933, LMM) - Haltern (Hozman leg. 1980, CHE) - Herzebrock: Clarholz (Terlutter leg. 1980, CTM) - Münster: Handorf (Terlutter leg. 1984, CTM) - Münster: Mecklenbeck (Terlutter leg. 1986, CTM) - Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Ahaus: Poiksbrook (Terlutter leg. 1990, CTM) - Warendorf (Starke leg. 1992, CSW) - West-Münsterland: Gronau (Grundmann leg. 1992, CGL) - Ahlen-Dolberg (Röwekamp leg. 1994/95, CRE).

- UWB: Holzhausen (Jankowski leg. 1950/56/57, CJB) - Bad Salzuflen (Renner leg. 1976/78, CRB) - Bad Salzuflen: Bexter Wald (Grundmann leg. 1982, CGL) - Lengerich (Feldmann leg. 1991, CFM).
- OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1966/78/81, CJB).
- SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Overath (Schneider leg. 1929, MKB) - Hückeswagen (Eigen leg., MKB) - Solingen: Ohligs (Eigen leg., MKB) - Marienheide (Eigen leg. 1931, MKB) - Lintorf (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1963/66, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Hösel (Hozman leg. 1970, CHE) - Köbach/Bröhl (Gräf leg. 1976, KÖHLER 1993, MKB) - Hagen (Drees leg. 1989, CDH) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1991/92, WENZEL 1997) - Witten (Drees leg. 1991/95, CDH).

Gymnusa brevicollis (Payk., 1800) 23-122-001-

D.: fast in ganz Deutschland, nach Süden und Westen seltener werdend.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

Bevorzugt in Mooren.

- DGN: Petershagen (BARNER 1922, PEETZ 1931; Barner leg. 1930, LMM) - Hiller Moor (Jankowski leg. 1956/60/63/80/82, CJB; Renner leg. 1981, CRB) - Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991).
- WTL: Coesfeld (Hozman leg. 1974, CHE) - Venner Moor (Kroker leg. 1976/77, KROKER 1978) - NSG Deutener Moor (SIEDE 1977) - Borken: Burloer Venn (Renner leg. 1979, CRB) - Haltern (Hozman leg. 1980, CHE) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1983/96, CTM) - Ahaus: NSG Graeser Venn (Terlutter leg. 1985/96, CTM) - Gronau: NSG Amtsvenn (Terlutter leg. 1992, CTM).
- UWB: Holzhausen (Jankowski leg. 1957, CJB) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.).
- OWB: Minden: Schaumburger Wald (Renner leg. 1983, CRB).
- SBL: Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Witten (Fügner leg., MKB) - Solingen: Ohligs (Eigen leg., MKB) - Ratingen (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1986, WENZEL 1988) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993).

Gymnusa variegata Kiesw., 1845 23-122-002-

D.: fast in ganz Deutschland, besonders im mittleren Bereich.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

Bevorzugt im Moos von Fließgewässern.

- DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1956, CJB) - Oppenweher Moor (Renner leg. 1976, CRB).
- WTL: Essen (Hozman leg. 1970/72, CHE) - Schloß Holte-Stukenbrock (Renner leg. 1976, CRB).
- UWB: Holzhausen (Jankowski leg. 1957, CJB) - Bielefeld: Jöllenbeck (Renner leg. 1976, CRB).

- OWB: Klein Möllenbeck (Jankowski leg. 1956/81, CJB) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1981/82, CJB) - Lichtenau (Braun leg. 1985/89, CBP) - Bad Lippspringe (Braun leg. 1988, CBP).
- SBL: Elberfeld (Hagens leg., WESTHOFF 1882, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Hückeswagen (Eigen leg. 1922/28/35, MKB, KOCH 1968) - Imhausen/Sieg (Appel leg. 1948, MKB) - Hagen (Lucht leg. 1949, HORION 1967; Drees leg. 1979/80/87, CDH) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1958, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1963, KOCH 1968) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1968, KOCH 1974) - Hösel (Hozman leg. 1970/72, CHE) - Möhnesee (Terlutter leg. 1980, CTM) - Westhofen (Drees leg. 1984, CDH) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1986/87/88, WENZEL 1988) - Olpe: Reichshof (Gerhard leg. 1987/88, CGR) - Plettenberg: Eiringhausen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Winterberg: Hallenberg (Grundmann leg. 1990, CGL) - Wipperfürth (Wenzel leg. 1990, CWR) - Hallenberg (Feldmann leg. 1991, CFM) - Herscheid: Elsen (Grundmann leg. 1991, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1993, CWR) - Ennepetal (Drees leg. 1995, CDH) - Olpe: Drolshagen (Gerhard leg. 1995, GERHARD 1997).

Myllaena dubia (Grav., 1806)

23-.123-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

- DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1956, CJB; Grundmann leg. 1980, CGL) - Dümmer: Hüde (Renner leg. 1983, CRB) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Grundmann, Terlutter leg. 1992, CGL, CTM; Feldmann leg. 1998, CFM).
- WTL: Oelde (Dahms leg. 1933, LMM) - Gütersloh: Barrelpäule/Brockhagen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Münster: Gimfte (Terlutter leg. 1982, CTM) - Gronau: Luchtbült (Terlutter leg. 1985, CTM) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Lüdinghausen: Olfen (Terlutter leg. 1992, CTM) - Zwillbrocker Venn (Grundmann leg. 1992, CGL) - Ahaus: NSG Graeser Venn (Terlutter leg. 1996, CTM).
- UWB.: Bad Salzuflen (Renner leg. 1976/78, CRB) - Bünde: Hücker Moor (Renner leg. 1984/92, CRB).
- OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Brakel: Bach Aa/Riesel (Renner leg. 1983, CRB) - Minden: Schaumburger Wald (Renner leg. 1983, CRB) - Godelheim/Weser (Renner leg. 1988, CRB).
- SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Hösel (Hozman leg. 1970/72, CHE) - Westhofen (Drees leg. 1980, CDH) - Brilon: Nehden (Renner leg. 1990, CRB) - Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Medebach (Röwekamp leg. 1996, CRE) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1998, CWR).

Myllaena intermedia Er., 1837

23-.123-.002-.

D.: in ganz Deutschland; häufigste Art der Gattung.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

- DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1963, CJB; Renner leg. 1981, CRB) - Hartum (Jankowski leg. 1976, CJB) - Dümmer: Hüde (Renner leg. 1983, CRB) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) - Häverner Marsch (Renner leg. 1985, CRB) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Feldmann leg. 1998, CFM) .
- WTL: Münster (Peetz leg. 1936, LMM, PEETZ 1937) - Borken: Burloer Venn (Renner leg. 1979, CRB) - Gütersloh: Barrelpäule/Brockhagen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Oerlinghausen: Senne (Grundmann leg. 1982, CGL) - Gronau: Goorbach (Terlutter leg. 1983/93, CTM) - Gronau: NSG Amtsvenn (Terlutter leg. 1984, CTM) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1985/96, CTM) - Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - West-Münsterland: Gronau (Renner leg. 1988, CRB) - Münster: Handorf (Grundmann leg. 1989, CGL) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1990, CRB) - Lüdinghausen: Olfen (Terlutter leg. 1992, CTM) - Ahaus: NSG Graeser Venn (Terlutter leg. 1996, CTM) - Münster: Westbevern (Köhler leg. 1997, CKB, KÖHLER 2000) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1999, CRB) .
- UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1936, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1955/64, CJB) - Holzhausen (Jankowski leg. 1957/59/61/75/77, CJB) - Bad Salzuflen (Renner leg. 1976, CRB) - Bielefeld: Jöllenberg (Renner leg. 1977, CRB) - Herford: Herringhausen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bünde: Hücker Moor (Renner leg. 1984, CRB) - Lengerich (Feldmann leg. 1991, CFM) - Osnabrück (Kache leg. 1992, KACHE 1998) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) .
- OWB: Paderborn: Haarstrang (Westhoff leg. 1875, LMM) - Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1974/81, CJB) - Dörentrup (Renner leg. 1976/77, CRB) - Brakel: Aa/Riesel (Renner leg. 1985, CRB) - Lichtenau (Braun leg. 1985, CBP) - Godelheim/Weser (Renner leg. 1988/91, CRB) - Ottbergen (Renner leg. 1991, CRB) - Warburg: Daseburg (Renner leg. 1994, CRB) .
- SBL: Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Elberfeld (CORNELIUS 1884) - Imhausen/Sieg (Appel leg. 1947, MKB) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Westhofen (Drees leg. 1987, CDH) - Hagen: Bathey (Drees leg. 1988, CDH) - Brilon (Renner leg. 1990, CRB) - Herscheid: Hüinghausen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Plettenberg: Eiringhausen (Grundmann leg. 1990/91, CGL) - Plettenberg (Erbeling leg. 1990/91, CErL) - Winterberg (Feldmann leg. 1990, CFM) - Attendorn: Borghausen (Grundmann leg. 1991, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Ennepetal (Drees leg. 1992, CDH) - Werdohl: Kettling (Grundmann leg. 1992, CGL) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Radevormwald (Wenzel leg. 1993, CWR) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1998, CWR; Renner leg. 2000, CRB) - Neheim (Elmer leg. 1998, CFM).

Myllaena kraatzi Shp., 1871

23-.123-.003-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: selten, aus UWB und OWB nicht gemeldet.

Moorbewohner.

DGN: Nettelstedter Moor (Peetz leg. 1935/36, LMM) - Hiller Moor (Jankowski leg. 1956/80/81, CJB).

WTL: Velener Moor (Peus leg., PEUS 1928, HORION 1967).

SBL: Düsseldorf: Hösel (Koch leg. 1958, KOCH 1968) - Hilden (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Solingen (Modrow leg. 1959, MKB).

Myllaena elongata (Matth., 1838)

23-.123-.004-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: keine Meldungen aus DGN, UWB.

In und an Bächen.

WTL: Vreden (Terlutter leg. 1983, CTM) - West-Münsterland: Gronau (Renner leg. 1988, CRB; Grundmann leg. 1992, CGL) - Billerbeck (Terlutter leg. 1995, CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1995, CRB).

OWB: Klein Möllenbeck (Jankowski leg. 1981, CJB) - Brakel: Aa/Riesel (Renner leg. 1985, CRB) - Brakel (Terlutter leg. 1986, CTM) - Scherfede: Hardehausen (Braun leg. 1986, CBP) - Godelheim/Weser (Terlutter leg. 1991, CTM).

SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884, WESTHOFF 1886) - Düsseldorf: Hösel (Koch leg. 1958, KOCH 1974; Hozman leg. 1970, CHE) - Düsseldorf: Neandertal (Koch leg. 1963, KOCH 1974) - Erkrath (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Köbach/Bröhl (Gräf leg. 1976, KÖHLER 1993, MKB) - Köbach/Bröhl (Gräf leg. 1976, KÖHLER 1993, MKB) - Hagen (Drees leg. 1983/94, DREES 1996, Drees leg. 1995, CDH) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1983, WENZEL 1988) - Rothaargebirge: Saalhausen (Terlutter leg. 1986, CTM) - Brilon (Renner leg. 1990, CRB) - Winterberg (Feldmann leg. 1990, CFM) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Radevormwald (Wenzel leg. 1993, CWR) - Medebach: Gelägebach (Terlutter leg. 1996, CTM) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1998, CWR).

Myllaena gracilicornis Fairm. Bris., 1859

23-.123-.005-.

D.: meist ältere Meldungen aus nur wenigen Gebieten.

Westf.: alle westfälischen Belege gehören zu *M. kraatzi*.

Myllaena brevicornis (Matth., 1838)

23-.123-.006-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: nur aus DGN noch nicht gemeldet.

WTL: Bochum (Hozman leg. 1971, CHE) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1990, CRB) - Hövelhof (Renner leg. 1990, CRB).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1957/65, CJB) - Neesen/Porta (Jankowski leg. 1963, CJB).

OWB: Klein Möllenbeck (Jankowski leg. 1970, CJB) - Körbecke (Kroker leg. 1978/79, KROKER & RENNER 1983) - Lemgo: Lattberg (Grundmann leg. 1981, CGL) - Schlangen (Braun leg. 1983, CBP) - Kohlstädt (Braun leg. 1985, CBP) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990, CWB) - Warburg: Scherfede (Terlutter leg. 1996, CTM).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1958/59/60/63, KOCH i.l.; Modrow leg. 1962, MKB) - Hilden (Koch leg. 1959/60/61/64/66, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1960/61/63/68, KOCH i.l.) - Ratingen: Tiefenbroich (Koch leg. 1962, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1964/65, KOCH i.l.) - Mettmann: Schöller (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Wissen/Sieg: Roth (Stock leg. 1971, CSR) - Gevelsberg (Drees leg. 1976, CDH) - Schmalleberg: Härdler (Terlutter leg. 1982, CTM) - Hagen (Drees leg. 1986/90, CDH) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1986, WENZEL 1988) - Iserlohn: Hemer (Renner leg. 1988, CRB) - Lennetal: Latrop (Terlutter leg. 1988, CTM) - Plettenberg: NSG Bommecketal (Terlutter leg. 1988, CTM) - Schmalleberg: Latrop-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL; Renner leg. 1988, CRB) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Brilon: Alme (Erbeling leg. 1990, CERL; Renner leg. 1990, CRB) - Herscheid: Hüinghausen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Neuenrade: Altenaffeln (Grundmann leg. 1990/91, CGL) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1990, CGL) - Herscheid: Elsen (Grundmann leg. 1991, CGL) Plettenberg: Almecke (Grundmann leg. 1991, CGL) - Altenkirchen (WAGNER 1992) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992/93, CWR) - Siegen: Friesenhagen (WAGNER 1992) - Wissen/Sieg: Gebhardshain (WAGNER 1992) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Hagen (Drees leg. 1993, CDH) - Iserlohn: Hemer (Terlutter leg. 1993, CTM) - Olpe: Drolshagen (Gerhard leg. 1995, GERHARD 1997) - Wetter/Ruhr: Wengern (Drees leg. 1995, CDH) - Nachrodt/Lenne (Feldmann leg. 1997, CFM) - Hohenlimburg (Drees leg. 2000, CDH).

Myllaena gracilis (Matth., 1838)

23-.123-.007-.

D.: fast in ganz Deutschland, meidet höheres Bergland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Nettelstedter Moor (Peetz leg. 1936, LMM) - Hiller Moor (Jankowski leg. 1957, CJB) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Saerbeck/Ems (PEETZ 1937, HORION 1967) - Gronau: Luchtbült (Terlutter leg. 1985, CTM) - Gronau: NSG Amtsvenn (Terlutter leg. 1988, CTM) - West-Münsterland: Gronau (Grundmann leg. 1992, CGL) - Ahaus: NSG Graeser Venn (Terlutter leg. 1996, CTM).

UWB: Holzhausen (Jankowski leg. 1967/75, CJB) - Bünde: Hücker Moor (Renner leg. 1984, CRB).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1982, CJB).

SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884, WESTHOFF 1886, KOCH 1968) - Ratingen (Koch leg. 1963, KOCH 1968).

Myllaena minuta (Grav., 1806)

23-.123-.008-.

D.: zerstreut in ganz Deutschland.

Westf.: Nachweise aus OWB fehlen.

- DGN: Nettelstedter Moor (Peetz leg. 1936, LMM) - Hiller Moor (Jankowski leg. 1982, CJB) - Recke: Wiechholzer Bach (Terlutter leg. 1996, CTM) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter, Feldmann leg. 1998, CTM, CFM).
- WTL: Haltern (Hozman leg. 1980, CHE) - Gütersloh: Barrelpäule/Brockhagen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Gronau: Luchtbült (Terlutter leg. 1985, CTM) - Herzebrock: Clarholz (Terlutter leg. 1986, CTM) - Ahaus: NSG Graeser Venn (Terlutter leg. 1996, CTM) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1998, CRE).
- UWB: Bünde: Hücker Moor (Renner leg. 1984/92, CRB).
- SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Hückeswagen (Eigen leg., MKB) - Hilden (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1998, CWR).

Myllaena infuscata Kr., 1853 23-123-009-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: Meldungen aus UWB und OWB fehlen.

DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1956, CJB).

WTL: Münster-Baumberge (Beyer leg. 1927, LMM) - Oelde (Dahms leg. 1933, LMM) - Saerbeck/Ems (Peetz leg. 1936, LMM) - Dorsten (Hozman leg. 1972, CHE).

SBL: Erkrath (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Neandertal (Koch leg. 1959, KOCH 1968) - Lintorf (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Hagen: Bathey (Drees leg. 1988/92, CDH) - Hagen: Herbecke (Drees leg. 1998, CDH) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1998, CWR).

Myllaena masoni Matth., 1883 23-123-010-

D.: bisher nur Baden (HOLLNAICHER & WUNDERLE 1987) und Schleswig-Holstein (LOHSE 1987).

Westf.: keine Meldung.

Pronomaea rostrata Er., 1837 23-125-001-

D.: selten in Süden und Mitte, nach Norden noch seltener; überwiegend nur alte Meldungen.

Westf.: nur eine sehr alte Meldung.

SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884, WESTHOFF 1886, KOCH 1968).

Pronomaea korgei Lohse, 1974 23-125-002-

D.: nur in wenigen westlichen Gebieten gefunden (KÖHLER 1997a).

Westf.: keine Meldung.

Oligota granaria Er., 1837 23-126-003-

D.: selten in Süden und Mitte, nach Norden noch seltener.

- Westf.: außer aus SBL nur wenige Funde.
- WTL: Lippstadt (WESTHOFF 1881).
- UWB: Porta/Weser (Peetz leg. 1935, LMM) - Osnabrück (Kache leg. 1993, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).
- OWB: Paderborn (WESTHOFF 1881).
- SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (WESTHOFF 1881) - Soest (VERHOEFF 1890, HORION 1967) - Witten (FÜGNER 1902) - Hagen: Loxbaum (Drees leg. 1990, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1995, CWR) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Lappann leg. 1998/99, CWR) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Lappann leg. 1999, CWR).
- Bielefeld (RENNER et al. 1986): Fehlbestimmung.

Oligota parva Kr., 1862

23-.126-.004-.

D.: fast in ganz Europa verbreitete Art.

Westf.: überall vertreten.

Im 19. Jahrhundert mit Erdnüssen importiert, heute allgemein häufig.

- DGN: Hartum (Jankowski leg. 1973/75/79, CJB) - Hiller Moor (Jankowski leg. 1976, CJB) - Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991) - Ovenstädt (Renner leg. 1984, CRB).
- WTL: Herzebrock: Clarholz (Terlutter leg. 1980, CTM) - Oerlinghausen: Senne (Grundmann leg. 1982, CGL) - Paderborn: Südsenne: (Renner leg. 1989/92/93/94/97/98, CRB) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1990, CRB) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1995/96, CRB).
- UWB: Holzhausen (Jankowski leg. 1956/77/79, CJB) - Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1977, CRB, RENNER 1979) - Bielefeld: Stadtgebiet (Renner leg. 1981/85, CRB) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Schildesche (Renner leg. 1982, CRB) - Herford: Herringhausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Minden: Wesertal (Renner leg. 1984, CRB) - Bielefeld: Lämershagen (Renner leg. 1985, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1987/88/89/98/2000, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1992/93, KACHE 1998).
- OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1978, CJB) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982/83, CRB, RENNER 1985) - Brakel: Riesel (Renner leg. 1983, CRB) - Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1983, CRB).
- SBL: Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1957 KOCH i.l.) - Düsseldorf-Gerresheim (Koch leg. 1959, KOCH 1968) - Solingen (Modrow leg. 1963, KOCH 1968) - Hagen (Drees leg. 1983/90, CDH, DREES 1991) - Arolsen: Landau (Renner leg. 1986, CRB) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1986, WENZEL 1988) - Finnentrop-Wildewiese (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988/90, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Plettenberg: Pasel (Grundmann leg. 1991, CGL) - Altenhudem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Waldbröl (Köhler leg. 1996, CKB).

Oligota inflata Mannh., 1830

23-.126-.006-.

D.: fast in ganz Deutschland, meidet höheres Bergland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Hartum (Jankowski leg. 1972/75/79/80, CJB) - Hiller Moor (Jankowski leg. 1980, CJB) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Lippstadt (Buddeberg leg., WESTHOFF 1881) - Dülmen (Hozman leg. 1977, CHE).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1965, CJB) - Bielefeld (SPÄH 1980) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984, CRB) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.).

OWB: Warburg: Hellberg/Scherfede (Renner leg. 1983, CRB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Ratingen (Koch leg. 1966/67, KOCH i.l.)- Radevormwald (Wenzel leg. 1991, CWR).

Oligota inexpectata Williams, 1994

23-.126-.0071.

D.: Hameln/Weserbergland.

Westf.: keine Meldung.

Unter den rund 200 Oligoten in der Jankowski-Sammlung wurde keine *O. inexpectata* entdeckt.

Düt bei Hameln (Assing leg. 1990, ASSING 1995).

Oligota pusillima (Grav., 1806)

23-.126-.008-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: nicht selten, aus OWB noch nicht gemeldet.

DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1969, CJB) - Dümmer: Hüde (Renner leg. 1983, CRB) Hopsten: NSG Heiliges Meer (Feldmann leg. 1998, CFM).

WTL: Soest (VERHOEFF 1890) - Wiedenbrück: Langenberg (Rehage leg., CRD, REHAGE 1972) - Oerlinghausen: Senne (Grundmann leg. 1982, CGL) - Lüdinghausen: Olfen (Terlutter leg. 1992, CTM) - Heek/Ahaus (Terlutter leg. 1994, CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1997, CRB) - Münster: Hiltrup (Feldmann leg. 1998, CFM).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935, LMM) - Porta/Weser (Peetz leg. 1935, LMM) - Herford: Herringhausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Oerlinghausen: Teutoburger Wald (Grundmann leg. 1982, CGL) - Osnabrück (Kache leg. 1993, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1998, CRB) - Bielefeld: Buschkamp (Renner leg. 2000, CRB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Solingen (Modrow leg. 1951, MKB) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1958/60, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1962, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1962, KOCH i.l.) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1962, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1964/65/67, KOCH i.l.) - Wuppertal (Pospischil leg. 1977, POSPISCHIL 1981) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1986, WENZEL 1988) -

Hagen: Loxbaum (Drees leg. 1990, CDH) - Plettenberg: Eiringhausen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Westhofen (Drees leg. 1990, CDH) - Altenhudem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL).

Oligota pumilio Kiesw., 1858

23-.126-.009-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1955/69, CJB) - Hartum (Jankowski leg. 1963/72/77/81, CJB) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Oelde (Dahms leg. 1936, LMM) - Essen (Hozman leg. 1970, CHE) - Haltern (Hozman leg. 1972, CHE) - Bielefeld-Eckardtsheim (Renner leg. 1974, CRB) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1978, CRB, RENNER 1980) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Haltern (Ahrens leg. 1992, KÖHLER i.l.) - Lüdinghausen: Olfen (Terlutter leg. 1992, CTM) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1994, CRB) - Münster (Feldmann leg. 1996, CFM) - Münster: Westbevern (Köhler leg. 1997, CKB, KÖHLER 2000) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 2000, CRB).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1956/57/68/69/76, CJB) - Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1975/76/77/78, CRB (RENNER 1981b)) - Holzhausen (Jankowski leg. 1977/79, CJB) - Herford: Herringhausen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Leopoldshöhe (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Schildesche (Renner leg. 1982, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995) - Osnabrück (Klaas leg. 1992, KACHE i.l., Kache leg. 1992/93, KACHE 1998) - Bielefeld: Stadtgebiet (Renner leg. 1995, CRB) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.) - Minden: Wesertal (Renner leg. 1995, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1998/2000, CRB) - Detmold: Lippischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1978, CJB) - Warburg: Hellberg/Scherfede (Renner leg. 1983, CRB) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91, CWB, SMB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Hagen (Drees leg. 1983, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1983/84/87/89/90, CWR) - Hagen: Garenfeld (Drees leg. 1984, CDH) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1986, WENZEL 1988) - Hohenlimburg (Drees leg. 1987, CDH) - Much (Wenzel leg. 1991, CWR) - Radevormwald (Wenzel leg. 1994, CWR).

Holobus flavicornis (Boisd.Lacord., 1835)

23-.1261.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: nicht selten, aus DGN noch nicht gemeldet.

Flugaktive Art.

WTL: Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991/92, CKB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993/94/98/99, CRB) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1996, CRB) - NSG Emsdettener Venn (Terlutter leg. 1996, CFM).

- UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1960, CJB) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Leopoldshöhe (Renner leg. 1982, CRB, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1987/89/96/98, CRB) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).
- OWB: Klein Möllenbeck (Jankowski leg. 1960, CJB) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1981, CJB) - Brakel (Renner leg. 1982, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Höxter: Ziegenberg (Grundmann leg. 1982, CGL) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982, CRB, RENNER 1985) - Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1983, CRB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).
- SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Ratingen: Tiefenbroich (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Herdecke (Drees leg. 1982, CDH) - Burscheid (Kolbe leg. 1985, KOLBE & BRUNS 1988, KÖHLER 1997, MKB) - Radevormwald (Wenzel leg. 1986, CWR) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1990, CGL) - Wuppertal (KOLBE 1994,1996) - Waldbröl (Köhler leg. 1996, CKB) - Hagen: Lennetal (Drees leg. 1999, CDH).

Holobus apicatus (Er., 1837)

23-.1261.002-.

D.: fast in ganz Deutschland, meidet höheres Bergland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

- DGN: Stemmer Berge (Kerstens leg 1954, LMO, HORION 1967) - Hartum (Jankowski leg. 1972, CJB) - Hiller Moor (Jankowski leg. 1980, CJB).
- WTL: Essen (Hozman leg. 1970, CHE) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993/98, CRB).
- UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1959/60/65/76, CJB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/89/98/2000, CRB) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).
- OWB: Klein Möllenbeck (Jankowski leg. 1960, CJB) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1979, CJB) - Bielefeld (Renner leg. 1984, CRB, RENNER et al.1986) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).
- SBL: Düsseldorf-Gerresheim (Koch leg. 1960, KOCH 1968) - Hösel (Hozman leg. 1970, CHE) - Hagen (Drees leg. 1984/95, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1987/89, WENZEL 1988, KOCH 1992) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Hohenlimburg (Drees leg. 1993, CDH).

Cypha longicornis (Payk., 1800)

23-.1262.001-.

D.: in ganz Deutschland; häufigste Art der Gattung.

Westf.: etliche Nachweise aus allen fünf Teilgebieten.

- DGN: Nettelstedter Moor (Peetz leg. 1936, LMM) - Holzhausen (Peetz leg. 1936, LMM) - Hiller Moor (Jankowski leg. 1955/80, CJB) - Dümmer: Hüde (Renner leg. 1983, CRB) - Oppenweher Moor (Grundmann, Ren-

ner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991) - Recke: NSG Recker Moor (Terlutter leg. 1993, CTM) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 1995, CTM).

- WTL: Dortmund (WESTHOFF 1881) - Lippstadt (WESTHOFF 1881) - Münster (WESTHOFF 1881) - NSG Deutener Moor (SIEDE 1977) - Senne: Stape-lage (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Salzkotten: Sültsoid (Renner leg. 1984, CRB) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1986, CTM) - Gronau: NSG Amtsvenn (Starke leg. 1989, CSW) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1992/93/95/98, CRB) - Ahlen (Starke leg. 1993, CSW) - Ahaus: Butenfeld (Terlutter leg. 1994, CTM).
- UWB: Mennighüffen (BARNER 1922) - Eickum (Barner leg., LMM) - Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1934, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1951/56/62/70, CJB) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Bielefeld: Stadtgebiet (Renner leg. 1982/83, CRB) - Herford: Herringhausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983/89/99, CRB) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995) - Osnabrück (Klaas leg. 1992, KACHE i.l., Kache leg. 1992/93, KACHE 1998) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.) - Detmold: Lippischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).
- OWB: Paderborn (WESTHOFF 1881) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1976, CJB) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982, CRB, RENNER 1985) - Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1983, CRB) - Lichtenau: Altenau-Tal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990, CWB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).
- SBL: Arnsberg (Varendorff leg., WESTHOFF 1881) - Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Siegen (WESTHOFF 1881) - Witten (WESTHOFF 1881, FÜGNER 1902) - Hagen (Drees leg. 1983/89/93/2000, CDH) - Letmathe (Drees leg. 1985/86, CDH; ERBELING & DREES 1992) - Iserlohn (Erbeling leg. 1986, ERBELING & DREES 1992) - Radevormwald (Wenzel leg. 1986, CWR) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Plettenberg: Böhl (Grundmann leg. 1991, CGL) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel leg. 1998, CWR).

Cypha imitator (Luze, 1902)

23-.1262.002-.

D.: bisher nur in ganz wenigen Gebieten.

Westf.: nur ein Fund.

UWB: Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1999, CRB, RENNER 1999).

Cypha laeviuscula (Mannh., 1830)

23-.1262.005-.

D.: in ganz Deutschland, nach Osten seltener.

Westf.: einzelne Nachweise aus allen fünf Teilgebieten.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991).

- WTL: Münster (Treuge leg., WESTHOFF 1881) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1990, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1997, CRB).
- UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1977, CJB) - Herford: Herringhausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/88/89/98, CRB).
- OWB: Paderborn-Wewer (Renner leg. 1981) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1983, CRB).
- SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Witten (FÜGNER 1902) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1955, MKB) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1987, WENZEL 1988, 1991, KOCH 1992) - Hagen (Drees leg. 1989, CDH) - Wipperfürth (Wenzel leg. 1989/90, WENZEL 1991) - Herscheid: Voßhelle (Grundmann leg. 1990, CGL) - Hückeswagen (Wenzel leg. 1990, WENZEL 1991) - Lindlar (Wenzel leg. 1990, WENZEL 1991) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1990, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1990, CGL) - Wiblingwerde (Drees leg. 1990, CDH) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL).

Cypha tarsalis (Luze, 1902) 23-.1262.006-.

D.: vereinzelte Funde aus fast ganz Deutschland

Westf.: nur ein Fund.

OWB: Scherfede: Scheffelberg (Großkopf leg. 1986, CGL).

Cypha ovulum (Heer, 1839) 23-.1262.007-.

D.: nur vereinzelte Meldungen aus dem Rheinland, Süden und Osten.

Westf.: keine Meldung.

Cypha discoidea (Er., 1839) 23-.1262.008-.

D.: in ganz Deutschland, meidet höhere Gebirge.

Westf.: einzelne Meldungen aus allen fünf Teilgebieten.

Besonders hygrophile Art.

DGN: Hopsten: NSG Heiliges Meer (Grundmann leg. 1992, CGL).

WTL: Münster (Reeker leg. 1885, REEKER 1887, HORION 1967) - Münster: Uhlenkotten (Löns leg. 1885, REEKER 1887, HORION 1967).

UWB: Holzhausen (Jankowski leg. 1958/77, CJB) - Bad Salzuflen: Bexter Wald (Grundmann leg. 1980, CGL) - Herford: Füllenbruch (Grundmann leg. 1980, CGL, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1989, CRB).

OWB: Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982, CRB, RENNER & GRUNDMANN 1984, RENNER 1985).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Düsseldorf: Angermund (Koch leg. 1956/62, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Wipperfürth (Wenzel leg. 1990, WENZEL 1991) - Much: Herrensee (Wenzel leg. 1991, CWR, WENZEL 1991).

- Cypha nitida* (Palm, 1935) 23-.1262.010-
 D.: vom Rhein bis nach Sachsen nur in wenigen Gebieten.
 Westf.: keine Meldung.
 Solling: Bodenfelde (Renner leg. 1974, CRB).
- Cypha seminulum* (Er., 1839) 23-.1262.011-
 D.: nicht aus allen Gebieten gemeldet.
 Westf.: einzelne Meldungen aus fast allen Teilgebieten.
 DGN: Hartum (Jankowski leg. 1974, CJB) - Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, RENNER et al. 1986, GRUNDMANN 1991).
 WTL: Lippstadt (Buddeberg leg., WESTHOFF 1881).
 UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg., LMM).
 SBL: Arnsberg (Varendorff leg., WESTHOFF 1881) - Siegen (Suffrian leg., WESTHOFF 1881) - Elberfeld (CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Witten (FÜGNER 1902) - Düsseldorf: Angermund (Koch leg. 1962, KOCH i.l.).
- Cypha pulicaria* (Er., 1839) 23-.1262.012-
 D.: vereinzelt fast in ganz Deutschland, meidet höhere Gebirge.
 Westf.: wenige Funde aus OWB und SBL.
 OWB: Paderborn-Wewer (Renner leg. 1981, CRB, RENNER 1985).
 SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Neviges (ROSSI 1898) - Hagen (Drees leg. 1981/90, CDH) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1984, WENZEL 1988, KOCH 1992) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Much: Herrensee (Wenzel leg. 1991, CWR, WENZEL 1991).
- Cypha hanseni* (Palm, 1949) 23-.1262.013-
 D.: fast in ganz Deutschland, besonders in Mitte und Norden.
 Westf.: wenige Funde.
 DGN: Hartum (Jankowski leg. 1982 CJB).
 UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1980, CJB).
 OWB: Klein Möllenbeck (Jankowski leg. 1960, CJB).
 SBL: Radevormwald (WENZEL 1988): Fehlbestimmung
- Cypha punctum* (Motsch., 1857) 23-.1262.014-
 D.: vereinzelt, besonders in Mitte und Norden.
 Westf.: nur zwei Funde aus SBL.
 SBL: Solingen: Ohligs (Koch leg. 1961, KOCH 1968) - Waldbröl (Köhler leg. 1996, CKB).
- Hygronoma dimidiata* (Grav., 1806) 23-.127-.001-
 D.: in ganz Deutschland.
 Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

Bewohner der Schilfzone.

- DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1955/82, CJB, Grundmann leg. 1980, CGL) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).
- WTL: Münster (Kolbe leg. 1878, LMM, WESTHOFF 1881) - Oelde (Dahms leg. 1933, LMM) - Münster (Peetz leg. 1935, LMM, PEETZ 1937) - NSG Deutener Moor (SIEDE 1977) - Tatenhausen/Halle (Renner leg. 1979, CRB) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1983/86, CTM) - Paderborn-Schloß Neuhaus (Braun leg. 1984, CBP) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1988, CRB) - Warendorf (Starke leg. 1993, CSW).
- UWB.: Holzhausen (Jankowski leg. 1961/67/74/77, CJB).
- OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1981/82, CJB) - Minden: Schaumburger Wald (Renner leg. 1983, CRB) - Lichtenau (Terlutter leg. 1984, CTM).
- SBL: Düsseldorf: Angermund (Koch leg. 1955/57/58/60, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1957/58/59/60/62/63/64 KOCH i.l.) - Lintorf (Koch leg. 1957/58/59/61/62, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1958/59/60/64, KOCH i.l.) - Gerresheim (Koch leg. 1958/61/63, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1958, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1958, KOCH i.l.) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1958, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1960/62/64, KOCH i.l.) - Mettmann: Schöller (Koch leg. 1960/64, KOCH i.l.) - Gruiten (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Hagen (Drees leg. 1978/82/87, CDH) - Möhnesee (Terlutter leg. 1980, CTM) - Hückeswagen (Wenzel leg. 1986, WENZEL 1991) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1986/87/89, WENZEL 1988) - Wipperfürth (Wenzel leg. 1986, WENZEL 1991) - Attendorn (Erbeling leg. 1991, CERL; Grundmann leg. 1991, CGL) - Lennestadt (Feldmann leg. 1991, CFM) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1992, WENZEL 1997) - Ennepetal (Drees leg. 1995, CDH) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Lappann leg. 1998, CWR).

Brachida exigua (Heer, 1839)

23-.128-.001-.

D.: in Süden und Mitte an Wärmestellen.

Westf.: nur wenige Funde aus OWB und SBL.

Bewohner xerothermer Hänge.

- OWB: Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1978, CRB, RENNER 1981a) - Körbecke (Kroker leg. 1979, KROKER & RENNER 1983) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1992/93/94, FELDMANN & LÜCKMANN 1998).
- SBL: Iserlohn (Erbeling leg. 1986, ERBELING & DREES 1992) - Letmathe (Drees leg. 1986, CDH, ERBELING & DREES 1992).

Encephalus complicans Steph., 1832

23-.129-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, aus DGN noch nicht gemeldet.

- WTL: Bochum (Hozman leg. 1971, CHE) - Münster (Hozman leg. 1980/86, CHE) - Delbrück: Anreppen (Braun leg. 1982, CBP) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1985, CRB, RENNER 1987) - Telgte: Westbevern (Terlutter leg. 1986, CTM) - Vreden: NSG Ellewicker Feld (Terlutter leg. 1991, CTM) - Lüdinghausen: Olfen (Terlutter leg. 1992, CTM).
- UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935, LMM) - Werther (Pohl-Apel leg. 1985, CRB, POHL-APEL & RENNER 1987) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.).
- OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1980, CRB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).
- SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1960/61, KOCH i.l.) - Lintorf (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Mettmann: Schöller (Koch leg. 1961/67, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1962, KOCH i.l.) - Gruiten (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Hagen (Drees leg. 1977/83/90, CDH) - Iserlohn (Erbeling leg. 1986, ERBELING & DREES 1992) - Altenkirchen/Sieg (Terlutter leg. 1989, CFM) - Letmathe: Silbersee (Grundmann leg. 1989, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Neuenrade: Altenaffeln (Grundmann leg. 1990, CGL) - Herscheid: Elsen (Grundmann leg. 1991, CGL) - Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1992, WENZEL 1997) - Letmathe (ERBELING & DREES 1992) - Radevormwald (Wenzel leg. 1993, CWR) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1997/98, CWR).

Gyrophana pulchella Heer, 1839 23-.130-.002-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: Meldungen lückenhaft.

Bevorzugt an Trichterlingen.

WTL: Münster (REEKER 1887) - Oelde (DAHMS 1928).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1966/75, CJB, RENNER 1997b).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1965, MKB).

Gyrophana obsoleta Ganglb., 1895 23-.130-.003-.

D.: in Süden und Mitte.

Westf.: bisher kein Beleg.

Bevorzugt an Trichterlingen.

Vogelsberg (MÜLLER 1973).

Gyrophana affinis Mannh., 1830 23-.130-.004-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

An zahlreichen Pilzarten.

- DGN: Holzhausen (Peetz leg. 1936, LMM) - Lübbecke: Fiestel (Renner leg. 1978, CRB) - Hiller Moor (Grundmann leg. 1981, CGL) - Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991) - Recke: Recker Moor (Starke, Grundmann leg. 1993, CSW, CGL) - Hopsten: NSG Halverder Moor (Terlutter leg. 1998, CTM) - Hopsten: NSG Trogbahn (Feldmann leg. 1998, CFM).
- WTL: Lippstadt (WESTHOFF 1881) - Oelde (Dahms leg. 1932/35, LMM) - Bochum (Hozman leg. 1972, CHE) - Wiedenbrück: Langenberg (Rehage leg., CRD, REHAGE 1972) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1978, CRB, RENNER 1980) - Münster: Wolbecker Tiergarten (Rehage leg. 1978, CRD) - Senne: Furlbachtal (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1990/93/95/96, CRB) - Münster: Davert (Terlutter leg. 1990, CTM) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1993, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993/94/95/96/98/99/2000, CRB).
- UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1956/65/75/76, CJB) - Bielefeld: Brönninghausen (Grundmann leg. 1979, CGL) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Grundmann leg. 1979, CGL) - Bielefeld: Niederdornberg (Grundmann leg. 1981, CGL) - Halle: Borgholzhausen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/88/89/98/99/2000, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 2000, CRB) - Detmold: Lippischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).
- OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1979/80, CJB) - Warburg: Heiningberg/Ossendorf (Renner leg. 1982, CRB) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1983, CRB) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/92, CWB) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB).
- SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Witten (FÜGNER 1902) - Lintorf (Koch leg. 1960/61/63, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1960/62, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Angermund (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Engelskirchen (Appel leg. 1974, MKB) - Hagen (Drees leg. 1980/81, CDH) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1985/86, WENZEL 1988) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Brilon: Alme (Grundmann leg. 1990, CGL) - Wissen/Sieg: Gebhardshain (WAGNER 1992) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Radevormwald (Wenzel leg. 1993, CWR, WENZEL 1994) - Wiblingwerde: Nachrodt (Terlutter leg. 1994, CTM).

Gyrophana rousi Dvorak, 1966

23-130-0041.

D.: nur in der Hälfte aller Teilgebiete gefunden.

Westf.: nur ein Fund aus DGN.

DGN: Oppenweher Moor (Renner leg. 1985, CRB, RENNER 1991).

Gyrophæna rosskotheni Wüsth., 1937 23-.130-.005-.
D.: Baden, Rheinland, Brandenburg.
Westf.: eine Meldung von der Peripherie des Gebietes.
Düsseldorf-Lohausen (Koch leg. 1960, KOCH 1968).

Gyrophæna nana (Payk., 1800) 23-.130-.006-.
D.: in ganz Deutschland.
Westf.: in allen fünf Teilgebieten.
An zahlreichen Pilzarten.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Feldmann leg. 1998, CFM) - Hopsten: NSG Trogbahn (Feldmann leg. 1998, CFM).

WTL: Münster (Kolbe leg. 1875, LMM, WESTHOFF 1881) - Bocholt (WESTHOFF 1881) - Wadersloh (Dahms leg. 1926, DAHMS 1928) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Vreden: NSG Ellewicker Feld (Terlutter leg. 1987, CTM) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1988, CTM) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1994/99, CRB).

UWB: Mennighüffen (Barner leg. 1911, BARNER 1922, PEETZ 1931, LMM) - Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1934, 1935, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1975, CJB) - Bielefeld: Niederdornberg (Grundmann leg. 1981, CGL) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1998/99, CRB).

OWB: Paderborn (WESTHOFF 1881) - Klein Möllenbeck (Jankowski leg. 1963/77, CJB) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1982, CJB) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990, CWB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Witten (WESTHOFF 1881) - Elberfeld (CORNELIUS 1884) - Witten (FÜGNER 1902) - Solingen (Modrow leg. 1953/69, MKB; Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1955, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1955, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1962, KOCH i.l.) - Köbach/Bröhl (Gräf leg. 1976, MKB) - Wuppertal (KOLBE 1978) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1980/88, WENZEL 1988) - Hagen (Drees leg. 1982, CDH) - Attendorn-Echternhagen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel leg. 1998, CWR).

Gyrophæna rugipennis Muls.Rey, 1861 23-.130-.008-.
D.: nur aus wenigen Gebieten gemeldet, in der Lausitz weit verbreitet (RUSCH 1990).
Westf.: nur bei Barkhausen/Porta gefunden.
UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1956/59/66, CJB).

Gyrophæna gentilis Er., 1839 23-.130-.009-.
D.: in ganz Deutschland.

Westf.: häufig, aber aus DGN noch nicht gemeldet.

An zahlreichen Pilzarten.

WTL: Bochum (Hozman leg. 1970/72, CHE) - Senne (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Münster: Lövelingloh (Terlutter leg. 1986, CTM) - Haltern (Starke leg. 1989, CSW) - Münster: Davert (Feldmann leg. 1989, CFM, Terlutter leg. 1990, CTM) - Münster: Wolbeck (Renner leg. 1991, CRB, Köhler leg. 1991/92, CKB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1999, CRB).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1948/76/78, CJB) - Neesen/Porta (Jankowski leg. 1975, CJB) - Bielefeld: Bröninghausen (Grundmann leg. 1980, CGL) - Bielefeld: Niederdornberg (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Grundmann leg. 1981, CGL) - Detmold: Berlebeck (Grundmann leg. 1981, CGL) - Halle: Borgholzhausen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1987/99/2000, CRB) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 2000, CRB) - Detmold: Lippischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Klein Möllenbeck (Jankowski leg. 1956, CJB) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1974/79/80/81, CJB) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1983, CRB) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990, CWB) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Elberfeld (GEILENKEUSER 1896) - Solingen (Modrow leg. 1953, MKB) - Düsseldorf: Angermund (Koch leg. 1956/61/62, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1958 KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1958 KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1960/63, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Lintorf (Koch leg. 1961/62, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Breckerfeld (Drees leg. 1975, CDH) - Bottrop (Hozman leg. 1981, CHE) - Hohenlimburg (Drees leg. 1981, CDH) - Schmallenberg: Härdler (Terlutter leg. 1983, CTM) - Lünen: Cappenberg Wald (Terlutter leg. 1984, CTM) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Sundern: Allendorf (Grundmann leg. 1989, CGL) - Brilon: Alme (Grundmann leg. 1990, CGL, Renner leg. 1990, CRB) - Hagen: Haspe (Drees leg. 1992, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992/93, CWR, WENZEL 1994) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel, Lappann leg. 1997/98, CWR).

Gyrophæna poweri Crotch, 1866

23-.130-.010-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: selten, aus WTL und OWB noch nicht gemeldet

An zahlreichen Pilzarten.

DGN: Hartum (Jankowski leg. 1967, CJB).

UWB: Eickum (Barner leg. 1930, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1954, CJB) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Grundmann leg. 1978, CRB) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Grundmann leg. 1980, CGL, RENNER & GRUNDMANN 1984).

SBL: Elberfeld (Neumann leg., KOCH 1968) - Breckerfeld (Drees leg. 1975, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1980/86/87, WENZEL 1988, KOCH 1992) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (Stumpf leg. 1987, KOCH 1992, STUMPF 1993) - Hagen (Drees leg. 1992, CDH).

Gyrophaena minima Er., 1837

23-130-011-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

Häufig am Stockschwämmchen.

DGN: Hartum (Jankowski leg. 1979, CJB) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 1994, CTM).

WTL: Bochum (Hozman leg. 1972, CHE) - Senne: Furlbachtal (Grundmann leg. 1981, CGL) - Münster: Davert (Terlutter leg. 1984/90, CTM) - Vreden: NSG Ellewicker Feld (Terlutter leg. 1988, CTM) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1994/97, CRB).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1956/58/76, CJB) - Halle: Borgholzhausen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1982/89/98/2000, CRB) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 2000, CRB) - Detmold: Lip-pischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1966/79, CJB) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982, CRB, RENNER 1985) - Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1983, CRB) - Scherfede: Hardehausen (Grundmann leg. 1989, CGL) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hückeswagen (Eigen leg., MKB) - Hilden (Koch leg. 1957/58/59, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1958, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1958/59/62, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1960/63, KOCH i.l.) - Lintorf (Koch leg. 1960/61/62, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1960/62/63, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Angermund (Koch leg. 1962, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1965, MKB) - Wuppertal (KOLBE 1972, 1978) - Bottrop (Hozman leg. 1981, CHE) - Finnentrop-Wildewiese (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Plettenberg: Soen (Grundmann leg. 1989, CGL) - Brenscheid (Drees leg. 1993, CDH) - Radevormwald (WENZEL 1994) - Wiblingwerde: Nachrodt (Terlutter leg. 1994, CTM) - Waldbröl (Köhler leg. 1996, CKB).

Gyrophaena munsteri Strand, 1935

23-130-012-

D.: in Bayern, Pfalz, am Niederrhein, bei Hannover.

Westf.: keine Meldung.

Gyrophæna congrua Er., 1837
D.: im Norden, sonst nur wenige Funde.
Westf.: keine Meldung.

23-.130-.013-.

Gyrophæna williamsi Strand, 1935
D.: vereinzelt Meldungen aus fast ganz Deutschland.
Westf.: nur sehr wenige Funde.
An roten Ritterlingen.

23-.130-.015-.

- WTL: Hövelhof/Senne (Renner leg. 1980, CRB, RENNER 1981a) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB).
UWB: Bielefeld: Lämershagen (Grundmann leg. 1981, CGL, RENNER & GRUNDMANN 1984).
SBL: Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL).

Gyrophæna fasciata (Marsh., 1802)
D.: in ganz Deutschland.
Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

23-.130-.016-.

An zahlreichen Pilzarten.

- DGN: Hopsten (Starke leg. 1989, CSW).
WTL: Dortmund (Suffrian leg., WESTHOFF 1881) - Lipstadt (WESTHOFF 1881) - Oelde (Dahms leg. 1924, LMM, DAHMS 1928) - Bochum (Hozman leg. 1972, CHE) - Essen (Hozman leg. 1972, CHE) - Senne (Grundmann leg. 1981, CGL) - Münster: Wolbeck (Köhler, Renner leg. 1991, CKB, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1998/99, CRB).
UWB: Preuß. Oldendorf (Peez leg. 1935, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1956/59/72/75/78/79, CJB) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1999, CRB).
OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1975/80, CJB).
SBL: Arnsberg (Varendorff leg., WESTHOFF 1881) - Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Witten (FÜGNER 1902) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1955/58/63, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1955, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1957, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1959/63, KOCH i.l.) - Gruiten (Koch leg. 1960/62/63, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Lintorf (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Angermund (Koch leg. 1962, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1986/87, WENZEL 1988) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Sundern-Langscheid (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Brilon: Alme (Grundmann leg. 1990, CGL) - Hagen (Drees leg. 1992, CDH) - Wuppertal (KOLBE 1992, 1994, 1996) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel leg. 1998, CWR).

Gyrophæna bihamata Thoms., 1867 23-.130-.017-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

An zahlreichen Pilzarten.

DGN: Hopsten: NSG Trogbahn (Feldmann leg. 1998, CFM).

WTL: Vohren-Klarendorf (Dahms leg. 1930, LMM) - Bochum (Hozman leg. 1970, CHE) - Coesfeld (Hozman leg. 1974, CHE) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1990, CRB) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1994/96/99, CRB).

UWB: Mennighüffen (Barner leg. 1910, BARNER 1922, PEETZ 1931, LMM) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/89, CRB).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1980, CJB).

SBL: Solingen: Ohligs (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Iserlohn: Hemer (Renner leg. 1988, CRB) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992).

Gyrophæna lucidula Er., 1837 23-.130-.018-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: selten, aus DGN und OWB noch nicht gemeldet.

WTL: Saerbeck/Ems (Peetz leg. 1936, PEETZ 1937, LMM).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935, LMM) - Holzhausen (Jankowski leg. 1965/75, CJB) - Neesen/Porta (Jankowski leg. 1965, CJB) - Minden: Holzhausen (Jankowski leg., CJB, HORIZON 1967).

SBL: Wuppertal (GEILENKEUSER 1925) - Düsseldorf: Gruiten (Koch leg. 1960, KOCH 1968) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1963, KOCH i.l.).

Gyrophæna transversalis Strand, 1939 23-.130-.019-.

D.: Nordrhein, bei Hildesheim, im Hamburger Gebiet.

Westf.: ein Fund vom Rande des SBL.

SBL: Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1965, KOCH 1992).
Hildesheim (ASSING 1998a)

Gyrophæna joyi Wendeler, 1924 23-.130-.020-.

D.: vereinzelt Meldungen aus fast ganz Deutschland.

Westf.: erst wenige Meldungen.

An zahlreichen Pilzarten.

WTL: Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1985, CTM) - Warendorf (Starke leg. 1995, CSW) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1996, CRB).

SBL: Düsseldorf: Hösel (Koch leg. 1961, KOCH 1968) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL).

Gyrophæna joyioides Wüsth., 1937

23-.130-.021-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen allen fünf Teilgebieten, eine der häufigsten Arten.

An zahlreichen Pilzarten.

DGN: Hopsten: NSG Heiliges Meer (Rehage leg. 1973, CRD) - Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991).

WTL: Essen (Riechen leg. 1916, MKB) - Bochum (Hozman leg. 1972, CHE) - Schloß Holte-Stukenbrock (Renner leg. 1977, CRB) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1978, CRB, RENNER 1980) - Herzebrock: NSG Merschwald (Terlutter leg. 1981, CTM) - Senne (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1985, CTM) - Münster: Lövelingloh (Terlutter leg. 1986, CTM) - Münster: Wolbeck (Starke leg. 1987 CSW) - Münster: Davert (Feldmann leg. 1989, CFM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1989/92/93/94/95/96/99, CRB) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1990/93/95/96, CRB) - Münster: Davert (Terlutter leg. 1990, CTM) - Münster: Wolbeck (Renner leg. 1991, CRB, Köhler leg. 1991/92, CKB) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1993, CRB).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1976/78/79, CJB) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1982) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Leopoldshöhe (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983/84/87/88/89/99/2000, CRB) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 2000, CRB) - Detmold: Lippischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Klein Möllenbeck (Jankowski leg. 1963, CJB) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1975/79/80, CJB) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1982, CRB) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982, CRB, RENNER 1985) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990, CWB) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Hagen (Drees leg. 1981/90, CDH) - Lünen: Cappenberger Wald (Terlutter leg. 1984, CTM) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1986, WENZEL 1988) - Langscheid/Sorpese (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Waldbröl (Gerhard leg. 1988, CGR) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Brilon: Alme (Grundmann leg. 1990, CGL, Renner leg. 1990, CRB) - Plettenberg: Eiringhausen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Hagen: Haspe (Drees leg. 1992, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992/93, CWR) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Wuppertal (KOLBE 1996).

Gyrophæna angustata (Steph., 1832)

23-.130-.022-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: Funde nur aus WTL, UWB, SBL.

Besonders an Baumpilzen.

WTL: Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1998/99, CRB).

- UWB: Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1989, CRB) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Detmold: Lippischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).
- SBL: Elberfeld (Hagens leg., WESTHOFF 1882, CORNELIUS 1884) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1955, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1955//61, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1955/56/63/64, KOCH i.l.) - Solingen (Modrow leg. 1957, MKB) - Düsseldorf: Angermund (Koch leg. 1960/61, KOCH i.l.) - Lintorf (Koch leg. 1962, KOCH i.l.) - Radevormwald (Wenzel leg. 1979/80/88, WENZEL 1988) - Wiblingwerde: Nachrodt (Terlutter leg. 1994, CTM) - Hemer: NSG Felsenmeer (Terlutter leg. 1997, CTM).

Gyrophana strictula Er., 1839

23-.130-.023-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

Besonders am Eichen-Wirrling.

- DGN: Lübbecke: Fiestel (Renner leg. 1978, CRB).
- WTL: Oelde (Dahms leg. 1933, LMM) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1994/98/99, CRB).
- UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1956, CJB) - Bielefeld: Brönninghausen (Grundmann leg. 1980, CGL) - Bielefeld: Niederdornberg (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Grundmann leg. 1981, CGL) - Kalletal/Lippe (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1987/99/2000, CRB) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).
- OWB: Klein Möllenbeck (Jankowski leg. 1960/82, CJB) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1978, CJB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).
- SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Witten (FÜGNER 1902) - Siegtal (Appel leg. 1947, MKB) - Lintorf (Koch leg. 1957, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1960/64, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1968, KOCH i.l.; Hozman leg. 1970, CHE) - Solingen (Modrow leg. 1969, MKB) - Engelskirchen (Appel leg. 1974, MKB) - Hagen (Drees leg. 1977/89/92, CDH) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1986, WENZEL 1988) - Plettenberg (Terlutter leg. 1988, CTM) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992/93, CWR, WENZEL 1994; Wenzel leg. 1996, CWR) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Waldbröl (Köhler leg. 1996, CKB) - Wuppertal (KOLBE 1996) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Lappann leg. 1998, CWR).

Gyrophana polita (Grav., 1802)

23-.130-.024-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, in DGN nicht nachgewiesen.

An zahlreichen Baumschwämmen.

- WTL: Lippstadt (Buddeberg leg., WESTHOFF 1881) - Essen (Hozman leg. 1970, CHE) - Schloß Holte-Stukenbrock (Renner leg. 1975, CRB) -

- Münster: Wolbecker Tiergarten (Rehage leg. 1978, CRD; Köhler leg. 1991, CKB) - Münster: Ostbevern (Starke leg. 1995, CSW).
- UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1965/66, CJB) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Grundmann leg. 1981, CGL) - Kalletal/Lippe (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1987, CRB) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).
- OWB: Klein Möllenbeck (Jankowski leg. 1982, CJB) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1982, CRB) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1982, CJB).
- SBL: Ratingen (Koch leg. 1956, KOCH 1968) - Solingen (Modrow leg. 1956, KÖHLER 1993, MKB) - Hilden (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Mettmann: Schöller (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Lintorf (Koch leg. 1965, KOCH i.l.) - Hückeswagen (Wenzel leg. 1990, CWR) - Wiblingwerde: Nachrodt (Terlutter leg. 1994, CTM) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel, Lappann leg. 1997/98, CWR) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1998, CWR).

Gyrophana boleti (L., 1758)

23-.130-.025-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, aber in DGN nicht nachgewiesen.

An zahlreichen Baumschwämmen.

- WTL: Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1995/99/2000, CRB).
- UWB: Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/85/87/2000, CRB) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 2000, CRB).
- OWB: Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1982, CRB) - Lichtenau: Altenautal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990, CWB) - Warburg: Scherfede (Feldmann, Terlutter leg. 1996, CFM, CTM) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).
- SBL: Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1968, KOCH 1974) - Radevormwald (Wenzel leg. 1980/96, CWR) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (Stumpf leg. 1987, KOCH 1992, STUMPF 1993) - Winterberg: Hallenberg (Grundmann leg. 1990, CGL) - Hallenberg (Feldmann leg. 1991, CFM) - Hagen (Drees leg. 1998, CDH).

Agaricochara latissima (Steph., 1832)

23-.1301.001-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: nur aus DGN nicht gemeldet.

An Baumschwämmen.

- WTL: Oelde (Dahms leg. 1935, LMM) - Essen (Hozman leg. 1970, CHE) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1980, CRB) - Münster: Mecklenbeck (Terlutter leg. 1986, CTM) - Münster: Davert (Terlutter leg. 1990/91, CTM) - Münster: Nienberge (Feldmann leg. 1990, CFM, Terlutter leg. 1993, CTM) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB, Renner leg.

- 1991, CRB) - Borken (Terlutter leg. 1993, CFM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1995, CRB).
- UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935/36, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1954/68/75/77/78, CJB) - Neesen/Porta (Jankowski leg. 1954, CJB) - Barkhausen (Jankowski leg., HORION 1967) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1995, CRB).
- OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1966/75/82, CJB) - Nammener Wald (Jankowski leg., HORION 1967) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).
- SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1955/56, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Angermund (Koch leg. 1960/61/62, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1960/62, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1960/63, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1961, KOCH i.l.; Hozman leg. 1970/77, CHE) - Lintorf (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Engelskirchen (Appel leg. 1971, MKB) - Hönnetal (REHAGE & FELDMANN 1977) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1983/84/85/86, WENZEL 1988) - Altenkirchen: Katzwinkel (Terlutter leg. 1986, CTM) - Solingen (KOLBE 1987, 1992) - Hagen (Drees leg. 1988/90/92/93, CDH) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Marienheide/Gimborn (Wenzel leg. 1990, CWR) - Wipperfürth (Wenzel leg. 1990, CWR) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992/93, CWR, WENZEL 1994) - Westerwald: Altenkirchen (WAGNER 1992) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel, Lappann leg. 1997/98, CWR) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1999, CWR).

Cyphea curtula (Er., 1837) 23-.131-.001-

D.: fast in ganz Deutschland, überall sehr selten.

Westf.: wenige Funde aus UWB, SBL.

In morschen Laubhölzern.

UWB: Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).

SBL: Düsseldorf: Angermund (Koch leg. 1958, KOCH i.l.) - Solingen (Gräf leg. 1981, KOCH 1992) - Hagen: Lennetal (Drees leg. 1988, CDH) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992).

Placusa complanata Er., 1839 23-.132-.001-

D.: fast in ganz Deutschland, nach Norden seltener.

Westf.: nur zwei Funde aus SBL.

Unter Nadelholzrinden.

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, 1886, CORNELIUS 1884) - Ratingen (Koch leg. 1960, KOCH 1968).

Placusa depressa Maekl., 1845 23-.132-.002-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, nur in OWB nicht nachgewiesen.

Unter Nadelholzzrinden.

- DGN: Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 1998, CTM) - Ibbenbüren: Uffeln (Terlutter leg. 1999, CTM).
- WTL: Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1978, CRB, RENNER 1980) - Heek/Ahaus: NSG Füchte-Kallenbeck (Terlutter leg. 1986, CTM) - Münster: Gimfte (Feldmann leg. 1990, CFM) - Münster: Davert (Feldmann leg. 1991/92, CFM) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1996, CRB) - Ibbenbüren: Uffeln (Terlutter leg. 1999, CTM).
- UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1936, LMM) - Ibbenbüren (Feldmann leg. 1990, CFM) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1994, CRB).
- SBL: Hösel (Hozman leg. 1972, CHE) - Solingen (Gräf leg. 1982, MKB) - Hagen: Loxbaum (Drees leg. 1988, CDH) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992).

Placusa tachyporoides (Waltl, 1838)

23-.132-.003-.

D.: in ganz Deutschland; häufigste Art der Gattung.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten, häufig.

Unter Rinde von Laubbäumen.

- DGN: Hartum (Jankowski leg. 1976, CJB) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 1998, CTM).
- WTL: Oelde (Dahms leg. 1929, LMM) - Schloß Holte-Stukenbrock (Renner leg. 1975, CRB) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1977/78, CRB, RENNER 1980) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1977/93, CRB) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1985/86/87/96, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1989/93/94/95/97/99/2000, CRB) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1991, CRE) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991/92, CKB) - Münster: Davert (Feldmann leg. 1992, CFM).
- UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1969, CJB, Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bielefeld-Quelle (Renner leg. 1977, CRB) - Bielefeld (SPÄH 1980) - Detmold: Donoper Teiche (Renner leg. 1980, CRB) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1982) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/98/99/2000, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995) - Osnabrück (Kache leg. 1992/93/94, KACHE 1998).
- OWB: Lage: Hardisser Moor (Renner leg. 1980, CRB) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1980/81/83, CRB) - Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1980, CRB) - Warburg: Hellberg/Scherfede (Renner leg. 1980/81/82, CRB) - Diemeltal: Lamerden (Renner leg. 1981, CRB) - Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1981/82, CRB) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982/83, CRB) - Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1982, CRB) - Eggegebirge: Schwaney (Terlutter leg. 1986, CTM) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91/92, CWB, SMB) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, GEILENKEUSER 1896) - Nevi-
ges (ROSSI 1882) - Witten (FÜGNER 1902) - Düsseldorf: Angermund
(Koch leg. 1957, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Lin-
torf (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Ratingen: Tiefenbroich (Koch leg.
1965, KOCH i.l.) - Solingen (Modrow leg. 1967, MKB) - Hagen (Drees
leg. 1978/82/89, CDH) - Schmalleberg: Härdler (Terlutter leg. 1983,
CTM) - Schmalleberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/87/88,
CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Rade-
vormwald (Wenzel leg. 84/85/87/88, WENZEL 1988) - Solingen (KOLBE
1988, 1992) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) -
Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN
& ERBELING 1992) - Plettenberg: Pasel (Grundmann leg. 1991, CGL) -
Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Altenkirchen
(WAGNER 1992) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992/93, CWR, WENZEL
1994) - Wuppertal (KOLBE 1994, 1996) - Waldbröl (Köhler leg. 1996,
CKB) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel, Lappann leg.
1998/99, CWR) - Neheim (Elmer leg. 1998, CFM) - Heiligenhaus: NSG
Hofermühle (Wenzel leg. 1999, CWR).

Placusa incompleta Sjöb., 1934

23-.132-.004-.

D.: sichere Meldungen nur aus ganz wenigen Teilgebieten.

Westf.: möglicherweise nur unrichtige Meldungen.

OWB: Karlshafen (Folwaczny leg. 1934/39, FOLWACZNY 1963, HORION 1967).

SBL: Berleburg (Folwaczny leg. 1939, FOLWACZNY 1963, HORION 1967).

Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1977, RENNER 1980): Fehlbestimmung - Solingen
(Modrow leg. 1967, KOCH 1974): Fehlbestimmung (KÖHLER 1993) - Solling (HART-
MANN 1979).

Placusa atrata (Mannh., 1831)

23-.132-.005-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, aber aus OWB noch nicht gemeldet.

Unter Nadelholzrinden.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) -
Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 1994/98, CTM).

WTL: Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1978, CRB, RENNER 1980) - Hövel-
hof/Senne (Renner leg. 1980, CRB, RENNER 1981a) - Münster: Davert
(Feldmann leg. 1992, CFM) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1992,
CKB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1997, CRB).

UWB: Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück
(Klaas leg. 1992, KACHE i.l., Kache leg. 1993, KACHE 1998).

SBL: Overath (Rüschkamp leg. 1929, MKB) - Düsseldorf: Angermund (Koch
leg. 1957/58, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Ratingen
(Koch leg. 1959/60/63, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) -
Lintorf (Koch leg. 1963/65, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch
leg. 1964, KOCH i.l.) - Solingen (KOLBE 1987, 1988, 1992, 1994) - Wup-
pertal (KOLBE 1992, 1996) - Waldbröl (Köhler leg. 1996, CKB) - Hei-
ligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel, Lappann leg. 1997/98/99, CWR).

Barkhausen (Jankowski leg., HORION 1967): Fehlbestimmung.

Placusa pumilio (Grav., 1802)

23-.132-.006-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

Unter Rinde von Laub-, seltener Nadelbäumen.

DGN: Hartum (Jankowski leg. 1974, CJB) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Bochum (Hozman leg. 1971, CHE) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1977/78, CRB, RENNER 1980) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991/92, CKB).

UWB: Bielefeld-Quelle (Renner leg. 1977, CRB) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1982) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Kache leg. 1992, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1980, CJB) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1982, CRB) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1991, CWB) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, GEILENKEUSER 1896) - Overath (Rüschkamp leg. 1929, MKB) - Erkrath (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1959/62/66, KOCH i.l.) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Lintorf (Koch leg. 1962/65, KOCH i.l.) - Radevormwald (Wenzel leg. 1979, WENZEL 1988) - Hagen (Drees leg. 1982/88/92, CDH) - Solingen (KOLBE 1988, 1992) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1990, CGL) - Wuppertal (KOLBE 1992, 1996) - Waldbröl (Köhler leg. 1996, CKB) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel, Lappann leg. 1998/99, CWR) - Neheim (Elmer leg. 1998, CFM) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Lappann, Wenzel leg. 1999, CWR).

Placusa adscita Er., 1839

23-.132-.007-.

D.: nur alte, unsichere Meldungen aus wenigen Gebieten.

Westf.: nur die unbelegte, vermutlich falsche Meldung aus Wuppertal.

SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884, WESTHOFF 1886, KOCH 1968): Fehldetermination?

Homalota plana (Gyll., 1810)

23-.133-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

Unter Rinden, besonders von Laubbäumen.

DGN: Steinfurt: NSG Wiechholz (Feldmann leg. 1998, CFM) - Ibbenbüren: Uffeln (Terlutter leg. 1999, CTM).

WTL: Dortmund (WESTHOFF 1881) - Münster (WESTHOFF 1881) - Ennigerloh (Dahms leg. 1924, DAHMS 1928) - Oelde (Dahms leg. 1934, LMM) - Dülmen (Hozman leg. 1974, CHE) - Schloß Holte-Stukenbrock (Renner leg. 1975, CRB) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1977/80/94, CRB) - Münster: Gimfte (Terlutter leg. 1982, CTM) - Herdecke (Drees leg. 1983, CDH) - Hövelriege/Senne (Braun leg. 1983, CBP) - Vreden (Ter-

- lutter leg. 1983, CTM) - Münster: Senden (Starke leg. 1985, CSW) - Warendorf (Starke leg. 1985, CSW) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1991, CRE) - Münster (Feldmann leg. 1991, CFM) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Lengerich (Starke leg. 1993, CSW) - Münster: Davert (Feldmann leg. 1994, CFM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1998, CRB) - Ibbenbüren: Uffeln (Terlutter leg. 1999, CTM).
- UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1930, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1954/56/76/78, CJB; Borcharding leg., BORCHERDING 1994) - Neesen/Porta (Jankowski leg. 1954, CJB) - Holzhausen (Jankowski leg. 1968, CJB) - Bielefeld: Schildesche (Renner leg. 1982, CRB) - Minden: Barkhausen (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984, CRB).
- OWB: Paderborn (WESTHOFF 1881) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1966/74/78/80/82, CJB) - Porta Westfalica (Grundmann leg. 1982, CGL) - Warburg: Hellberg/Scherfede (Renner leg. 1983, CRB) - Bad Lippspringe (Braun leg. 1986, CBP) - Lichtenau: Altenau-Tal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Scherfede: Hardehausen (Grundmann leg. 1989, CGL) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990, CWB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).
- SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (WESTHOFF 1881) - Siegen (WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Overath (Rüschkamp leg. 1929, MKB) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1957/60, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1959/63/64, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1960/62, KOCH i.l.) - Hohenlimburg (Drees leg. 1980, CDH) - Lünen: Cappenberger Wald (Terlutter leg. 1984, CTM) - Arolsen: Landau (Renner leg. 1986, CRB) - Hagen (Drees leg. 1988/94, CDH) - Meinerzhagen: Fürwigge-Talsperre (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 79/81/84/85, WENZEL 1988, Wenzel leg. 1994, CWR) - Schmalleberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Schwerte (Starke leg. 1989, CSW) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Plettenberg: Sechtenbecker Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Solingen (KOLBE 1992) - Waldbröl (Köhler leg. 1996, CKB) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Lappann leg. 1999, CWR) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel, Lappann leg. 1999, CWR).

Anomognathus cuspidatus (Er., 1839)

23-.134-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten, häufig.

Unter morschen Rinden.

- DGN: Häverner Marsch (Grundmann leg. 1982, CGL) - Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991) - Hopsten: NSG Trogbahn (Feldmann leg. 1998, CFM) - Steinfurt: NSG Wiechholz (Feldmann leg. 1998, CFM) - Ibbenbüren: Uffeln (Terlutter leg. 1999, CTM).
- WTL: Dortmund (Suffrian leg., WESTHOFF 1881) - Oelde (DAHMS 1928) - Ostfeldel (Dahms leg. 1932, LMM) - Essen (Hozman leg. 1970, CHE)

- Bochum (Hozman leg. 1971, CHE) - Münster: Davert (Rehage leg. 1971, CRD) - Münster: Lövelingloh (Terlutter leg. 1982, CTM) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Halle: Künsebeck (Grundmann leg. 1983, CGL) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1985, CTM) - Heek/Ahaus: NSG Füchte-Kallenbeck (Terlutter leg. 1986, CTM) - Oelde: Stromberg (Terlutter leg. 1986, CTM) - Münster (Feldmann leg. 1991, CFM) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1992, CRE) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1992/93/94/99, CRB) - Lengerich (Starke leg. 1993, CSW) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1995, CRB) - Ibbenbüren: Uffeln (Terlutter leg. 1999, CTM).
- UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935, LMM) - Kalletal/Lippe (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/85/99, CRB) - Barkhausen (Borcharding leg., BORCHARDING 1994) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 2000, CRB) - Detmold: Lippischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).
- OWB: Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1983, CRB) - Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1983, CRB) - Lichtenau: Altenau-Tal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).
- SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Witten (FÜGNER 1902) - Düsseldorf: Angermund (Koch leg. 1957/58/62, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1957/58/62/63, KOCH i.l.) - Lintorf (Koch leg. 1957/59/65, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1959/63, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1959/60, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1959/60/61, KOCH i.l.) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1959/64, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1960/62, KOCH i.l.) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Hagen (Drees leg. 1979/82/88, CDH) - Lünen: Cappenberger Wald (Terlutter leg. 1984, CTM) - Radevormwald (Wenzel leg. 1984/86, WENZEL 1988, Wenzel leg. 1990ü/92/93/94, CWR, WENZEL 1994) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Solingen (KOLBE 1992) - Wuppertal (KOLBE 1996) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Lappann leg. 1998, CWR) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1999, CWR).

Silusa rubiginosa Er., 1837

23-.135-.001-.

D.: in ganz Deutschland, aber nur sporadisch.

Westf.: zerstreute Funde.

An Saftflußstellen.

DGN: Hartum (Jankowski leg. 1969, CJB).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1954/58, CJB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Düsseldorf-Gerresheim (Koch leg. 1956/59, KOCH 1968) - Erkrath (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) -

- Silusa rubra* Er., 1839 23-.135-.002-
 D.: fast in ganz Deutschland, nach Osten seltener.
 Westf.: zerstreut, wenige neue Funde.
 An Saftflußstellen.
 WTL: Emsdetten: NSG Emsdettener Venn (Terlutter leg. 1996, CTM).
 UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1933, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. o.J., CJB).
 OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881).
 SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Overath (Rüschkamp leg. 1931, MKB) - Iserlohn (Erbeling leg. 1986, ERBELING & DREES 1992) - Letmathe (ERBELING & DREES 1992) - Plettenberg: Bommecke-Tal (Grundmann leg. 1992, CGL).
- Phytosus spinifer* Curt., 1838 23-.136-.001-
 D.: Art der Meeresküsten.
 Westf.: ein Fund, vermutlich Irrgast oder verschleppt.
 UWB: Lage: Altholzhausen (Grundmann leg. 1982, CGL).
- Rhopalocerina clavigera* (Scriba, 1859) 23-.138-.001-
 D.: in etlichen Teilgebieten noch nicht gefunden.
 Westf.: einzelne Nachweise aus fast allen Gebieten.
 WTL: Münster (Terlutter leg. 1986, CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993, CRB, RENNER 1998).
 UWB: Osnabrück (Kache leg. 1992/93, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1998, CRB).
 OWB: Scherfede: Hardehausen (Grundmann leg. 1989, CGL) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).
 SBL: Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Menden: Hönnetal (Feldmann leg. 1991, CFM) - Hagen: Hengsteysee (Drees leg. 1993, DREES 1996) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1999, CWR).
- Pseudomicrodota jelineki* (Krasa, 1914) 23-.139-.001-
 D.: Bayern, Rheinland, Westfalen.
 Westf.: nur ein Fund aus UWB.
 UWB: Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994, ASSING 1994).
- Thecturota marchii* (Doderò, 1922) 23-.140-.001-
 D.: Adventivart, erst in der Hälfte der Teilgebiete nachgewiesen, vermutlich aber in allen vorhanden.
 Westf.: aus DGN und SBL noch nicht gemeldet.
 Sehr flugaktiver Detritusbewohner.

- WTL: Hövelhof/Senne (Renner leg. 1994, CRB) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1995, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1996/98/99, CRB).
- UWB: Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1987/89, CRB, RENNER 1991) - Osnabrück (Kache leg. 1992, KACHE 1998) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 2000, CRB).
- OWB: Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982, CRB, RENNER & GRUNDMANN 1984).

Megaloscapa punctipennis (Kr., 1856)

23-.1401.001-.

D.: fehlt wohl nur in den nördlichen Regionen.

Westf.: im Bergland verbreitet.

- UWB: Bielefeld: Quelle (Späh leg. 1975/76, SPÄH 1980) - Bielefeld: Quelle (Renner leg. 1977, CRB, RENNER 1979, 1981a) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995) - Osnabrück (Kache leg. 1994, KACHE 1998).
- OWB: Körbecke (Kroker leg. 1979, KROKER & RENNER 1983) - Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1980, CRB) - Warburg: Hellberg/Scherfede (Renner leg. 1980/82, CRB) - Diemeltal: Lamerden (Renner leg. 1981, CRB) - Paderborn-Wewer (Renner leg. 1981, CRB, RENNER 1985) - Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1981, CRB) - Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1981, CRB) - Scherfede: Scheffelberg (Großkopf leg. 1986/87, CGL) - Lichtenau: Geimer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Lichtenau (Großkopf leg. 1987, CGL) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/93, CWB) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1994, FELDMANN & LÜCKMANN 1998).
- SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Solingen (KOLBE 1981, 1984a, 1987, 1988, 1992, 1994, KOCH 1992) - Finnentrop (Hellweg leg. 1987, HELLWEG 1989)- Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Wuppertal (KOLBE 1992, 1994, 1996).

Leptusa pulchella (Mannh., 1830)

23-.141-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: von Westhoff noch als sehr selten bezeichnet, heute aus allen fünf Teilgebieten zahlreiche Meldungen.

Unter morschen Rinden.

Leptusa norvegica Strand., 1941

23-.141-.003-.

D.: im Süden, Rheinland, Norden.

Westf.: keine Meldung.

Leptusa fumida (Er. 1839)

23-.141-.004-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: von Westhoff noch als sehr selten bezeichnet, heute aus allen fünf Teilgebieten zahlreiche Meldungen.

Unter morschen Rinden.

Leptusa ruficollis (Er., 1839)

23-.141-.006-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: ausser aus DGN zahlreiche Funde aus allen Teilgebieten.

An morschem Laubholz, auch dünnen Ästen.

Leptusa simoni simoni Epph., 1878

23-.141-.023-.a

D.: in den Alpen und einigen Mittelgebirgen, auch an der Nahe (FLECHTNER 1990).

Westf.: keine Meldung, aber im Sauerland sicher zu erwarten.

Typischer Bewohner von Kaltluft erzeugenden Blockhalden (MOLENDEN 1989).

Ith/Weserbergland (Assing leg. 1983/84, ASSING 1986) - Kirn / Nahe (Flechtner Leg. 1986, FLECHTNER 1990).

Euryusa castanoptera Kr., 1856

23-.142-.001-.

D.: fast in ganz Deutschland, von Osten her sich ausbreitend.

Westf.: einzelne Funde ab 1988.

Unter morschen Laubholzrinden.

WTL: Ahaus: Die Brücke (Terlutter leg. 1989, CTM) - Münster: Davert (Terlutter leg. 1990, CTM) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB).

UWB: Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1988, CRB, RENNER 1991, Renner leg. 1998, CRB).

SBL: Hönnetal (Röwekamp leg. 1995, CRE) - Wuppertal (KOLBE 1996) - Neheim (Elmer leg. 1998, CFM).

Euryusa optabilis Heer, 1839

23-.142-.002-.

D.: in ganz Deutschland, im Westen weniger selten.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten, nicht häufig.

Unter morschen Laubholzrinden.

DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1969, CJB).

WTL: Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Warendorf (Starke leg. 1994, CSW) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1996, CRE).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1950/53/54/56/60/76/79, CJB) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1976/79/82, CJB) - Klein Möllenbeck (Jankowski leg. 1977, CJB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Lintorf (Koch leg. 1957, KOCH i.l.) - Breitscheid (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Hösel (Hozman leg. 1972, CHE) - Hagen (Drees leg. 1984/86/87, CDH) - Neheim (Elmer leg. 1998, CFM).

- Euryusa sinuata* Er., 1837 23-.142-.003-.
D.: fast in ganz Deutschland.
Westf.: Einzelfunde aus dem Bergland.
Unter morschen Laubholzrinden.
 UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1958/59/68, CJB) - Barkhausen (Jankowski leg., HORION 1967).
 OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1973/81/82, CJB) - Klein Möllenbeck (Jankowski leg., HORION 1967) - Paderborn-Wewer (Renner leg. 1981, CRB, RENNER & GRUNDMANN 1984, RENNER 1985).
 SBL: Elberfeld (Stachelhausen leg., CORNELIUS 1884, WESTHOFF 1886, KOCH 1968) - Barmen (GEILENKEUSER 1896) - Solingen (Gräf leg. 1968, KOCH 1974) - Düsseldorf-Lohausen (Koch leg. 1970, KOCH 1974).
- Euryusa coarctata* Märk., 1844 23-.142-.004-.
D.: im Süden und Osten, sonst kaum gemeldet.
Westf.: nur zwei Funde aus OWB.
 OWB: Karlshafen: Hann. Klippen (Folwaczny leg. 1933, FOLWACZNY 1976) - Klein Möllenbeck (Jankowski leg. 1960, CJB).
- Tachyusida gracilis* (Er., 1837) 23-.143-.001-.
D.: sporadisch im östlichen und mittleren Deutschland.
Westf.: keine Meldung.
In rotfaulem Holzmulm, „Urwaldrelikt“.
- Phymatura brevicollis* (Kr., 1856) 23-.145-.001-.
D.: große Seltenheit, nur im Süden und Osten.
Westf.: die Meldung aus Elberfeld wurde schon von HORION (1967) angezweifelt.
An Baumschwämmen, „Urwaldrelikt“.
 Elberfeld (CORNELIUS 1884, WESTHOFF 1886).
- Bolitochara obliqua* Er., 1837 23-.147-.001-.
D.: in ganz Deutschland, oft häufigste Art der Gattung.
Westf.: in allen fünf Teilgebieten, meistens häufig.
An Baumschwämmen.
 DGN: Hopsten: NSG Heiliges Meer (Rehage leg. 1973, CRD) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) - Borken: NSG Wacholderheide Hörsteloh (Terlutter leg. 1985, CTM) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Grundmann leg. 1992, CGL) - Recke (Starke leg. 1992, CSW).
 WTL: Lüdinghausen (Rüschkamp leg. 1931, HORION 1967) - Essen (Hozman leg. 1970, CHE) - Münster: Davert (Rehage leg. 1971, CRD) - Dorsten (Hozman leg. 1972, CHE) - Gütersloh: Rietberger Teiche (Rehage leg. 1973, CRD) - Bielefeld-Eckardtshiem (Renner leg. 1974/75/76, CRB) - NSG Deutener Moor (SIEDE 1977) - Halle: Tatenhausen (Renner leg.

- 1979, CRB) - Gütersloh: Barrelpäule/Brockhagen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Münster: Gimfte (Terlutter leg. 1982, CTM, Feldmann leg. 1990, CFM) - Münster: Lövelingloh (Terlutter leg. 1983, CTM) - Telgte: Westbevern (Terlutter leg. 1984, CTM) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1984, CTM) - Heek/Ahaus: NSG Füchte-Kallenbeck (Terlutter leg. 1986, CTM) - Münster: Davert (Terlutter leg. 1986/91, CTM) - Münster: Rieselfelder Münster (Terlutter leg. 1987, CTM) - Warendorf (Starke leg. 1987/89/92/93, CSW) - Haltern (Starke leg. 1989, CSW) - Münster: Handorf (Terlutter leg. 1989, CTM) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1990/92/96, CRE) - Münster: Davert (Starke leg. 1990, CSW) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB, Renner leg. 1991, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1994/95/97, CRB) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1996, CRB) - Emsdetten: NSG Emsdettener Venn (Terlutter leg. 1996, CTM).
- UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935, LMM) - Bielefeld-Quelle (Renner leg. 1974/77, CRB) - Bad Salzuflen: Bexter Wald (Grundmann leg. 1981/82, CGL) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Grundmann leg. 1981, CGL) - Minden: Barkhausen (Renner leg. 1982/89, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1987/89/98/2000, CRB) - Ibbenbüren (Feldmann leg. 1990, CFM) - Barkhausen (Borchering leg., BORCHERING 1994).
- OWB: Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982, CRB, RENNER 1985) - Porta Westfalica (Grundmann leg. 1982, CGL) - Lichtenau (Braun leg. 1983, CBP) - Neuenbeken (Braun leg. 1983, CBP) - Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1983, CRB) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990, CWB) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).
- SBL: Düsseldorf: zahlreiche Funde (Koch leg. 1956-86, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1957/61, KOCH i.l.) - Solingen (Modrow leg. 1957, MKB) - Hilden (Koch leg. 1960/63, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1961/63/64, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1962/64/66, KOCH i.l.) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1968, MKB) - Hagen (Drees leg. 1976/80/89, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1978/79/83/84/86/87, WENZEL 1988, 1994, WAGNER 1995) - Schmalleberg: Händler (Terlutter leg. 1982, CTM) - Gummersbach: Ränderoth (Wenzel leg. 1983, WAGNER 1995) - Lünen: Cappenberger Wald (Terlutter leg. 1984, CTM) - Meschede (Terlutter leg. 1985, CTM) - Arolsen: Landau (Renner leg. 1986, CRB) - Schmalleberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1987/88, CGL) - Attendorn: Repetal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988/91, CGL) - Meinerzhagen: Fürwigge-Talsperre (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Altenkirchen: Birkenbeul (Wagner leg. 1990, WAGNER 1992, 1995) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Plettenberg: Sechtenbecker Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Meinerzhagen: Ebbegebirge (Rehage leg. 1992, CRD) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992/93/94, CWR) - Solingen (KOLBE 1992) - Schmalleberg: Altenilpe (Grundmann leg. 1993, CGL) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel leg. 1997, CWR) - Neheim (Elmer leg. 1998, CFM).

Bolitochara bella Märk., 1844

23-.147-.002-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

An Baumschwämmen.

- DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).
WTL: Halle: Teutoburger Wald (Grundmann leg. 1981, CGL, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Münster: Ostbevern (Starke leg. 1995, CSW) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1999, CRB).
UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1961/68/69/74/79/80, CJB) - Bielefeld: Niederdornberg (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Grundmann leg. 1981, CGL, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Halle: Borgholzhausen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).
OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1980/81/82, CJB) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982, CRB, RENNER 1985).
SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Overath (Rüschkamp leg. 1931, MKB, WAGNER 1995) - Düsseldorf: Angermund (Koch leg. 1956/60/62, KOCH i.l.) - Solingen (Modrow leg. 1956/66/72, Gräf leg. 1963/65/67/75, WAGNER 1995) - Ratingen (Koch leg. 1957/63, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1958/60, KOCH i.l.) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1958, MKB) - Erkrath (Koch leg. 1959/63, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Solingen (Gräf leg. 1975, MKB) - Hagen (Drees leg. 1981/88/93, CDH, DREES 1996) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1986, WENZEL 1988, 1994) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel leg. 1997, CWR).

Bolitochara mulsanti Shp., 1875

23-.147-.003-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: Meldungen fehlen aus DGN, UWB.

In verpilztem Moderholz.

- WTL: Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1987, CRB) - Warendorf (Starke leg. 1992, CSW) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1994, CRB, RENNER 1998) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1994/95, CRB, RENNER 1998).
OWB: Schlangen (Braun leg. 1987, CBP) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).
SBL: Leuscheid (Appel leg. 1957, MKB) - Solingen (Gräf leg. 1961, WAGNER 1995) - Schmalleberg: Härdler (Terlutter leg. 1982/83, CTM) - Schmalleberg: Hunau (Grundmann leg. 1984/85/87, CGL) - Schmalleberg: Aberg (Grundmann leg. 1985, CGL) - Schmalleberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/87/88, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Wipperfürth (Wenzel leg. 1989, CWR, WAGNER 1995) - Herscheid: Hüinghausen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Altenkirchen (WAGNER 1992, 1995) - Wissen/Sieg: Gebhardshain (WAGNER 1992) - Radevormwald (Wenzel leg.

1993, WENZEL 1994, WAGNER 1995; Wenzel leg. 1995/96, CWR) -
Waldbröl (Köhler leg. 1996, CKB) - Neheim (Elmer leg. 1998, CFM).

Bolitochara pulchra (Grav., 1806)

23-.147-.004-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

In Pilzen.

- DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).
WTL: Münster (Kolbe leg. 1875, WESTHOFF 1881, LMM) - Bocholt (WESTHOFF 1881) - Lippstadt (WESTHOFF 1881) - Essen (Hozman leg. 1970/72, CHE) - Bielefeld-Eckardtsheim (Renner leg. 1976, CRB) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1976/78, CRB, RENNER 1980) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1991, CRE) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1997, CRB).
UWB: Preuß. Oldendorf (Petz leg. 1933, LMM) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Grundmann leg. 1979, CGL).
OWB: Paderborn (WESTHOFF 1881) - Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1981, CRB).
SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (WESTHOFF 1881) - Siegen (WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Hückeswagen (Eigen leg., MKB, WAGNER 1995) - Overath (Rüschkamp leg. 1931, MKB, WAGNER 1995) - Rösrath (Rüschkamp leg. 1931, WAGNER 1995) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1956, MKB) - Solingen (Modrow leg. 1962/71, MKB, WAGNER 1995) - Hagen (Drees leg. 1975/88, CDH) - Schmalleberg: Latrop-Tal (Grundmann leg. 1984, CGL) - Attendorn: Repetal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992).

Bolitochara lucida (Grav., 1802)

23-.147-.005-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

An verpilztem Laubholz.

- DGN: Hopsten: NSG Heiliges Meer (Röwekamp leg. 1992, CRA); Hopsten (Starke leg. 1989, CSW).
WTL: Senne: Stapelage (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Haltern (Starke leg. 1989, CSW) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Warendorf (Starke leg. 1992, CSW) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1993, CRE).
UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1966/68/69/76/77/78/79, CJB) - Porta Westf. (Jankowski leg., HORION 1967) - Bielefeld-Quelle (Renner leg. 1974, CRB) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Grundmann leg. 1981, CGL, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB).
OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1973/75/80, CJB) - Lichtenau (Braun leg. 1983, CBP) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Hückeswagen (Eigen leg., MKB, WAGNER 1995) - Leuscheid (Appel leg. 1954, MKB, WAGNER 1995) - Solingen (Modrow leg. 1959/64/69; Gräf leg. 1961/68/69/75, MKB, WAGNER 1995) - Hagen (Drees leg. 1975/88/93, CDH, DREES 1996) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1986/87, WENZEL 1988, WAGNER 1995) - Altenkirchen: Gebhardshain (Wagner leg. 1991, WAGNER 1995) - Wiblingwerde: Nachrodt (Terlutter leg. 1994, CTM) - Radevormwald (Wenzel leg. 1996, CWR) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel leg. 1997, CWR) - Neheim (Elmer leg. 1998, CFM).

Autalia impressa (Ol., 1795)

23-.148-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: aus allen Teilgebieten ausser DGN gemeldet.

In Pilzen.

WTL: Dortmund (WESTHOFF 1881) - Lippstadt (WESTHOFF 1881) - Münster (WESTHOFF 1881) - Oelde (Dahms leg. 1924, DAHMS 1928) - Sünninghausen (Dahms leg. 1930, LMM) - Bochum (Hozman leg. 1972, CHE) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1978, CRB, RENNER 1980) - Gütersloh: Barrelpäule/Brockhagen (Grundmann leg. 1980, CGL) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Vreden (Terlutter leg. 1985, CTM) - Gütersloh: Harsewinkel (Starke leg. 1989, CSW) - Rheine: Riesenbeck (Starke leg. 1990, CSW) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1933, 1935, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1957, CJB) - Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1977, CRB, RENNER 1981b) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Grundmann leg. 1979, CGL) - Bad Salzuflen: Bexter Wald (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Brönninghausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Leopoldshöhe, Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/87, CRB) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).

OWB: Paderborn (WESTHOFF 1881) - Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1982, CRB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Arnsberg (Varendorff leg., WESTHOFF 1881) - Hilchenbach (WESTHOFF 1881) - Siegen (WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Ennepetal (Drees leg. 1977, CDH) - Hönnetal (REHAGE & FELDMANN 1977) - Engelskirchen (Appel leg. 1978, MKB) - Siegen: Freudenberg (Terlutter leg. 1980, CTM) - Sprockhövel (Hozman leg. 1981, CHE) - Hagen (Drees leg. 1982/88, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1983/84/85, WENZEL 1988) - Iserlohn (Erbeling leg. 1986, ERBELING & DREES 1992) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Schmalleberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Plettenberg: Soen (Grundmann leg. 1989, CGL) - Letmathe (ERBELING & DREES 1992) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Lappann leg. 1997/98, CWR) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1999, CWR).

Autalia longicornis Scheerp., 1947

23-.148-.002-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen allen fünf Teilgebieten, oft häufiger als *A. impressa*.

In Pilzen.

DGN: Hartum (Jankowski leg. 1979, CJB).

WTL: Bochum (Hozman leg. 1972, CHE) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1978, CRB, RENNER 1980) - Münster: Wolbecker Tiergarten (Terlutter leg. 1983, CTM) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1985, CRB, RENNER 1987) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1990/93/95, CRB) - Münster: Wolbeck (Renner leg. 1991, CRB, Köhler leg. 1991/92, CKB) - Warendorf (Starke leg. 1992, CSW) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1994/95, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1998, CRB).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1933/35, LMM) - Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1977/78, CRB, RENNER 1979, 1981b) - Bielefeld (SPÄH 1980) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Lage: Altholzhausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983/84, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1992/93, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Schlangen (Braun leg. 1984, CBP) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91/92, CWB, SMB) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Hösel (Hozman leg. 1972, CHE) - Solingen (Gräf leg. 1979, KOCH 1992) - Radevormwald (Wenzel leg. 1985/88/89/91, WENZEL 1988, 1994, KOCH 1992) - Arnsberg (Feldmann leg. 1989, CFM) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Marienheide/Gimborn (Wenzel leg. 1990, CWR) - Radevormwald (Wenzel leg. 1991/92/93/95, CWR) - Iserlohn: Letmathe (Terlutter leg. 1994, CTM) - Schmollenberg: Altenilpe (Grundmann leg. 1994, CGL) - Wiblingwerde: Nachrodt (Terlutter leg. 1994, CTM) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel, Lappann leg. 1998, CWR).

Autalia rivularis (Grav., 1802)

23-.148-.003-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen allen fünf Teilgebieten sehr häufig.

Flugaktiver Faulstoff-Bewohner.

Autalia puncticollis Shp., 1864

23-.148-.004-.

D.: in den Alpen häufig, sonst nur in wenigen Gebieten.

Westf.: die Meldung aus Elberfeld ist unrichtig (RÖTTGEN 1911, HORION 1967).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, 1886, CORNELIUS 1884):Fehlbestimmung.

Cordalia obscura (Grav., 1802)

23-.149-.001-.

D.: in ganz Deutschland häufige Art.

Westf.: in allen allen fünf Teilgebieten, schon von Westhoff als häufig bezeichnet.

In Faulstoffen, Ubiquist

Falagria sulcatula (Grav., 1806)

23-150-001-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

- DGN: Holzhausen (Peetz leg. 1936, LMM) - Nettelstedter Moor (Peetz leg. 1937, LMM) - Hiller Moor (Jankowski leg. 1955, CJB) - Hartum (Jankowski leg. 1969/72/79, CJB).
- WTL: Münster (REEKER 1887) - Soest (VERHOEFF 1890) - Münster (Peetz leg. 1936, LMM) - Oelde (Dahms leg. 1936, LMM) - Dorsten (Hozman leg. 1970, CHE) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1977, CRB, RENNER 1980) - Salzkotten (Renner leg. 1982, CRB) - Coesfeld (Starke leg. 1984, CSW) - Telgte: Westbevern (Terlutter leg. 1984/86, CTM) - Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Bokel/Ems (1989/91, WASNER i.l.) - Lüdinghausen: Olfen (Terlutter leg. 1992, CTM) - Warendorf (Starke leg. 1992, CSW) - Münster: Westbevern (Köhler leg. 1997, CKB, KÖHLER 2000).
- UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1929, PEETZ 1931, LMM) - Neesen/Porta (Jankowski leg. 1956, CJB) - Barkhausen (Jankowski leg. 1957, CJB) - Holzhausen (Jankowski leg. 1967/75/79, CJB) - Herford: Herringhausen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).
- OWB: Bückeburg (Burchard leg., WESTHOFF 1881) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1973, CJB) - Paderborn (Braun leg. 1982, CBP).
- SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Imhausen/Sieg (Appel leg. 1948, MKB) - Düsseldorf: Angermund (Koch leg. 1956/57/58/59/60, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1957/63, KOCH i.l.) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1960/63, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1962/64, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Lintorf (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Solingen (Modrow leg. 1965, MKB) - Hagen (Drees leg. 1975/84/87/92/95, CDH) - Plettenberg: Eiringhausen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993).

Falagria caesa Er., 1837

23-150-003-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

- DGN: Hopsten: NSG Heiliges Meer (Rehage leg. 1988, CRD).
- WTL: Münster (WESTHOFF 1881) - Lippstadt (Buddeberg leg., WESTHOFF 1881) - Oelde (DAHMS 1928) - Münster (PEETZ 1937) - Münster: Emmerbach (Ahrens leg. 1991, KÖHLER i.l.) - Warendorf (Röwekamp, Starke leg. 1993, CRE, CSW).
- UWB: Preuß. Oldendorf (PEETZ 1931) - Holzhausen (Jankowski leg. o.J., CJB) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).
- OWB: Paderborn (WESTHOFF 1881) - Körbecke (Kroker leg. 1978/79, KROKER 1981, KROKER & RENNER 1983).
- SBL: Arnsberg (Varendorff leg., WESTHOFF 1881) - Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Düsseldorf: Angermund (Koch leg. 1957, KOCH

i.l.) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1958/64/66, KOCH i.l.) - Lintorf (Koch leg. 1958, KOCH i.l.) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1966/67, KOCH i.l.).

Burscheid (Kolbe leg. 1986, KOLBE & BRUNS 1988): Fehldetermination (KÖHLER 1997).

Myrmecocephalus concinna (Er., 1839) 23-.1501.001-

D.: in den meisten Regionen schon eingebürgerte Adventivart.

Westf.: erst aus wenigen Gebieten gemeldet.

Kosmopolit, in Ausbreitung.

WTL: Dortmund (Hellweg leg. 1986, HELLWEG 1989)- Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1995, CRB, RENNER 1998).

UWB: Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1998/2000, CRB).

SBL: Hagen (Drees leg. 1989, CDH, DREES 1991, Drees leg. 1990/92/94, CDH).

Falagrioma thoracica (Curt., 1833) 23-.1502.001-

D.: fast in ganz Deutschland, nach Osten seltener.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

An Ufern, im Hügelland meist in Trockenbiotopen.

DGN: Häverner Marsch (Grundmann leg. 1982, CGL) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Rehage leg. 1978, CRD).

WTL: Soest (Buddeberg leg., WESTHOFF 1881) - Münster (REEKER 1887) - Oelde (Dahms leg. 1933, LMM) - Essen (Hozman leg. 1972, CHE) - Wiedenbrück: Langenberg (Rehage leg., CRD, REHAGE 1972) - Münster: Gimfte (Rehage leg. 1976, CRD) - Herzebrock: Clarholz (Terlutter leg. 1974/78/80, CTM) - Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Salzkotten: NSG Rabbruch (Lakmann leg. 1987, CLD) - Lüdinghausen: Olfen (Terlutter leg. 1992, CTM) - Haltern (Ahrens leg. 1994, KÖHLER i.l.).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1958/59/79, CJB) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995) - Osnabrück (Klaas leg. 1992, KACHE i.l., Kache leg. 1992/93, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1975, CJB) - Körbecke (Kroker leg. 1978/79, KROKER 1981, KROKER & RENNER 1983) - Brakel: Hamburg/Riesel (Renner leg. 1980/81/82, CRB) - Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1980/82, CRB) - Warburg: Hellberg/Scherfedde (Renner leg. 1980/82, CRB) - Paderborn-Wewer (Renner leg. 1981/82, CRB, RENNER 1985) - Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1981/82, CRB) - Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1981, CRB) - Lichtenau: Geimer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Scherfedde: Scheffelberg

(Großkopf leg. 1986, CGL) - Warburg: Weldaer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91/92, CWB, SMB) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1992/93/94, FELDMANN & LÜCKMANN 1998) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Arnsberg (Varendorff leg., WESTHOFF 1881) - Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Witten (FÜGNER 1902) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1958/62/64, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Ratingen: Tiefenbroich (Koch leg. 1962, KOCH i.l.) - Breitscheid (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Solingen (Gräf leg. 1966, MKB) - Wuppertal: Krutscheid (KOLBE 1971) - Hagen (Drees leg. 1979/80/82, CDH) - Burscheid (Kolbe leg. 1986, KÖHLER 1997, MKB) - Iserlohn (Erbeling leg. 1986, ERBELING & DREES 1992) - Letmathe (Drees leg. 1987, CDH) - Finnentrop-Wildewiese (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Letmathe (ERBELING & DREES 1992) - Menden: NSG Hönnetal (Terlutter leg. 1995, CTM) - Schwerte (Flake leg. 1996, CFM) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1998/99, CWR) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Lappann leg. 1989/99, CWR).

Anaulacaspis nigra (Grav., 1802)

23-1503.001-

D.: in ganz Deutschland, nach Norden seltener.

Westf.: nur aus DGN noch nicht gemeldet.

Art dürrer Sandböden.

WTL: Dortmund (Suffrian leg., WESTHOFF 1881) - Münster (Kolbe leg., WESTHOFF 1881) - Soest (VERHOEFF 1890).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1950, CJB) - Holzhausen (Jankowski leg. 1956/72, CJB).

OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1967, CJB) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1980, CRB) - Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1980/82, CRB) - Paderborn: Dahl (Braun leg. 1985, CBP) - Warburg: Weldaer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL).

SBL: Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Siegen (Suffrian leg., WESTHOFF 1881) - Elberfeld (CORNELIUS 1884) - Benrath (Eigen leg., MKB) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1959/65/66, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Solingen (Modrow leg. 1960/61/64, MKB) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1970, KOCH i.l.) - Hagen (Drees leg. 1985/90, CDH) - Attendorn: Borghausen (Grundmann leg. 1991, CGL).

Borboropora kraatzii Fuss, 1862

23-151-001-

D.: Eifel, Hunsrück, Harz.

Westf.: keine Meldung.

Bohemiellina flavipennis (CAMERON, 1920) 23-.152-.001-.

D.: Adventivart aus Nordamerika, im Nordwesten sowie in Bayern und Sachsen.

Westf.: nur zwei Funde aus SBL.

SBL: Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1987, WENZEL 1989, KOCH 1992)
- Hagen: Boelerheide (Drees leg. 1987, CDH, DREES 1991).

Tachyusa objecta (Muls.Rey, 1870) 23-.154-.001-.

D.: im Süden verbreitet, sonst nur sporadische Funde.

Westf.: keine Meldung, aber am Niederrhein und in Holstein.

Bewohner kiesiger Ufer.

Tachyusa constricta (Er., 1837) 23-.154-.003-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

An kiesigen Ufern.

DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1957, CJB) - Häverner Marsch (Renner leg. 1985, CRB).

WTL: Bocholt (WESTHOFF 1881) - Lippstadt (WESTHOFF 1881) - Oelde (DAHMS 1928, Dahms leg. 1935, LMM) - Ostenfelde (Dahms leg. 1933, LMM) - Vellern (Dahms leg. 1933, LMM) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Münster: Gimfte (Terlutter leg. 1983, CTM) - Münster: Handorf (Renner leg. 1983/84, CRB, Terlutter leg. 1984, CTM) - Vreden (Terlutter leg. 1983, CTM) - Bocholt: Suderwick (Terlutter leg. 1985, CTM) - Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Bokel/Ems (1989, WASNER i.l.) - Münster: Gimfte (Feldmann leg. 1990, CFM) - Rheine: Riesenbeck (Starke leg. 1990, CSW) - Warendorf (Starke leg. 1990, CSW) - West-Münsterland: Gronau (Grundmann leg. 1992, CGL) - Greven: Mühlenbach (Rehage leg. 1993, CRD) - Gronau: Goorbach (Terlutter leg. 1993, CTM) - Ladbergen: Eltingmühlenbach (Terlutter leg. 1993, CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1994/95/99, CRB) - Ahaus: Schöppingen (Terlutter leg. 1997, CTM) - Münster: Westbevern (Köhler leg. 1997, CKB, KÖHLER 2000).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1936, LMM) - Holsen (Peetz leg. 1936, LMM) - Melbergen/Werre (Peetz leg. 1936, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1950, CJB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1994/96/98/2000, CRB) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).

OWB: Paderborn (WESTHOFF 1881) - Klein Möllenbeck (Jankowski leg. 1960, CJB) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1966/78/79, CJB) - Dörentrup (Renner leg. 1977/79, CRB) - Fromhausen/Horn (Braun leg. 1982, CBP) - Brakel: Riesel (Renner leg. 1983/84, CRB) - Godelheim/Weser (Renner leg. 1988, CRB, Terlutter leg. 1991, CTM) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1991, CWB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Witten (WESTHOFF 1881, FÜGNER 1902; Drees leg. 1982, CDH) - Lintorf (Koch leg. 1957, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1958, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1958/59/63/64, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1958, KOCH i.l.) - Hösels (Koch leg. 1958, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg.

1959/63, KOCH i.l.) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1962, KOCH i.l.) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1967, MKB) - Hösel (Hozman leg. 1970, CHE) - Hagen (Drees leg. 1982, CDH) - Hohenlimburg (Drees leg. 1983, CDH) - Arolsen: Landau (Renner leg. 1986, CRB) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1987, CGL) - Dahlerbrück/Volme (Drees leg. 1989, CDH) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993).

Tachyusa coarctata (Er., 1837)

23-.154-.004-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, aber aus DGN noch nicht gemeldet.

An kiesigen Ufern.

WTL: Oelde (Dahms leg. 1933, LMM) - Klarholz (Dahms leg. 1933, LMM) - Salzkotten: Sültsoid (Renner leg. 1982, CRB) - Münster: Gimfte (Terlutter leg. 1983, CTM) - Münster: Handorf (Renner leg. 1983/84/85, CRB) - Vreden (Terlutter leg. 1983, CTM) - Münster: Westbevern (Renner leg. 1984, CRB, Köhler leg. 1997, CKB, KÖHLER 2000) - Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Bokel/Ems (1989, WASNER i.l.) - Münster: Gimfte (Feldmann leg. 1990, CFM) - Warendorf (Starke leg. 1990, CSW) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1991, CRE) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1999, CRB).

UWB: Porta/Weser (Peetz leg. 1925, LMM) - Bünde (Peetz leg. 1934, LMM) - Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1936, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1967, CJB) - Bielefeld-Schildesche (Renner leg. 1976, CRB) - Lage: Altholzhausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1966, CJB) - Dörentrup (Renner leg. 1976, CRB) - Godelheim/Weser (Renner, Feldmann leg. 1991, CRB, CFM).

SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884) - Witten (FÜGNER 1902) - Benrath (Eigen leg., MKB) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1955, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1958, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1958, KOCH i.l.) - Breitscheid (Koch leg. 1959/60, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Gruiten (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Dahlerbrück/Volme (Drees leg. 1979, CDH) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1984, WENZEL 1989).

Tachyusa balteata (Er., 1839)

23-.154-.005-

D.: im Süden und vom Rheinland bis Sachsen.

Westf.: die Meldung aus Elberfeld wird von HORION (1967) bezweifelt.

Bewohner kiesiger Ufer.

Elberfeld (Müller leg. 1920, KOCH 1968): Meldung unrichtig.

Tachyusa exarata (Mannh., 1830)

23-.154-.009-

D.: in Bayern; alte, fragliche Meldungen aus Rheinland und Westfalen.

Westf.: nur die alte Meldung aus Münster; sie wurde schon von HORION (1967) bezweifelt. Keine neueren Funde.

Münster (Treuge leg., WESTHOFF 1882): Meldung unrichtig.

Tachyusa scitula (Er., 1837)

23-.154-.010-

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: selten, in WTL und SBL.

An kiesigen Ufern.

WTL: Saerbeck/Ems (Peetz leg. 1936, LMM) - Gütersloh (Ermisch leg. 1942, HORION 1967) - Münster: Gimble (Terlutter leg. 1983, CTM, Feldmann leg. 1990, CFM) - Münster: Westbevern (Köhler leg. 1997, CKB, KÖHLER 2000).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Siegen (Suffrian leg., WESTHOFF 1881, HORION 1967) - Solingen (Modrow leg. 1961, KOCH 1968, MKB) - Ratingen (Koch leg. 1963, KOCH 1968) - Hückeswagen (Eigen leg., KOCH 1968) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1968, KOCH 1974).

Thinonoma atra (Grav., 1806)

23-.1541.001-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

Bewohner schlammiger Ufer.

DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1956/80/82, CJB, Grundmann leg. 1981, CGL) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) - Recke: Wiechholzer Bach (Terlutter leg. 1996, CTM).

WTL: Emsdetten (Peetz leg. 1925, LMM) - Ennigerloh (Dahms leg. 1933, LMM) - Oelde (Dahms leg. 1933, LMM) - Bochum (Hozman leg. 1971, CHE) - Essen (Hozman leg. 1971, CHE) - Schloß Holte-Stukenbrock (Renner leg. 1976, CRB) - Senne: Moosheide (Grundmann leg. 1981, CGL) - Vreden: NSG Ellewicker Feld (Terlutter leg. 1983/88, CTM) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1983/96, CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1995/97, CRB) - Ahaus: NSG Graeser Venn (Terlutter leg. 1996, CTM).

UWB: Melbergen/Werre (Peetz leg. 1936, LMM) - Holzhausen (Jankowski leg. 1954/56, CJB) - Neesen/Porta (Jankowski leg. 1956, CJB) - Bad Salzuflen (Renner leg. 1978, CRB) - Bielefeld: Altenhagen (Renner leg. 1978, CRB) - Bielefeld: Niederdornberg (Grundmann leg. 1981, CGL) - Herford: Herringhausen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/88/99, CRB) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.).

OWB: Klein Möllenbeck (Jankowski leg. 1961, CJB) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1967/81/82, CJB) - Lage: Hardisser Moor (Renner leg. 1980, CRB) - Willebadessen (Braun leg. 1982, CBP) - Porta Westfalica: Veltheim (Renner leg. 1984, CRB) - Scherfede: Hardehausen (Braun leg. 1986, CBP) - Amelunxen (Renner leg. 1988, CRB) - Godelheim/Weser (Renner leg. 1988, CRB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Witten (FÜGNER 1902, MKB) - Hückeswagen (Eigen leg. 1935, FMW, MKB) - Erkrath (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Breitscheid (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Gruiten (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Solingen (Modrow leg. 1960, MKB) - Heiligenhaus: Bellscheidt

(Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Mettmann: Schöller (Koch leg. 1962, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Neunkirchen/Bröl (Appel leg. 1967, MKB) - Hagen (Drees leg. 1981/92, CDH) - Ennepetal (Drees leg. 1982, CDH) - Schmallenberg: Härdler (Terlutter leg. 1982, CTM) - Iserlohn: Hemer (Terlutter leg. 1983, CTM) - Schwerte (Drees leg. 1987, CDH) - Attendorn-Echternhagen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg (Erbeling, Renner leg. 1988, CERL, CRB) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Lahmer Bachtal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Plettenberg: Eiringhausen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1992, WENZEL 1997) - Hönnetal: Volkringhausen (Terlutter leg. 1995, CTM) - Halver: Ennepe (Feldmann leg. 1997, CFM) - Heiligenhaus (Renner leg. 2000, CRB).

Ischnopoda leucopus (Marsh., 1802)

23-.1542.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, aber aus DGN noch nicht gemeldet.

An kiesigen Ufern.

WTL: Münster (WESTHOFF 1881) - Klarholz (Dahms leg. 1933, LMM) - Oelde (Dahms leg. 1933, LMM) - Münster: Gimbe (Terlutter leg. 1981, CTM) - Münster: Gelmer (Terlutter leg. 1982, CTM) - Harsewinkel (Renner leg. 1983, CRB) - Telgte: Westbevern (Terlutter leg. 1983, CTM) - Münster: Handorf (Terlutter leg. 1984, CTM) - Münster: Westbevern, Handorf (Renner leg. 1984, CRB) - Sassenberg (Renner leg. 1984, CRB) - Stadtlohn: Bockwinkel (Terlutter leg. 1984, CTM) - Bocholt: Suderwick (Terlutter leg. 1985, CTM) - Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Bokel/Ems (1989, WASNER i.l.) - Warendorf (Starke leg. 1990, CSW) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1991, CRE) - Gronau: Goorbach (Terlutter leg. 1993, CTM).

UWB: Neesen/Porta (Jankowski leg. 1956/57, CJB) - Barkhausen (Jankowski leg. 1967, CJB) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).

OWB: Paderborn (WESTHOFF 1881) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1974/81, CJB) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990, CWB, SMB).

SBL: Arnsberg (Varendorff leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902, MKB) - Overath (Rüschkamp, Schneider leg. 1928, MKB) - Solingen: Ohligs (Eigen leg. 1929, MKB) - Benrath (Eigen leg., MKB) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1958, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1958, KOCH i.l.) - Solingen (Modrow leg. 1958/59/60, MKB) - Erkrath (Koch leg. 1959/63, KOCH i.l.) - Breitscheid (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Gruiten (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1967, MKB) - Hagen (Drees leg. 1979/81/88/89, CDH) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1984, WENZEL 1989) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1987, CGL) - Medebach: Berge/Orketal (Terlutter leg. 1996, CTM).

Ischnopoda umbratica (Er., 1837)

23-.1542.002-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, aber aus DGN noch nicht gemeldet.

An schlammigen Ufern.

- WTL: Münster (Kolbe leg. 1876, LMM) - Lippstadt (WESTHOFF 1881) - Oelde (DAHMS 1928, Dahms leg. 1932, LMM) - Bochum (Hozman leg. 1971, CHE) - Salzkotten (Renner leg. 1982, CRB) - Stadtlohn: Bockwinkel (Terlutter leg. 1984, CTM) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1992, CRE) - Münster: Westbevern (Köhler leg. 1997, CKB, KÖHLER 2000).
- UWB: Porta/Weser (Peetz leg. 1925, LMM) - Holsen (Peetz leg. 1936, LMM) - Melbergen/Werre (Peetz leg. 1936, LMM) - Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1936, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1950/56, CJB) - Bielefeld-Schildesche (Renner leg. 1976, CRB) - Lage: Altholzhausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).
- OWB: Paderborn (WESTHOFF 1881) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1978, CJB) - Godelheim/Weser (Renner, Terlutter leg. 1991, CRB, CTM).
- SBL: Arnsberg (Varendorff leg., WESTHOFF 1881) - Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Witten (FÜGNER 1902) - Hösel (Koch leg. 1956/58/61, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1958/59/63/64, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1958/63, KOCH i.l.) - Mettmann: Schöllner (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Breitscheid (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Gruiten (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1962/64, KOCH i.l.) - Solingen (Modrow leg. 1962, MKB) - Ratingen (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Hagen (Drees leg. 1981, CDH).

Dasygnypeta velata (Er., 1837)

23-.155-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, aber aus DGN noch nicht gemeldet.

An kiesigen Ufern.

- WTL: Klarholz (Dahms leg. 1933, LMM) - Münster: Gimfte (Terlutter leg. 1983, CTM) - Salzkotten (Renner leg. 1983, CRB) - Telgte: Westbevern (Terlutter leg. 1983, CTM) - Münster: Westbevern (Renner leg. 1984, CRB) - Münster: Gimfte (Feldmann leg. 1990, CFM).
- UWB: Holzhausen (Jankowski leg. 1961, CJB) - Barkhausen (Jankowski leg. 1964, CJB) - Bielefeld-Schildesche (Renner leg. 1976, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/87, CRB) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).
- OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1966/74, CJB) - Dörentrup (Renner leg. 1976, CRB) - Brakel: Riesel (Renner leg. 1983, CRB) - Godelheim/Weser (Feldmann, Renner, Terlutter leg. 1991, CFM, CRB, CTM).
- SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884) - Solingen: Ohligs (Eigen leg. 1929, MKB, Modrow leg. 1957/62, MKB) - Benrath (Eigen leg., MKB) - Overath (Rüschkamp leg. 1932, MKB) - Erkrath (Koch leg. 1959/63, KOCH i.l.) - Breitscheid (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1962, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Brilon (Renner leg. 1990, CRB) - Hagen (Drees leg. 1990, CDH).

Gnypeta caerulea (Sahlb., 1831)

23-.156-.001-.

D.: boreoalpine Art, frühere Meldungen aus Nordwestdeutschland von HORION (1967) nicht mehr genannt

Westf.: Die Meldung aus Elberfeld ist als unrichtig anzusehen.

WTL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884): Meldung unrichtig.

Gnypeta ripicola (Kiesw., 1844)

23-.156-.002-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, aber aus DGN noch nicht gemeldet.

An Flußufern.

WTL: Oelde (DAHMS 1928) - Gütersloh: Barrelpäule/Brockhagen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Gronau: Goorbach (Terlutter leg. 1983/93, CTM) - Münster: Gimfte (Terlutter leg. 1983, CTM) - Münster: Handorf (Renner leg. 1983, CRB, RENNER et al.1986) - Vreden (Terlutter leg. 1983, CTM) - Stadthohn: Bockwinkel (Terlutter leg. 1984, CTM) - Münster: Davert (Starke leg. 1990, CSW) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Ahlen-Vorhelm (Röwekamp leg. 1995, CRE) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1996, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1998/99, CRB).

UWB: Neesen/Porta (Jankowski leg. 1956/57, CJB) - Holzhausen (Jankowski leg. 1963, CJB).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1974/75/78/79/81, CJB) - Kohlstädt (Braun leg. 1989, CBP) - Lichtenau: Altenau-Tal (Grundmann leg. 1989, CGL).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., KOCH 1968) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1958/62/63/66, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1958, KOCH i.l.) - Neandertal (Koch leg. 1958, KOCH 1968) - Solingen (Modrow leg. 1959/62, MKB, Gräf leg.1968, KOCH 1974) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1967, MKB, KOCH 1968) - Engelskirchen (Appel leg. 1976, KOCH 1978) - Hückeswagen (Wenzel leg. 1981/85/89, CWR) - Ennepetal (Drees leg. 1982, CDH, DREES 1998) - Radevormwald (Wenzel leg. 1983/84/87, WENZEL 1989) - Witten (Drees leg. 1983, CDH, DREES 1998) - Brilon: Alme (Starke leg. 1990, CSW) - Hagen (Drees leg. 1990, CDH, DREES 1998) - Plettenberg: Eiringhausen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Plettenberg (Erbeling leg. 1990, CERL) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1990, CGL) - Werdohl: Kettling (Grundmann leg. 1990, CGL) - Winterberg (Feldmann leg. 1990, CFM) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1991/92, WENZEL 1997) - Schwerte (Drees leg. 1991, CDH, DREES 1998) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Medebach: Berge/Orketal (Terlutter leg. 1996, CTM) - Möhnesee (Terlutter leg. 1998, CTM).

Gnypeta carbonaria (Mannh., 1830)

23-.156-.003-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

An schlammigen Ufern.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Soest (Buddeberg leg., WESTHOFF 1881) - Klarholz (Dahms leg. 1935, LMM) - Oelde (Dahms leg. 1935, LMM) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Salzkotten (Renner leg. 1983, CRB) - Münster:

Handorf (Renner leg. 1984, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1995/96/97/99, CRB).

UWB: Bünde/Else (Peetz leg. 1934, LMM) - Melbergen/Werre (Peetz leg. 1936, LMM) - Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1936, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1967, CJB) - Bielefeld: Jöllennebeck (Renner leg. 1978, CRB) - Lage: Altholzhausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984, CRB).

OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Godelheim/Weser (Renner leg. 1988, CRB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Siegen (Suffrian leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Solingen: Ohligs (Eigen leg., MKB, Modrow leg. 1958/62, MKB) - Erkrath (Koch leg. 1959/63, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Glör-Talsperre (Drees leg. 1978, CDH) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1984, WENZEL 1989) - Letmathe (Drees leg. 1986, CDH) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1987, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Sundern-Langscheid (Grundmann leg. 1988, CGL) - Brilon: Alme (Erbeling leg. 1990, CErL) - Plettenberg: Eiringhausen (Grundmann leg. 1990, CGL).

Gnypeta rubrior Totth., 1939

23-.156-.004-

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten, seltener als *G. carbonaria*.

An schlammigen Ufern.

DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1956, CJB).

WTL: Klarholz (Dahms leg. 1933, LMM) - Münster: Gimfte (Terlutter leg. 1982, CTM).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1936, LMM) - Holsen (Peetz leg. 1936, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1967, CJB).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1966/74, CJB) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1992, SMB).

SBL: Solingen: Ohligs (Eigen leg. 1929, MKB) - Overath (Rüschkamp leg. 1929/32, MKB) - Solingen (Modrow leg. 1962, KOCH 1968, KÖHLER 1993, MKB) - Westhofen (Drees leg. 1980, CDH) - Hagen (Drees leg. 1981, CDH) - Solingen (Gräf leg. 1982, KOCH 1992) - Attendorn: Borghausen (Grundmann leg. 1991, CGL).

Brachyusa concolor (Er., 1839)

23-.157-.001-

D.: fast in ganz Deutschland, aber hauptsächlich in der Ebene.

Westf.: selten, aber in allen fünf Teilgebieten.

An sandigen Ufern.

DGN: Dümmer: Hüde (Renner leg. 1983, CRB).

WTL: Ennigerloh (Dahms leg. 1929, HORION 1967) - Oelde (Dahms leg. 1929, HORION 1967) - Münster: Gimfte (Terlutter leg. 1982, CTM) - Salzkotten: Sültsoid (Wasner leg. 1982, WASNER i.l.) - Bielefeld: Steinhagen

(Renner leg. 1983, CRB) - Münster: Westbevern (Terlutter leg. 1984, CTM).

UWB: Minden: Barkhausen (Renner leg. 1983, CRB).

OWB: Godelheim/Weser (Renner leg. 1988, CRB).

SBL: Solingen (Modrow leg. 1954/57, KOCH 1968) - Breitscheid (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Burscheid (Kolbe leg. 1986, KOLBE & BRUNS 1988, KÖHLER 1997, MKB) - Westhofen (Drees leg. 1987, CDH, DREES 1996) - Glör-Talsperre (Drees leg. 1989, CDH, DREES 1996).

Dacrila fallax (Kr., 1856)

23-.1571.001-.

D.: vorzugsweise in der Ebene, Nachweislücken im Nordwesten.

Westf.: nur eine Meldung aus SBL.

In Bültten von Sumpfgräsern.

SBL: Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1992, WENZEL 1997).

Callicerus obscurus Grav., 1802

23-.158-.001-.

D.: in ganz Deutschland, meidet aber höhere Gebirge.

Westf.: aus DGN noch nicht gemeldet.

An Gewässerufeln, hygrophil.

WTL: Soest (Buddeberg leg., WESTHOFF 1881) - Soest (VERHOEFF 1890) - Bad Laer (Renner leg. 1981, CRB) - Essen (Hozman leg. 1985, CHE) - Münster (Wasner leg. 1986, CHE).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg., LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1978, CJB) - Leopoldshöhe (Grundmann leg. 1982, CGL) - Osnabrück (Kache leg. 1993, KACHE 1998) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.).

OWB: Beverungen (Figura leg. 1990, ASSING i.l.) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990, CWB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Soest (Verhoeff leg., MKB) - Haan/Solingen (Wenzel leg. 1973, KOCH 1992) - Langenberg (Wenzel leg. 1973, CWR) - Radevormwald (Wenzel leg. 1973, 1985, WENZEL 1989) - Wuppertal (Wenzel leg. 1976, CWR) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1987, CGL) - Plettenberg: Pasel (Grundmann leg. 1990, CGL) - Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Hohenlimburg (Drees leg. 1995, CDH) - Menden: Volkringhausen (Feldmann leg. 1995, CFM) - Unna: Geisecke (Flake leg. 1996, CFM) - Wetter/Ruhr (Drees leg. 1997, CDH) - Hagen (Drees leg. 1998, CDH).

Callicerus rigidicornis (Er., 1839)

23-.158-.002-.

D.: in Süden und Mitte, fehlt in der Ebene.

Westf.: aus DGN nicht gemeldet, auch sonst selten.

In Wäldern, auf Trockenhängen, nicht hygrophil.

- WTL: Essen (Hozman leg. 1971, CHE) - Bokel/Ems (1989, WASNER i.l.) - Dortmund: Dellwig (Platzek leg. 1990, CHE).
- UWB: Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Klaas leg. 1992, KACHE i.l.).
- OWB: Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1981, CRB, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Warburg: Weldaer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Höxter (Gerken leg. 1989, CAH, ASSING i.l.) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1992/94/98, CFM, FELDMANN & LÜCKMANN 1998).
- SBL: Bensberg (Aerts leg., KOCH 1968) - Hagen (Drees leg. 1979/83, CDH) - Wissen/Sieg: Roth (Stock leg. 1982, CRB) - Iserlohn (Erbeling leg. 1986, ERBELING & DREES 1992) - Letmathe (Erbeling leg. 1986, CERL, ERBELING & DREES 1992) - Unna: Geisecke (Flake leg. 1996, CFM).

Schistoglossa viduata (Er., 1837) 23-.160-.001-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: wenige Funde aus DGN.

In Sümpfen und Mooren.

DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1956/69, CJB) - Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991).

Schistoglossa drusilloides (Sahlb., 1876) 23-.160-.002-.

D.: im Norden, Oldenburg, Harz.

Westf.: keine Meldung .

In Sümpfen und Mooren.

Schistoglossa gemina (Er., 1837) 23-.160-.003-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: nur aus SBL gemeldet.

An Gewässerufern.

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, Geilenkeuser leg., KOCH 1968) - Radevormwald (Wenzel leg. 1988, WENZEL 1991) - Hückeswagen (Wenzel leg. 1990, WENZEL 1991) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1991/92, WENZEL 1997) - Westhofen (Drees leg. 1991, CDH) - Hagen (Drees leg. 1994, CDH) - Hohenlimburg (Drees leg. 1995, CDH).

Schistoglossa curtipennis (Shp., 1869) 23-.160-.004-.

D.: zerstreut, im Süden, Norden, Osten.

Westf.: keine Meldung.

In Sümpfen und Mooren.

Vogelsberg, Rhön (FRISCH 1995).

Schistoglossa aubei (Bris., 1860) 23-.160-.005-.

D.: zerstreut, im Süden, Norden, Osten.

Westf.: keine Meldung.

An Gewässerufern.

- Boreophilia eremita* (Rye, 1866) 23-.1601.0011.
D.: Hessen, Pfalz, Holstein.
Westf.: keine Meldung.
- Hydrosmeeta gracilicornis* (Er., 1839) 23-.164-.003-.
D.: aktuelle Funde nur aus Bayern, ältere auch aus dem Nordwesten.
Westf.: nur eine sehr alte Meldung.
In Kiesbänken von Bächen.
OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881).
- Hydrosmeeta eximia* (Shp., 1869) 23-.164-.004-.
D.: zerstreute Funde aus Süden und Westen.
Westf.: nur ein Fund aus SBL.
In Kiesbänken von Bächen.
SBL: Medebach: Gelängebach (Terlutter leg. 1996, CTM).
- Hydrosmeeta fragilis* (Kr., 1854) 23-.164-.006-.
D.: im Süden, Nordrhein, Osten.
Westf.: keine Meldung.
In Kiesbänken von Bächen.
- Hydrosmeeta longula* (Heer, 1839) 23-.164-.011-.
D.: fast in ganz Deutschland.
Westf.: in OWB und SBL gefunden.
In Kiesbänken von Bächen und Flüssen.
OWB: Porta Westfalica: Veltheim (Renner leg. 1984, CRB) - Godelheim/Weser (Renner leg. 1988, CRB).
SBL: Altena-Brachtenbeck (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg (Erbeling, Renner, Terlutter leg. 1988, CERL, CRB, CTM) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1988, CGL) - Schmallerberg (Renner leg. 1988, CRB) - Brilon: Alme (Renner leg. 1990, CRB) - Hagen (Drees leg. 1994/95, CDH) - Wetter/Ruhr (Drees leg. 1995, CDH) - Westhofen/Ruhr (Drees leg. 1997, CDH).
- Hydrosmeeta delicatula* (Shp., 1869) 23-.164-.013-.
D.: aktuelle Funde nur aus dem Osten, sehr alte auch aus dem Nordwesten.
Westf.: nur ein sehr alter Fund.
In Kiesbänken von Bächen.
SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884, WESTHOFF 1886, KOCH 1968).
- Hydrosmeeta subtilissima* (Kr., 1854) 23-.164-.018-.
D.: erst in der Hälfte aller Teilgebiete gefunden, sicherlich weiter verbreitet.
Westf.: nur aus SBL gemeldet.

In Kiesbänken von Bächen.

SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884, WESTHOFF 1886, KOCH 1968) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1986, WENZEL 1989, KOCH 1992) - Plettenberg (Erbeling leg. 1988, CErL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Westhofen/Ruhr (Drees leg. 1997, CDH).

Hydrosmeeta septentrionum (Benick, 1969) 23-.164-.0191.

D.: nur in wenigen Gebieten.

Westf.: nur in SBL gefunden.

Möglicherweise doch konspezifisch mit *H. subtilissima*.

SBL: Hagen (Drees leg. 1983/93/94, CDH).

Disopora languida (Er., 1837) 23-.1651.001-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: nur drei Funde.

An Ufern.

DGN: Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 1998, CTM).

WTL: Oelde (Dahms leg. 1925, DAHMS 1928).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968).

Disopora ultima (Benick, Lohse, 1959) 23-.1651.002-.

D.: nur in wenigen Gebieten an Elbe, Rhein, Donau.

Westf.: keine Meldung.

Disopora longicollis (Muls.Rey, 1852) 23-.1651.003-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: bis auf DGN aus allen Teilgebieten gemeldet.

WTL: Oelde (Dahms leg. 1933, LMM) - Dortmund (Appel leg. 1968, MKB) - Münster: Handorf (Terlutter leg. 1986, CTM) - Münster: Davert (Terlutter leg. 1990, CTM).

UWB: Bielefeld: Jöllenbeck (Renner leg. 1976, CRB) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983/84/87/88/89/94/96/98/99/2000, CRB) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1974/75/76/78, CJB) - Scherfede: Hardehausen (Grundmann leg. 1989, CGL).

SBL: Erkrath (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Breitscheid (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Wuppertal (KOLBE & HOUVER 1973, KOLBE 1978, 1994, 1996) - Hagen (Drees leg. 1988/90, CDH) - Hallenberg: Hesborn (Terlutter leg. 1996, CTM) - Medebach: Gelängebach (Terlutter leg. 1996, CTM).

Aloconota eichhoffi (Scriba, 1867) 23-.166-.003-.

D.: nur in wenigen Gebieten, überwiegend alte Meldungen.

Westf.: nur zwei alte Meldungen.

WTL: Oelde (Dahms leg. 1923, DAHMS 1928).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884).

Aloconota planifrons (Wtrh., 1864)

23-166-004-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, aber aus DGN noch nicht gemeldet.

WTL: Münster (Wasner leg. 1986, CHE) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1989/93/94/95/97/98/99, CRB) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1993/94, CRB) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1995/96, CRB).

UWB: Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1975, CRB, RENNER 1981b) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1985/87/88/89/94/98/99, CRB, CFM) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Kache leg. 1992, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Detmold: Lippischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1982, CRB, RENNER & GRUNDMANN 1984).

SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Barmen (Stachelhausen leg., KOCH 1968) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1986, WENZEL 1989, KOCH 1992) - Altena-Brachtenbeck (Grundmann leg. 1988, CGL) - Attendorn: Repetal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop-Rönkhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Selscheid (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988/90, CGL) - Schmalleberg: Latrop-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Sundern-Allendorf (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Wipperfürth (Wenzel leg. 1991, CWR) - Westhofen (Drees leg. 1999, CDH).

Aloconota cambrica (Woll., 1855)

23-166-006-.

D.: fehlt wohl nur in der Ebene.

Westf.: nur in OWB und SBL gefunden.

An kiesigen Bachufern.

OWB: Brakel: Riesel (Renner leg. 1983, CRB, RENNER et al. 1986) - Godelheim/Weser (Renner leg. 1988, CRB) - Lichtenau: Altenau-Tal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Godelheim/Weser (Terlutter leg. 1991, CTM).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, GEILENKEUSER 1896) - Engelskirchen (Appel leg. 1979, MKB) - Attendorn: Repetal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988/91, CGL) - Lennetal: Latrop (Terlutter leg. 1988, CTM) - Meinerzhagen: Fürwigge-Talsperre (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg (Erbeling, Renner, Terlutter leg. 1988, CERL, CRB, CTM) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Rothaargebirge: Drommecke (Terlutter leg. 1988, CTM) - Schmalleberg (Renner, Grundmann leg. 1988, CRB, CGL) - Sundern-Allendorf (Grundmann

leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Plettenberg: Eiringhausen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Iserlohn (Feldmann leg. 1993, CFM) - Medebach: Gelängebach (Terlutter leg. 1996, CTM) - Hagen (Drees leg. 1997/98, CDH, DREES 1998).

Aloconota currax (Kr., 1856)

23-.166-.008-.

D.: fehlt wohl nur in der Ebene.

Westf.: bevorzugt im Bergland.

An Bachufern.

WTL: Dortmund: Dellwig (Platzek leg. 1990, CHE).

OWB: Paderborn: Grundsteinheim (Starke leg. 1988, CSW).

SBL: Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1987, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Lennetal: Latrop (Terlutter leg. 1988, CTM) - Plettenberg (Renner leg. 1988, CRB) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann, Terlutter leg. 1988, CGL, CTM) - Schmallenberg (Renner leg. 1988, CRB) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Iserlohn (Feldmann leg. 1993, CFM) - Werdohl (Terlutter leg. 1994, CTM) - Ennepetal (Drees leg. 1997, CDH, DREES 1998) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel leg. 1997, CWR) - Hohenlimburg (Drees leg. 1997, CDH) - Winterberg (Feldmann leg. 1999, CFM).

Aloconota mihoki (Bernh., 1913)

23-.166-.010-.

D.: fehlt teilweise im Norden.

Westf.: verbreitet, aber aus DGN noch nicht gemeldet.

An Bachufern.

WTL: Ladbergen: Eltingmühlenbach (Terlutter leg. 1993, CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1995, CRB).

UWB: Bielefeld: Olderdissen (Puthz leg. 1963, PUTHZ 1967).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1974, CJB) - Kohlstädt (Braun leg. 1992, CBP).

SBL: Ratingen (Ermisch leg. 1936, KOCH 1968) - Neandertal (Koch leg. 1964, KOCH 1968) - Ramsbeck/Meschede: NSG Plästerlegge (Rehage leg. 1970, CRD) - Iserlohn (Erbeling leg. 1986, ERBELING & DREES 1992) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Lenne: Uentrop (Terlutter leg. 1988, CTM) - Lennetal: Latrop (Terlutter leg. 1988, CTM) - Plettenberg (Renner, Grundmann, Terlutter leg. 1988, CRB, CGL, CTM) - Rothaargebirge: Drommecke (Terlutter leg. 1988, CTM) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989/90, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Ennepetal (Drees leg. 1990/97, CDH, DREES 1998) - Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Letmathe (ERBELING & DREES 1992) - Hagen (Drees leg. 1993/94/97, CDH, DREES 1998) - Iserlohn: Hemer (Terlutter leg. 1993, CTM) - Werdohl

(Terlutter leg. 1994, CTM) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel leg. 1998, CWR).

Aloconota sulcifrons (Steph., 1832)

23-.166-.011-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, aber aus DGN nicht gemeldet.

An Bachufern.

WTL: Oelde (Dahms leg. 1925, LMM, DAHMS 1928) - Salzkotten (Renner leg. 1983, CRB).

UWB: Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1987/88, CRB).

OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Amelunxen (Renner leg. 1988, CRB) - Godelheim/Weser (Renner leg. 1988, CRB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Witten (FÜGNER 1902) - Berg. Gladbach (Rüschkamp leg. 1935, MKB) - Erkrath (Koch leg. 1958/64, KOCH i.l.) - Solingen (Modrow leg. 1958, KOCH 1968, MKB) - Neandertal (Koch leg. 1964, KOCH 1968) - Hagen (Drees leg. 1982/87/88, CDH) - Plettenberg: Pasel (Grundmann leg. 1987, CGL) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1987, WENZEL 1989) - Attendorn: Repetal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Brilon: Itertäl (Terlutter leg. 1986, CTM) - Plettenberg (Renner, Grundmann leg. 1988, CRB, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988/90, CGL) - Rothaargebirge: Drommecke (Terlutter leg. 1988, CTM) - Schmallenberg (Renner leg. 1988, CRB) - Sundern-Allendorf (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989/90, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Brilon: Alme (Starke leg. 1990, CSW) - Werdohl: Ketting (Grundmann leg. 1990, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Wipperfürth (Wenzel leg. 1991, CWR) - Hönnetal (Grundmann leg. 1992, CGL) - Iserlohn (Feldmann leg. 1993, CFM) - Freienohl (Röwekamp leg. 1994, CRE) - Menden (Feldmann leg. 1997, CFM) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel leg. 1998, CWR).

Aloconota insecta (Thoms., 1856)

23-.166-.012-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, aber aus DGN noch nicht gemeldet.

WTL: Ostenfelde (Dahms leg. 1929, LMM) - Saerbeck/Ems (Peetz leg. 1936, LMM) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1976, CRB) - Münster: Handorf (Terlutter leg. 1984, CTM) - Münster: Westbevern (Renner leg. 1984, CRB, Köhler leg. 1997, CKB, KÖHLER 2000) - Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Warendorf (Starke leg. 1987, CSW) - Münster: Gimfte (Feldmann leg. 1988/90, CFM) - Münster: Handorf (Feldmann leg. 1988, CFM) - Bokel/Ems (1989/91, WASNER i.l.) - Gronau: Goorbach (Terlutter leg. 1989, CTM) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1991, CRE) - Gronau: Goorbach (Terlutter leg. 1993, CTM).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1950/60/62, CJB) - Bielefeld: Schildesche, Leopoldshöhe (Renner leg. 1982, CGL, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1985/87, CRB) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).

- OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1966, CJB) - Diemeltal: Lamerden (Terlutter leg. 1986, CTM) - Godelheim/Weser (Renner leg. 1988, CRB, Terlutter leg. 1991, CTM) - Willebadessen (Renner leg. 1989, CRB).
- SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Altenkirchen (Rüschkamp leg. 1929, MKB) - Siegtal (Appel leg. 1947, MKB) - Imhausen/Sieg (Appel leg. 1954, MKB) - Hilden (Koch leg. 1957, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1968, MKB) - Wissen/Sieg: Roth (Stock leg. 1976, CSR) - Hagen (Drees leg. 1981/82/89, CDH) - Solingen (KOLBE 1987, 1992) - Finnentrop-Rönkhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Schmalleberg: Latrop-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Lahmer Bachtal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Plettenberg: Eiringhausen (Grundmann leg. 1990/91, CGL) - Plettenberg (Erbeling leg. 1990/91, CERL) - Plettenberg: Pasel (Grundmann leg. 1990, CGL) - Werdohl: Kettling (Grundmann leg. 1990, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Wipperfürth (Wenzel leg. 1991, CWR) - Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Hönnetal (Grundmann leg. 1992, CGL) - Plettenberg (Feldmann leg. 1992, CFM).

Aloconota subgrandis (Brundin, 1954) 23-.166-.013-

D.: in etlichen Teilgebieten noch nicht gefunden.

Westf.: bisher nicht in WTL, OWB.

DGN: Steinfurt: NSG Wiechholz (Feldmann leg. 1998, CFM) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Feldmann leg. 1998, CFM).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1967/79, CJB, Borcharding leg., BORCHERING 1994) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983, CRB, RENNER et al. 1986, Renner leg. 1985/87/88/98/99, CRB).

SBL: Solingen (Modrow leg. 1963, KOCH 1974) - Schmalleberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/88, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Neheim-Hüsten: Herdringen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Solingen (KOLBE 1992).

Aloconota gregaria (Er., 1839) 23-.166-.014-

D.: in ganz Deutschland, eine der häufigsten Staphyliniden.

Westf.: aus allen allen fünf Teilgebieten zahlreiche Funde.

Ubiquist.

Enalodroma hepatica (Er., 1839) 23-.1661.001-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Steinfurt: NSG Wiechholz (Feldmann leg. 1998, CFM).

WTL: Oelde (Dahms leg. 1929, LMM) - Bochum (Hozman leg. 1974, CHE) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1977/78, CRB, RENNER 1980) - Bilerbeck: Darfeld (Terlutter leg. 1995, CTM).

- UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1958/67/79, CJB) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 2000, CRB).
- OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1980, CJB) - Marsberg: Dahlberg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1994, FELDMANN & LÜCKMANN 1998) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).
- SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Wuppertal (Müller leg. 1926, MKB) - Hückeswagen (Eigen leg., MKB) - Solingen (Modrow leg. 1972, MKB) - Engelskirchen (Appel leg. 1974, MKB) - Wuppertal (KOLBE 1978, 1982) - Solingen (KOLBE 1984a, 1992) - Arolsen: Landau (Renner leg. 1986, CRB) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/87, CGL) - Finnentrop-Wildewiese (Grundmann leg. 1988, CGL) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1992, WENZEL 1997) - Hagen (Drees leg. 1995, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1995, CWR).

Pycnota paradoxa (Muls.Rey, 1861)

23-.167-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: aus allen fünf Teilgebieten gemeldet.

DGN: Holzhausen (Peetz leg. 1936, LMM) - Hartum (Jankowski leg. 1974/77, CJB).

WTL: Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1992, CRB) - Münster: Gimbt (Feldmann leg. 1989, CFM) - Münster: Gelmer (Feldmann leg. 1990, CFM) - Münster: Nienberge (Feldmann leg. 1992, CFM) - Ahlen (Röwekamp leg. 1992, CRE) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1994, CRB).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935/36, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1956/75, CJB) - Herford: Schweicheln-Bermbeck (Grundmann leg. 1983, CGL).

OWB: Lichtenau: Geimer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Beverungen (Figura leg. 1990, ASSING i.l.) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1993, FELDMANN & LÜCKMANN 1998).

SBL: Hückeswagen (Eigen leg., MKB) - Wuppertal (KOLBE & HOUVER 1973, KOLBE 1978) - Hönnetal (REHAGE & FELDMANN 1977) - Engelskirchen (Appel leg. 1979, MKB) - Hagen (Drees leg. 1987/88/90, CDH) - Plettenberg: Ohle (Grundmann leg. 1989, CGL) - Herscheid: Hüinghausen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Plettenberg: Pasel (Grundmann leg. 1990, CGL) - Schmallenberg (Grundmann leg. 1990, CGL).

Amischa analis (Grav., 1802)

23-.168-.001-.

D.: in ganz Deutschland, meist häufigste Art der Gattung.

Westf.: zahlreiche Meldungen aus allen fünf Teilgebieten.

Überall häufige Art der Bodenstreu.

Amischa bifoveolata (Mannh., 1830)

23-.168-.002-.

D.: in ganz Deutschland.

- Westf.: aus allen allen fünf Teilgebieten gemeldet.
- DGN: Hartum (Jankowski leg. 19748 CJB) - Häverner Marsch (Grundmann leg. 1982, CGL) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).
- WTL: Rheda (Rehage leg., CRD, REHAGE 1972) - Wiedenbrück: Langenberg (Rehage leg., CRD, REHAGE 1972) - Haltern: Groß Reken (Hozman leg. 1974, CHE) - Dorsten (Hozman leg. 1975, CHE) - Oerlinghausen: Senne (Grundmann leg. 1982, CGL) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1985, CTM) - Heek/Ahaus: NSG Füchte-Kallenbeck (Terlutter leg. 1986, CTM) - Münster: Gimbe (Feldmann leg. 1990, CFM) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1996, CRB).
- UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1932, LMM) - Bielefeld: Brönninghausen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bad Salzuflen: Bexter Wald (Grundmann leg. 1982, CGL) - Lage: Altholzhausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Klaas leg. 1992, KACHE i.l., Kache leg. 1993/94, KACHE 1998) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.).
- OWB: Diemeltal: Lamerden (Terlutter leg. 1986, CTM) - Lichtenau: Geimer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Scherfede: Scheffelberg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Warburg: Weldaer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Lichtenau: Altenau-Tal (Grundmann leg. 1989, CGL).
- SBL: Elberfeld (GEILENKEUSER 1896) - Witten (FÜGNER 1902) - Meschede (Hozman leg. 1972, CHE) - Hagen (Drees leg. 1981/90/92, CDH) - Solingen (KOLBE 1984a, 1987, 1988, 1992) - Attendorn: Repetal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Lennetal: Latrop (Terlutter leg. 1988, CTM) - Meinerzhagen: Fürwigge-Talsperre (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg (Grundmann leg. 1988, CGL, Erbeling leg. 1990, CERL) - Sundern-Allendorf (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Ahaus: Wüllen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Wiblingwerde (Drees leg. 1990, CDH) - Attendorn: Borghausen (Grundmann leg. 1991, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1991, WENZEL 1997).

Amischa nigrofuscus (Steph., 1832)

23-168-004-.

D.: in ganz Deutschland.

- Westf.: aus allen allen fünf Teilgebieten gemeldet.
- DGN: Hartum (Jankowski leg. 1982, CJB) - Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Feldmann leg. 1998, CFM).
- WTL: Coesfeld (Hozman leg. 1975, CHE) - Vreden: NSG Ellewicker Feld (Terlutter leg. 1983, CTM) - Niederntudorf/Alme (Braun leg. 1986, CBP) - Gronau: NSG Amtsvenn (Terlutter leg. 1988, CTM) - Ahaus: Wüllen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Münster: Davert (Feldmann, Terlutter leg. 1990, CFM, CTM) - Lüdinghausen: Olfen (Terlutter leg. 1992, CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993/94/95/96/97/98/

99, CRB) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1995, CRB) - Vreden: Zwillbrocker Venn (Feldmann leg. 1995, CFM) - Ahaus: NSG Graeser Venn (Feldmann, Terlutter leg. 1996, CFM, CTM) - Emsdetten: NSG Emsdettener Venn (Terlutter leg. 1996, CTM).

UWB: Bielefeld: Lämershagen (Renner leg. 1980, CRB) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 1982, CRB, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1999/2000, CRB) - Detmold: Lippischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Höxter: Ziegenberg (Grundmann leg. 1982, CGL) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982, CRB, RENNER 1985) - Georgsberg/Willebadesen (Renner leg. 1983, CRB) - Warburg: Weldaer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Scherfede: Hardehausen (Grundmann leg. 1989, CGL) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91, CWB) - Marsberg/Diemel (Feldmann leg. 1993/94, CFM, FELDMANN & LÜCKMANN 1998).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Solingen (Modrow leg. 1953/65, KOCH 1968, MKB) - Breitscheid (Koch leg. 1958, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1959/63, KOCH i.l.) - Neandertal (Koch leg. 1959/63, KOCH 1968) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Solingen (KOLBE 1981, 1984a, 1988, 1992) - Radevormwald (Wenzel leg. 1984/85/90, WENZEL 1989) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/87/88, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988/91, CGL) - Meinerzhagen: Fürwigge-Talsperre (Grundmann leg. 1988, CGL) - Sundern-Allendorf (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Lahmer Bachtal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Finntrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1991, WENZEL 1997) - Plettenberg: Böhl (Grundmann leg. 1991, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992, CWR, WENZEL 1994) - Wuppertal (KOLBE 1992, 1994, 1996) - Schmallenberg: Altenilpe (Grundmann leg. 1994, CGL) - Hagen-Halchen (Drees leg. 1998, CDH) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1998, CWR).

Amischa decipiens (Shp., 1869)

23-.168-.007-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: aus allen allen fünf Teilgebieten gemeldet.

In neuerer Zeit häufiger geworden.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Feldmann leg. 1998, CFM).

WTL: Oerlinghausen: Senne (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Vreden: NSG Ellewicker Feld (Terlutter leg. 1988, CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1989/93/94, CRB) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1990/94, CRB) - Münster: Davert (Terlutter leg. 1990, CTM) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991,

CKB) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1992/93, CRE) - Gronau: Goorbach (Terlutter leg. 1993, CTM) - Haltern (Ahrens leg. 1994, KÖHLER i.l.) - Billerbeck: Darfeld (Terlutter leg. 1995, CTM) - Ahaus: NSG Graeser Venn (Terlutter leg. 1996, CTM) - Emsdetten: NSG Emsdettener Venn (Terlutter leg. 1996, CTM).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1976, CJB) - Lage: Altholzhausen (Grundmann leg. 1983, CGL) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1989/93/94, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1993, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcharding leg., BORCHARDING 1994) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Minden: Wesertal (Renner leg. 1995, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1996, CRB).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1975, CJB).

SBL: Erkrath (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Neandertal (Koch leg. 1959/63, KOCH 1968) - Ratingen (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Gruiten (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Solingen (Gräf leg. 1988, MKB) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Hagen: Bathey (Drees leg. 1992, CDH) - Wuppertal (KOLBE 1994).

Amischa forcipata Muls.Rey, 1873

23-.168-.008-.

D.: fast überall mit Ausnahme des Nordens.

Westf.: nur wenige Funde aus SBL.

SBL: Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg.1964, KOCH 1974, Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Burscheid (Kolbe leg. 1986, KOLBE & BRUNS 1988, KÖHLER 1997, MKB) - Finnentrop: Ostentrop (Grundmann leg. 1991, CGL).

Amidobia talpa (Heer, 1841)

23-.169-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: aus DGN und OWB noch nicht gemeldet.

In *Formica*-Nestern.

WTL: Oerlinghausen: Senne (Grundmann leg. 1982, CGL) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1986, CTM) - Warendorf (Starke leg. 1989, CSW) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1994, CRB).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935/36, LMM) - Melle (PEETZ 1936) - Barkhausen (Jankowski leg. 1960/61, CJB) - Neesen/Porta (Jankowski leg. 1961, CJB) - Bielefeld: Buschkamp (Renner leg. 2000, CRB).

SBL: Elberfeld (GEILENKEUSER 1896) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Overath (Rüschkamp leg. 1929, MKB) - Hagen (Drees leg. 1978/87, CDH) - Engelskirchen (Appel leg. 1979, MKB) - Hückeswagen (Wenzel leg. 1983/86, CWR) - Hohenlimburg (Drees leg. 1989, CDH) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989/90, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg., WENZEL 1989) - Ennepetal (Drees leg. 1993, CDH) - Remscheid (Wenzel leg. 1996, CWR).

Lypoglossa lateralis (Mannh., 1830)

23-.170-.001-.

D.: fehlt im Norden, auch sonst nicht in allen Gebieten gefunden.

Westf.: wenige Funde aus OWB und SBL.

OWB: Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1982, CRB, RENNER et al. 1986) - Lichtenau: Altenau-Tal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Scherfede: Hardehausen (Grundmann leg. 1989, CGL).

SBL: Sundern-Langscheid (Grundmann leg. 1988, CGL).

Nehemitropia lividipennis (Mannh., 1831)

23-.171-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: aus allen allen fünf Teilgebieten vielfach gemeldet.

An Faulstoffen aller Art.

DGN: Petershagen (BARNER 1922) - Nettelstedter Moor (Peetz leg. 1935, LMM) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Feldmann leg. 1998, CFM).

WTL: Lippstadt (Buddeberg leg., WESTHOFF 1881) - Oelde (Dahms leg. 1935, LMM) - Saerbeck/Ems (PEETZ 1937, LMM) - Bochum (Hozman leg. 1972, CHE) - Warendorf (Starke leg. 1986/92/94, CSW) - Münster: Rieselfelder (Terlutter leg. 1987, CTM) - Münster (Feldmann leg. 1989, CFM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1989/92/95/98, CRB) - Vreden: NSG Ellewicker Feld (Terlutter leg. 1988, CTM) - Hövelhof/Senne: NSG Moosheide (Renner leg. 1990/93, CRB) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1993, CRB) - Münster: Davert (Starke leg. 1993, CSW) - Billerbeck (Terlutter leg. 1995, CTM).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1933/35, LMM) - Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1977/78, CRB, RENNER 1981b) - Bad Salzuflen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/87/88/89/94/96/2000, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Georgsberg/Willebaddessen (Renner leg. 1982/83, CRB) - Höxter: Ziegenberg (Grundmann leg. 1982, CGL) - Paderborn (Braun leg. 1982, CBP) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982/83, CRB, RENNER 1985) - Paderborn: Benhausen (Braun leg. 1992, CBP).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Düsseldorf: zahlreiche Funde (Koch leg. 1960-67, KOCH i.l.) - Hagen (Drees leg. 1975/88/90/91, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1987, WENZEL 1989) - Finnentrop-Wildewiese (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Lahmer Bachtal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Sundern: Röhrenspring (Grundmann leg. 1991, CGL) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Lappann leg. 1998, CWR).

Notothecta flavipes (Grav., 1806)

23-.172-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, aber aus DGN und OWB noch nicht gemeldet.

In *Formica*-Nestern.

- WTL: Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1979, CRB, RENNER 1980) - Oerlinghausen: Senne (Grundmann leg. 1982, CGL) - Salzkotten: Thüle (Braun leg. 1983, CBP) - Warendorf (Starke leg. 1985/87/89, CSW) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1993, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1995/97, CRB) - Gronau: NSG Amtsvenn (Terlutter leg. 1996, CTM) - Münster: Hiltrup (Feldmann leg. 1998, CFM).
- UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1936, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1958/60/68, CJB) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Halle (Pohl-Apel leg. 1985, CRB, POHL-APEL & RENNER 1987) - Bielefeld: Buschkamp (Renner leg. 2000, CRB).
- SBL: Arnsberg (Varendorff leg., WESTHOFF 1881) - Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902, MKB) - Overath (Rüschkamp leg. 1929, MKB) - Wuppertal (KOLBE 1973, 1978) - Hückeswagen (Eigen leg., MKB; Wenzel leg. 1983/86/87, CWR) - Hagen (Drees leg. 1987/93, CDH) - Westhofen (Hellweg leg. 1987, CHF, Drees leg. 1999, CDH) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989/90, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Radevormwald (Wenzel leg. 1989, CWR) - Hohenlimburg (Drees leg. 1996, CDH) - Remscheid (Wenzel leg. 1996, CWR).

Notothecta confusa (Märk., 1844)

23-.172-.002-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: nur drei Funde.

Myrmecophil, vorzugsweise bei *Lasius fuliginosus*.

WTL: Münster (Kolbe leg., WESTHOFF 1881).

UWB: Bielefeld: Stadtgebiet (Renner leg. 1988, CRB).

SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884, KOCH 1968).

Lyprocorrhe anceps (Er., 1837)

23-.1721.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, aber aus DGN und OWB noch nicht gemeldet.

In *Formica*-Nestern.

WTL: Münster (Kolbe leg., WESTHOFF 1881) - Oerlinghausen: Senne (Grundmann leg. 1982, CGL) - Warendorf (Starke leg. 1987/92, CSW) - Gronau: NSG Amtsvenn (Terlutter leg. 1996, CTM) - Münster: Hiltrup (Feldmann leg. 1998, CFM) - Bielefeld: Augustdorf (Renner leg. 2000, CRB).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935/36, LMM) - Melle (PEETZ 1936) - Barkhausen (Jankowski leg. 1956/60/61/64, CJB) - Neesen/Porta (Jankowski leg. 1965, CJB) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Grundmann leg. 1982, CGL).

SBL: Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Elberfeld (CORNELIUS 1884) - Overath (Rüschkamp leg. 1929, MKB) - Engelskirchen (Appel leg. 1979, MKB) - Hagen (Drees leg. 1979, CDH) - Solingen (Gräf leg. 1984, MKB) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989/90, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Plettenberg: Leinschede

(Grundmann leg. 1990, CGL, CFM) - Ennepetal (Drees leg. 1993, CDH) - Hohenlimburg (Drees leg. 1996, CDH) - Remscheid (Wenzel leg. 1996, CWR).

Neohilara subterranea (Muls.Rey, 1853) 23-.173-.001-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: nur wenige Funde.

Fangmethode: Bodenfallen, Autokescher.

WTL: Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993/94/96, CRB, RENNER 1998) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1994, CRB, RENNER 1998).

UWB: Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).

OWB: Scherfede: Scheffelberg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Warburg: Weldaer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL).

SBL: Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel leg. 1997, CWR).

Alaobia scapularis (Sahlb., 1831) 23-.174-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: bisher nur im Bergland.

Mycetophage Art.

UWB: Holsen (Peetz leg. 1936, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1956, CJB) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).

OWB: Körbecke (Kroker leg. 1978/79, KROKER & RENNER 1983) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1980/82, CRB) - Georgsberg/Willebadesen (Renner leg. 1980, CRB) - Warburg: Hellberg/Scherfede (Renner leg. 1980/82, CRB) - Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1981, CRB) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1993/94, CFM, FELDMANN & LÜCKMANN 1998) - Eberschütz/Diemel (Lückmann leg. 1995, CFM).

SBL: Düsseldorf: Hösel (Koch leg. 1963, KOCH 1968) - Heiligenhaus: Vogel-sangbachtal (Wenzel, Lappann leg. 1997/98, CWR).

Dochmonota clancula (Er., 1837) 23-.176-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: nur wenige Funde.

DGN: Hopsten: NSG Heiliges Meer (Feldmann, Terlutter leg. 1998, CFM, CTM).

WTL: Halle (Grundmann leg. 1981, CRB, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Gütersloh: Barrelpäule/Brockhagen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Münster: Handorf (Terlutter leg. 1986, CTM).

OWB: Godelheim/Weser (Terlutter leg. 1991, CTM).

SBL: Elberfeld (Cornelius, Geilenkeuser, KOCH 1968) - Schmallenberg: Aberg (Grundmann leg. 1986, CGL).

- Dochmonota rudiventris* Epph., 1886 23-.176-.002-
D.: zerstreute Funde von Hessen über Sachsen bis Holstein.
Westf.: keine Meldung
- Tomoglossa luteicornis* (Er., 1837) 23-.177-.001-
D.: aus der Mehrzahl der Teilgebiete gemeldet.
Westf.: nur zwei Funde aus SBL.
SBL: Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1966, KOCH 1968) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL).
- Ousipalia caesula* (Er., 1839) 23-.178-.001-
D.: fast in ganz Deutschland.
Westf.: aus OWB noch nicht gemeldet.
Bewohner dürrer Sandböden.
DGN: Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 1998, CTM).
WTL: Münster (Kolbe leg., WESTHOFF 1881) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1985, CRB, RENNER 1987) - Herzebrock: Clarholz (Terlutter leg. 1986, CTM) - Greven: NSG Boltenmoor (Terlutter leg. 1987, CTM).
UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1966, CJB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Klaas leg. 1992, KACHE i.l., Kache leg. 1993, KACHE 1998) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.).
SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968).
- Geostiba circellaris* (Grav., 1806) 23-.180-.003-
D.: in ganz Deutschland, einer der häufigsten Bodenbewohner.
Westf.: zahlreiche Meldungen aus allen fünf Teilgebieten.
Überall häufiger Bodenbewohner
- Taxicera sericophila* (Baudi, 1869) 23-.181-.003-
D.: nur in wenigen Gebieten.
Westf.: keine Meldung.
- Taxicera renneri* Benick, 1982 23-.181-.0031.
D.: nur in wenigen Gebieten.
Westf.: auf Trockenhängen in UWB, OWB.
Möglicherweise konspezifisch mit *T. sericophila*.
UWB: Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).
OWB: Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1980/81/82, CRB, RENNER 1982, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Diemeltal: Lamerden (Renner leg. 1981, CRB) - Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1981/82, CRB, RENNER 1982, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Höxter (Gerken leg. 1989, CAH, ASSING i.l.) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg.

1993/94, CFM, FELDMANN & LÜCKMANN 1998) - Eberschütz/Diemel (Lückmann leg. 1996, CFM).

Taxicera perfoliata (Muls.Rey, 1873) 23-.181-.004-.

D.: im Süden, nach Norden bis zum Rheinland.

Westf.: keine Meldung.

Hofgeismar (Folwaczny leg. 1929, FOLWACZNY 1972).

Taxicera deplanata (Grav., 1802) 23-.181-.005-.

D.: Süden und Westen, Thüringen.

Westf.: im Bergland.

OWB: Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1981/82, CRB, RENNER 1982, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Diemeltal: Lamerden (Renner leg. 1981, CRB) - Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1982, CRB) - Höxter (Gerken leg. 1989, CAH, ASSING i.l.) - Marsberg/Diemel (Landwehr leg. 1991).

SBL: Arnsberger Wald: Heve (Buddeberg leg., WESTHOFF 1881).

Dinaraea angustula (Gyll., 1810) 23-.182-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

In Feuchtsubstraten.

DGN: Häverner Marsch (Grundmann leg. 1982, CGL) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Klarholz (Dahms leg. 1929, LMM) - Münster (PEETZ 1937) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1976/77, CRB, RENNER 1980) - Münster: Westbevern (Terlutter leg. 1984, CTM) - Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Warendorf: Drensteinfurt (Terlutter leg. 1986, CTM) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1987, CTM) - Bokel/Ems (1989/91, WASNER i.l.) - Münster: Handorf (Terlutter leg. 1990, CTM) - Ahlen-Dolberg (Röwekamp leg. 1991, CRE) - Warendorf (Röwekamp leg. 1993, CRE) - Ahaus: Butenfeld (Terlutter leg. 1994, CTM) - Münster: Westbevern (Köhler leg. 1997, CKB, KÖHLER 2000) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1999, CRB).

UWB: Eickum (Barner leg. 1931, 1932, LMM) - Preuß. Oldendorf (PEETZ 1931) - Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1932/35, LMM) - Porta/Weser (Peetz leg. 1935, LMM) - Lage: Altholzhausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1988/89/94/99, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995) - Osnabrück (Klaas leg. 1992, KACHE i.l., Kache leg. 1992/93, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcharding leg., BORCHERDING 1994) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.) - Minden: Wesertal (Renner leg. 1995, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Paderborn (WESTHOFF 1881) - Körbecke (Kroker leg. 1978/79, KROKER & RENNER 1983) - Diemeltal: Lamerden (Renner leg. 1981, CRB) -

Warburg: Hellberg/Scherfede (Renner leg. 1983, CRB) - Godelheim/Weser (Renner leg. 1988/91, CRB) - Scherfede: Hardehausen (Grundmann leg. 1989, CGL) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990, CWB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Siegen (WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Overath (Rüschkamp leg. 1928, MKB) - Benrath (Eigen leg., MKB) - Hückeswagen (Eigen leg., MKB) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1956/64, MKB) - Hilden (Koch leg. 1957/63/64, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1957, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1962, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1967, KOCH i.l.) - Solingen (KOLBE 1984a, 1984b, 1992) - Westhofen (Drees leg. 1984, CDH) - Arolsen: Landau (Renner leg. 1986, CRB) - Hückeswagen (Wenzel leg. 1988, CWR) - Plettenberg (Renner leg. 1988, CRB) - Radevormwald (Wenzel leg. 1988, WENZEL 1989) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Eiringhausen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Plettenberg: Pasel (Grundmann leg. 1990, CGL) - Witten (Drees leg. 1990, CDH) - Attendorn: Borghausen (Grundmann leg. 1991, CGL) - Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Plettenberg (Erbeling leg. 1992, CERL) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1998, CWR).

Dinaraea aequata (Er., 1837)

23-.182-.002-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: zahlreiche Funde aus allen fünf Teilgebieten.

Rindenbewohner.

Dinaraea linearis (Grav., 1802)

23-.182-.003-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

Rindenbewohner.

DGN: Hartum (Jankowski leg. 19747 CJB) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Münster (WESTHOFF 1881) - Oelde (Dahms leg. 1929/35, LMM) - Bielefeld-Eckardtsheim (Renner leg. 1974, CRB) - Senne: Stapelage (Grundmann leg. 1981, CGL) - Münster: Gimble (Terlutter leg. 1982, CTM) - Münster: Westbevern (Terlutter leg. 1984, CTM) - Vreden (Terlutter leg. 1985, CTM) - Münster: Werse (Terlutter leg. 1986, CTM) - Oelde-Stromberg (Röwekamp leg. 1991, CRE) - Münster: Davert (Feldmann leg. 1992, CFM) - Warendorf (Starke leg. 1993, CSW).

UWB: Mennighüffen (Barner leg. 1910, LMM, BARNER 1922, PEETZ 1931) - Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1954/56/69, CJB) - Holzhausen (Jankowski leg. 1975, CJB) - Bielefeld: Lämershagen (Renner leg. 1978, CRB) - Bad Salzuflen: Bexter Wald (Grundmann leg. 1980/81/82, CGL) - Bielefeld: Niederdornberg (Grundmann leg. 1980, CGL) - Lage: Altholzhausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1988/98, CRB).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1966/80/82, CJB) - Schlangen (Braun leg. 1981, CBP) - Scherfede: Hardehausen (Grundmann leg. 1989, CGL) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Siegen (Suffrian leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Benrath (Eigen leg., MKB) - Hückeswagen (Eigen leg., MKB) - Solingen (Modrow leg. 1959/64, MKB) - Hösel (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Warstein (Hozman leg. 1972, CHE) - Hagen (Drees leg. 1978/80/92, CDH) - Schmallenberg: Härdler (Terlutter leg. 1983, CTM) - Radevormwald (Wenzel leg. 1985/86, WENZEL 1989) - Schmallenberg: Aberg (Grundmann leg. 1986, CGL) - Solingen (KOLBE 1992) - Wuppertal (KOLBE 1996).

Dinaraea arcana (Er., 1839)

23-.182-.004-.

D.: in etlichen Gebieten noch nicht gefunden.

Westf.: nur drei Funde.

Rindenbewohner.

DGN: Hartum (Jankowski leg. 1970, CJB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992).

Paranopleta inhabilis (Kr., 1856)

23-.183-.001-.

D.: nur in wenigen Gebieten.

Westf.: nur die sehr alten Meldungen aus Wuppertal.

Typischer Brandholz-Bewohner.

SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Barmen (Stachelhausen leg., CORNELIUS 1884, KOCH 1968).

Dadobia immersa (Er., 1837)

23-.184-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: noch nicht aus allen fünf Teilgebieten gemeldet.

An Rinden, Reisig.

WTL: Sünninghausen (Dahms leg. 1927, LMM, DAHMS 1928) - Bielefeld: Eckardtsheim (Renner leg. 1974, CRB) - Hövelhof/Senne (Braun leg. 1989, CBP) - Münster: Davert (Feldmann leg. 1991, CFM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1999, CFM).

OWB: Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB).

SBL: Imhausen (Klapperich leg. 1947, KÖHLER i.l.) - Wülfrath (Eigen leg., KOCH 1968) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1962, KOCH 1968) - Hagen (Drees leg. 1981/82/91/92, CDH) - Hilchenbach (Grundmann leg. 1986, CGL) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1986, WENZEL 1989) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992).

- Plataraea nigrifrons* (Er., 1839) 23-186-003-
D.: in etlichen Teilgebieten nicht gefunden.
Westf.: eine fragliche und eine falsche Meldung.
WTL: Oelde (Dahms leg. 1922, DAHMS 1928) Beleg?
SBL: Wuppertal (Thiele leg. 1956, KOCH 1968): Fehldetermination (KÖHLER 1993).
- Plataraea dubiosa* (Benick, 1934) 23-186-004-
D.: im Süden und Osten, Weser-Ems.
Westf.: keine Meldung.
Gießen (Frisch leg. 1989, BATHON 1991).
- Plataraea brunnea* (F., 1798) 23-186-005-
D.: in ganz Deutschland.
Westf.: zahlreiche Funde.
DGN: Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 1994, CTM).
WTL: Lippstadt (WESTHOFF 1881) - Münster (WESTHOFF 1881) - Oelde (DAHMS 1928) - Ostenfelde (Dahms leg. 1936, LMM) - Wiedenbrück: Langenberg (Rehage leg., CRD, REHAGE 1972) - Münster (Terlutter leg. 1981, CTM, Feldmann leg. 1989, CFM) - Warendorf (Starke leg. 1985/92, CSW) - Salzkotten (Braun leg. 1986, CBP) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1991/92/94, CRE) - Münster: Gimble (Feldmann leg. 1991, CFM) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1993, CRB) - Notuln (Terlutter leg. 1993, CTM) - Ahlen-Dolberg (Röwekamp leg. 1995, CRE) - Ahlen (Röwekamp leg. 1992/94, CRE) - Münster (Feldmann leg. 1989, CFM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 2000, CRB).
UWB: Bünde (PEETZ 1931) - Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1936, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1977/84, CJB) - Bielefeld: Quelle (Renner leg. 1977, CRB) - Bielefeld (SPÄH 1980) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1987/98, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995) - Osnabrück (Klaas leg. 1992, KACHE i.l., Kache leg. 1992/93, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).
OWB: Paderborn (WESTHOFF 1881) - Körbecke (Kroker leg. 1978/79, KROKER & RENNER 1983) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1978, CJB) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1980/82, CRB) - Paderborn-Wewer (Renner leg. 1981/82, CRB, RENNER 1985) - Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1981, CRB) - Scherfede (Grundmann leg. 1982, CGL) - Schlangen (Braun leg. 1983, CBP) - Marsberg: Dahlberg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Scherfede: Scheffelberg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Warburg: Weldaer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Scherfede: Hardehausen (Grundmann leg. 1989, CGL) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91/92/93, CWB, SMB) - Godelheim/Weser (Terlutter leg. 1991, CTM) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1992/93/94, FELDMANN & LÜCKMANN 1998) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Elberfeld (CORNELIUS 1884) - Witten (FÜGNER 1902) - Wuppertal (Thiele leg. 1956, MKB, KÖHLER 1993) - Wuppertal (KOLBE 1971, 1978, 1996) - Hagen (Drees leg. 1977/79/95, CDH) - Wuppertal (Pospischil leg. 1977, POSPISCHIL 1981) - Radevormwald (Wenzel leg. 79/83/84/91, WENZEL 1989) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Hohenlimburg (Drees leg. 1990, CDH) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1992, WENZEL 1997) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992/95, CWR) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Hallenberg: Hesborn (Terlutter leg. 1996, CTM).

Liogluta pagana (Er., 1839)

23-.187-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: im Bergland verbreitet.

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1976, CJB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995) - Osnabrück (Kache leg. 1992/93/94, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).

OWB: Paderborn-Wewer (Renner leg. 1981/82, CRB, RENNER 1985) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1982, CRB) - Höxter (Gerken leg. 1989, ASSING i.l.) - Beverungen (Figura leg. 1990, ASSING i.l.) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91/92/93, CWB, SMB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Radevormwald (Wenzel leg. 1981/86/87/91, MKB, WENZEL 1989, KOCH 1992) - Westhofen (Drees leg. 1983/93, CDH) - Burscheid (Kolbe leg. 1986, KOLBE & BRUNS 1988, KOCH 1992, KÖHLER 1997a) - Plettenberg: Finnentrop (Terlutter leg. 1988, CTM) - Attendorn: Borghausen (Grundmann leg. 1991, CGL) - Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Wuppertal (Thiele leg., KÖHLER 1993, MKB) - Unna: Geisecke (Flake leg. 1996, CFM) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1998, CWR) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Lappann leg. 1998, CWR).

Liogluta granigera (Kiesw., 1850)

23-.187-.002-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, aber aus DGN noch nicht gemeldet.

WTL: Hövelhof/Senne (Renner leg. 1994, CRB, RENNER 1998) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1998, CRB).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1959/76, CJB) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, RENNER 1981a, REHAGE & RENNER 1981) - Osnabrück (Kache leg. 1992/93, KACHE 1998).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1975/80, CJB) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB).

SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Hückeswagen (Eigen leg., KOCH 1968) - Hönnetal (REHAGE & FELDMANN 1977) - Wuppertal

(KOLBE & HOUVER 1977, KOLBE 1978, KOCH 1978) - Schmallenberg: Härdler (Terlutter leg. 1982, CTM) - Hilchenbach (Grundmann leg. 1983/84/85/86, CGL) - Wuppertal (KOLBE 1984a, KOCH 1992, MKB) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/87/88, CGL) - Attendorn: Repetal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Lahmer Bachtal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Plettenberg (Grundmann leg. 1989, CFM) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992, CWR, WENZEL 1994) - Solingen (KOLBE 1992) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel leg. 1997/99, CWR).

Liogluta micans (Muls.Rey, 1852) 23-.187-.003-.

D.: aus etlichen Teilgebieten noch nicht gemeldet.

Westf.: wenige Funde in SBL.

SBL: Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1986/87, WENZEL 1989) - Hilchenbach (Grundmann leg. 1985, CGL) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986, CGL).

Liogluta longiuscula (Grav., 1802) 23-.187-.004-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Hiller Moor (Renner leg. 1981, CRB).

WTL: Wiedenbrück (Rehage leg., CRD, REHAGE 1972) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1994/99/2000, CRB) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1995, CRB).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935/36, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1975/79, CJB) - Bad Salzuflen: Bexter Wald (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983/84/88/99/2000, CRB) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1976, CJB) - Schlangen (Braun leg. 1982, CBP) - Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1982, CRB) - Schwaney/Egge (Grundmann leg. 1983/84/85/86, CGL) - Scherfede: Hardehausen (Grundmann leg. 1989, CGL) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91/92/93, CWB, SMB).

SBL: Hönnetal (REHAGE & FELDMANN 1977) - Hückeswagen (Eigen leg., MKB) - Siegtal (Appel leg. 1947, MKB) - Solingen (Modrow leg. 1958, MKB) - Erkrath (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Solingen (KOLBE 1981, 1984a, 1992) - Hilchenbach (Grundmann leg. 1983/84/85/86, CGL) - Schmallenberg: Aberg (Grundmann leg. 1984/85/86/87/88, CGL) - Schmallenberg: Hunau (Grundmann leg. 1984/85/86/87/88, CGL) - Schmallenberg: Latrop-Tal (Grundmann leg. 1984, CGL) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/87/88, CGL) - Finnentrop-Rönkhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop-Wildewiese (Grundmann leg. 1988, CGL) - Hagen (Drees leg. 1988/94, CDH) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988/91, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg.

1988, CGL) - Sundern-Allendorf (Grundmann leg. 1988, CGL) - Neheim-Hüsten: Herdringen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Much: Herrensee (Wenzel leg. 1991, CWR) - Much (Wenzel leg. 1991, CWR) - Wuppertal (KOLBE 1994, 1996) - Neheim: Voßwinkel (Elmer leg. 1998, CFM) .

Liogluta wuesthoffi (Benick, 1938)

23-.187-.005-.

D.: fehlt wohl nur in der Ebene.

Westf.: im Bergland.

UWB: Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB).

OWB: Schwaney/Egge (Grundmann leg. 1983/86, CGL) - Warburg: Scherfede (Terlutter leg. 1996, CTM) - Warburg: Scherfede (Terlutter leg. 1996, CTM) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Solingen (Kolbe leg. 1983, MKB; KOLBE 1981, 1984a, 1984c, 1987, 1992) - Solingen (Gräf leg. 1976, KOCH 1992) - Wissen/Sieg: Roth (Stock leg. 1976, CSR) - Hönnetal (REHAGE & FELDMANN 1977) - Hilchenbach (Grundmann leg. 1983/84/85/86, CGL) - Schmallenberg: Latrop-Tal (Grundmann leg. 1984, CGL) - Schmallenberg: Hunau (Grundmann leg. 1985/86/87/88, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1986/90, WENZEL 1989) - Schmallenberg: Aberg (Grundmann leg. 1986/87/88, CGL) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/87/88, CGL) - Wuppertal (Kolbe leg. 1986/87, MKB; KOLBE 1992, 1994, 1996, KOCH 1992) - Hagen (Drees leg. 1987/93, CDH) - Finnentrop-Wildewiese (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Iserlohn: Hemer (Renner leg. 1988, CRB) - Meinerzhagen: Fürwigge-Talsperre (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Selscheid (Grundmann leg. 1988, CGL) - Fredeburg: NSG Hunau (Terlutter leg. 1989, CTM) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Finnentrop: Kuckuck (Grundmann leg. 1991, CGL) - Witten: Gdern (Drees leg. 1991, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992, CWR).

Liogluta microptera Thoms., 1867

23-.187-.006-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Münster-Baumberge (Beyer leg. 1928, LMM) - Dortmund (Appel leg. 1968, MKB) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1978, CRB, RENNER 1980, 1981a) - Gütersloh: Barrelpäule/Brockhagen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Ahaus: Bröke (Terlutter leg. 1989, CTM) - Münster: Davert (Terlutter leg. 1991, CTM) - Ahaus: Butenfeld (Terlutter leg. 1994, 1996 CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1998, CRB).

UWB: Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, RENNER 1981a, REHAGE & RENNER 1981) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bad Salzufflen: Bexter Wald (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Jöllenbeck (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Isingdorf

(Renner leg. 1983/87/94, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1992, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1998/99, CRB) - Detmold: Lippischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1975/80, CJB) - Willebadessen (Braun leg. 1982, CBP) - Schwaney/Egge (Grundmann leg. 1983/84/85/86, CGL) - Kohlstädt (Braun leg. 1985, CBP) - Eggegebirge: Schlangen (Terlutter leg. 1986, CTM) - Scherfede: Hardehausen (Grundmann leg. 1989, CGL) - Beverungen (Figura leg. 1990, CAH, ASSING i.l.) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91/92, CWB) - Warburg: Scherfede (Feldmann, Terlutter leg. 1996, CFM, CTM) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1961/62, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1961/63/64, KOCH i.l.) - Gruiten (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1968, MKB) - Hönnetal (REHAGE & FELDMANN 1977) - Hückeswagen (Wenzel leg. 1986/88, CWR) - Wuppertal (Kolbe leg. 1986, MKB; KOLBE 1973, 1978, 1982, 1992, 1994, 1996) - Hagen (Drees leg. 1981/82/91, CDH) - Hohenlimburg (Drees leg. 1981, CDH) - Solingen (Kolbe leg. 1986, MKB; KOLBE 1981, 1984a, 1987, 1988, 1992) - Hilchenbach (Grundmann leg. 1983/84/85/86, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1984/85/86, WENZEL 1989) - Schmalleben: Aberg (Grundmann leg. 1984/85/86, CGL) - Schmalleben: Hunau (Grundmann leg. 1984/85/86/87/88, CGL) - Schmalleben: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/87/88, CGL) - Finnentrop (Hellweg leg. 1987, CHF) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Iserlohn: Hemer (Renner leg. 1988, CRB) - Meschede: Ramsbeck (Terlutter leg. 1986, CTM) - Plettenberg-Selscheid (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Lahmer Bachtal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Neheim-Hüsten: Herdringen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Neuenrade: Altenaffeln (Grundmann leg. 1990/91, CGL) - Plettenberg: Eiringhausen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Finnentrop: Kuckuck (Grundmann leg. 1991, CGL) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1991/92, WENZEL 1997) - Radevormwald (Wenzel leg. 1991/92/93, CWR) - Althundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Plettenberg (Erbeling leg. 1992, CERL) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1992, CGL) - Siegen: Friesenhagen (WAGNER 1992) - Wissen/Sieg: Gebhardshain (WAGNER 1992) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Radevormwald (WENZEL 1994) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel leg. 1998, CWR) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1999, CWR).

Liogluta alpestris nitidula (Kr., 1856)

23-187-009-.b

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Oppenweher Moor (Renner leg. 1983, CRB) - Dümmer: Hüde (Renner leg. 1983, CRB).

- WTL: Lippstadt (WESTHOFF 1881) - Münster (WESTHOFF 1881) - Münster: Davert (Terlutter leg. 1990, CTM) - Lüdinghausen: Olfen (Terlutter leg. 1992, CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993/94/98, CRB) - Ahaus: Schöppingen (Terlutter leg. 1994, CFM) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1994, CRB).
- UWB: Eickum (Barner leg. 1934, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1956/78, CJB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/87/89, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Klaas leg. 1992, KACHE i.l. , Kache leg. 1992/93/94, KACHE 1998) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).
- OWB: Paderborn (WESTHOFF 1881) - Beverungen (Figura leg. 1990, ASSING i.l.).
- SBL: Hilchenbach (WESTHOFF 1881) - Witten (WESTHOFF 1881, FÜGNER 1902) - Elberfeld (CORNELIUS 1884) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1958, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Hönnetal (REHAGE & FELDMANN 1977) - Wuppertal (Pospischil leg. 1977, POSPISCHIL 1981) - Wuppertal (KOLBE 1978) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1988, CGL).

Atheta arctica (Thoms., 1856) 23-188-001-

D.: vom Niederrhein über Holstein bis Sachsen, sonst zerstreut.

Westf.: wenige Funde.

DGN: Oppenweher Moor (Renner leg. 1976/83, CRB, Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Haltern (Hozman leg. 1980, CHE) - Münster: Lövelingloh (Terlutter leg. 1982, CTM).

SBL: Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1968, KOCH 1974) - Gummersbach: Wiehl (Gerhard leg. 1988/89, CGR) - Olpe: Reichshof (Gerhard leg. 1988/94/95, CGR) - Olpe: Drolshagen (Gerhard leg. 1995, GERHARD 1997).

Atheta elongatula (Grav., 1802) 23-188-004-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: zahlreiche Funde aus allen fünf Teilgebieten.

Atheta hygrobica (Thoms., 1856) 23-188-005-

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: wenige Funde.

WTL: Emsdetten: NSG Emsdettener Venn (Terlutter leg. 1996, CTM).

UWB: Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993).

OWB: Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1982, CRB, RENNER & GRUNDMANN 1984).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Ratingen (Koch leg. 1963, KOCH 1968) - Ennepetal (Drees leg. 1990, CDH) - Neuenrade: Altenaffeln (Grundmann leg. 1990, CGL) - Halver/ Ennepe (Drees leg. 1991, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1993, CWR) - Hagen (Drees leg. 1995, CDH).

Atheta hygrotopora (Kr., 1856)

23-.188-.006-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

Bevorzugt an Fließgewässern, Seen.

- DGN: Häverner Marsch (Renner leg. 1985, CRB) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).
- WTL: Ostfeld (Dahms leg. 1929, LMM) - Schloß Holte-Stukenbrock (Renner leg. 1975, CRB) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1976, CRB, RENNER 1980) - Salzkotten (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Sassenberg (Renner leg. 1983, CRB) - Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Lüdinghausen: Olfen (Terlutter leg. 1992, CTM).
- UWB: Bielefeld: Jöllenbeck (Renner leg. 1978, CRB) - Bielefeld: Schildesche (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/85/88/89/94/96/98/99/2000, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1993, KACHE 1998) - Detmold: Heidenthal (Renner leg. 2000, CRB).
- OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1966, CJB) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982, CRB, RENNER 1985) - Brakel: Aa/Riesel (Renner leg. 1983/85, CRB) - Büren (Terlutter leg. 1986, CTM) - Amelunxen (Renner leg. 1988, CRB) - Godelheim/Weser (Renner leg. 1988, CRB) - Warburg: Daseburg (Renner leg. 1994, CRB).
- SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884, WESTHOFF 1886) - Hückeswagen (Eigen leg., MKB) - Hilden (Koch leg. 1957, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1962, KOCH i.l.) - Gruiten (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Breitscheid (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Hagen (Drees leg. 1980, CDH) - Wissen/Sieg: Roth (Stock leg. 1982, CSR) - Radevormwald (Wenzel leg. 1983/85/86, WENZEL 1989) - Lenne: Uentrop (Terlutter leg. 1988, CTM) - Lennetal: Latrop (Terlutter leg. 1988, CTM) - Schmalleberg (Renner leg. 1988, CRB) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1991, WENZEL 1997) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Iserlohn: Hemer (Terlutter leg. 1993, CTM) - Radevormwald (Wenzel leg. 1993, CWR) - Finnentrop (Röwekamp leg. 1995, CRE) - Lüdenscheid: Halver (Terlutter leg. 1997, CTM).

Atheta luridipennis (Mannh., 1830)

23-.188-.007-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

- DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).
- WTL: NSG Kipshagen (Peetz leg. 1932, LMM) - Oelde (Dahms leg. 1933, LMM) - Dortmund (Appel leg. 1968, MKB) - Osnabrück: Rulle (Hozman leg. 1970, CHE) - Bochum (Hozman leg. 1974, CHE) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1983, CRB) - Salzkotten (Renner leg. 1983, CRB) - Münster: Handorf (Terlutter leg. 1984, CTM) - Münster: Rieselfelder Münster (Terlutter leg. 1987, CTM) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1987, CRB) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - West-Münster-

land: Gronau (Grundmann leg. 1992, CGL) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993/94/98/99, CRB) - Münster: Westbevern (Köhler leg. 1997, CKB, KÖHLER 2000).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1949/50/67, CJB) - Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1975, CRB, RENNER 1981b) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983/84/85/87/88/89/96/99/2000, CRB) - Minden: Barkhausen (Renner leg. 1983, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Kache leg. 1992/94, KACHE 1998) - Barkhausen (Börcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Detmold: Lippischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1976/75/78, CJB) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1982/83, CRB) - Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1983, CRB) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/92, CWB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Witten (FÜGNER 1902) - Hückeswagen (Eigen leg., MKB) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1957, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1957, KOCH i.l.) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1962/64, KOCH i.l.) - Breitscheid (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Ratingen: Homberg (Koch leg. 1965, KOCH i.l.) - Wuppertal (Wenzel leg. 1972, CWR) - Hagen (Drees leg. 1978, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1978/83/86/87, WENZEL 1989) - Schwerte (Drees leg. 1987, CDH) - Altena-Brachtenbeck (Grundmann leg. 1988, CGL) - Attendorn: Repe-tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop-Rönkhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Lennetal: Latrop (Terlutter leg. 1988, CTM) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Sundern-Allendorf (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Dahlerbrück/Volme (Drees leg. 1989, CDH) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1990, CGL) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1991, WENZEL 1997) - Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Iserlohn (Drees leg. 1994, CDH) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel leg. 1998, CWR).

Atheta terminalis (Grav., 1806)

23-188-008-

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: einzene Funde aus allen fünf Teilgebieten.

DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1957, CJB) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Dorsten (Hozman leg. 1975, CHE).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1969, CJB).

OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1957, KOCH i.l.) - Hückeswagen (Eigen leg., KOCH 1968).

Atheta tmolosensis Bernh., 1940 23-188-011-
D.: von Bayern bis Holstein zerstreute Funde.
Westf.: keine Meldung.

Atheta gyllenhalii (Thoms., 1856) 23-188-013-
D.: fast in ganz Deutschland.
Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

- DGN: Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991).
- WTL: Halle (Grundmann leg. 1981, CGL, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Gütersloh: Barrelpäule/Brockhagen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1982, CTM) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Vreden: NSG Ellewicker Feld (Terlutter leg. 1988, CTM) - Dortmund: Dellwig (Platzek leg. 1990, CHE) - Ahaus: NSG Graeser Venn (Terlutter leg. 1996, CTM) - Emsdetten: NSG Emsdettener Venn (Terlutter leg. 1996, CTM).
- UWB: Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1994/99, CRB).
- OWB: Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1983, CRB) - Brakel: Riesel (Renner leg. 1983, CRB).
- SBL: Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1959/63, KOCH i.l.) - Solingen (Modrow leg. 1959, KOCH 1968, MKB) - Ratingen (Koch leg. 1961, KOCH 1968) - Engelskirchen (Appel leg. 1975, KOCH 1992) - Solingen (Gräf leg. 1987, KOCH 1992).

Atheta melanocera (Thoms., 1856) 23-188-015-
D.: in ganz Deutschland.

- Westf.: in allen fünf Teilgebieten.
- DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) - Hiller Moor (Grundmann leg. 1981, CGL).
 - WTL: Velener Moor (PEUS 1928) - Münster-Baumberge (Beyer leg. 1929, LMM) - Wiedenbrück: Langenberg (Rehage leg., CRD, REHAGE 1972) - Senne: Moosheide (Grundmann leg. 1981, CGL).
 - UWB: Mennighüffen (Barner leg. 1911, LMM) - Mennighüffen (BARNER 1922, PEETZ 1931).
 - SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884) - Imhausen/Sieg (Appel leg. 1954, MKB) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1957/59, KOCH i.l.) - Breitscheid (Koch leg. 1959/60/64, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1959/65, KOCH i.l.) - Gruiten (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Attendorn (Renner leg. 1967, CRB) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1967, MKB) - Westhofen (Drees leg. 1981, CDH) - Glör-Talsperre (Drees leg. 1982, CDH) - Plettenberg (Erbeling leg. 1988, CErL) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1991/92, WENZEL 1997).

Atheta malleus Joy, 1913

23-188-016-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: nur aus OWB noch nicht gemeldet.

DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1956, CJB) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) - Recke: Wiechholzer Bach (Terlutter leg. 1996, CTM).

WTL: Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1992, CRB, RENNER 1998) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1984, CTM) - Heek/Ahaus: NSG Füchte-Kallenbeck (Terlutter leg. 1986, CTM) - Münster: Handorf (Terlutter leg. 1986, CTM) - Münster: Rieselfelder Münster (Terlutter leg. 1987, CTM) - Vreden: NSG Ellewicker Feld (Terlutter leg. 1988, CTM) - Gronau: NSG Amtsvenn (Feldmann leg. 1989, CFM) - Münster: Davert (Terlutter leg. 1990, CTM).

UWB: Holzhausen (Jankowski leg. 1963/67, CJB) - Barkhausen (Jankowski leg. 1956/63/67, CJB) - Bielefeld: Leopoldshöhe (Renner leg. 1982, CRB) - Lage: Iggenhausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).

SBL: Hohenlimburg (Drees leg. 1982, CDH) - Breitscheid (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Solingen (Modrow leg. 1962/67, MKB) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Solingen (KOLBE 1981, 1992) - Rothaargebirge: Saalhausen (Terlutter leg. 1986, CTM) - Solingen (Gräf leg. 1986, MKB) - Hagen (Drees leg. 1988/93, CDH) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1991/92, WENZEL 1997).

Atheta volans (Scriba, 1859)

23-188-017-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Hiller Moor (Grundmann, Renner leg. 1981, CGL, CRB) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1996, CRB) - Bochum (Hozman leg. 1972, CHE) - Gütersloh: Barrelpäule/Brockhagen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Senne: Moosheide (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bokel/Ems (1989, WASNER i.l.) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1996, CRB) - Münster: Westbevern (Köhler leg. 1997, CKB, KÖHLER 2000).

UWB: Bad Salzuflen (Renner leg. 1978, CRB) - Bielefeld: Jöllenbeck (Renner leg. 1977, CRB) - Herford: Herringhausen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Schildesche (Renner leg. 1982, CRB) - Lage: Altholzhausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983, CRB).

OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1979, CJB) - Brakel: Riesel (Renner leg. 1983, CRB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881) - Siegtal (Appel leg. 1947, MKB) - Solingen (Modrow leg. 1954/57/59/63, MKB) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1957/66, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1958/59/61, KOCH i.l.) - Breitscheid (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1959/62/64, KOCH i.l.) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1961/63, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1963,

KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1968, MKB) - Westhofen (Drees leg. 1980, CDH) - Altena-Brachtenbeck (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop-Rönkhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Sundern-Allendorf (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Lahmer Bachtal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Hagen (Drees leg. 1989, CDH) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Herscheid: Elsen (Grundmann leg. 1990/91, CGL) - Plettenberg: Eiringhausen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Plettenberg: Pasel (Grundmann leg. 1990, CGL) - Attendorn: Borghausen (Grundmann leg. 1991, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1991/92, WENZEL 1997) - Neuenrade: Altenaffeln (Grundmann leg. 1991, CGL) - Hönnetal (Grundmann leg. 1992, CGL) - Siegen: Friesenhagen (WAGNER 1992) - Hohenlimburg (Drees leg. 1995, CDH).

Atheta obtusangula Joy, 1913

23-.188-.018-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: nicht häufig, aus DGN und UWB keine Meldungen.

WTL: Münster: Davert (Terlutter leg. 1990, CTM) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB).

OWB: Lichtenau: Altenau-Tal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Scherfede: Hardehausen (Grundmann leg. 1989, CGL) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1992, CWB).

SBL: Engelskirchen (Appel leg. 1975, KOCH 1992) - Solingen (Gräf leg. 1979, KOCH 1992) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1986, WENZEL 1989) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988/91, CGL) - Meinerzhagen: Fürwigge-Talsperre (Grundmann leg. 1988, CGL) - Sundern-Langscheid (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Hagen (Drees leg. 1990, CDH) - Herscheid (Grundmann leg. 1990/91, CGL) - Neuenrade: Altenaffeln (Grundmann leg. 1990/91, CGL) - Halver/Ennepe (Drees leg. 1991, CDH) - Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Siegen: Friesenhagen (WAGNER 1992) - Radevormwald (Wenzel leg. 1993, CWR) - Olpe: Reichshof (Gerhard leg. 1995, CGR).

Atheta sequanica (Bris., 1859)

23-.188-.019-.

D.: zerstreut in Mitte, Norden, Osten.

Westf.: keine Meldung.

Atheta palustris (Kiesw., 1844)

23-.188-.020-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: zahlreiche Funde.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991).

- WTL: Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1976/77/78, CRB, RENNER 1980) - Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1989/92/93/95/97/99/2000, CRB) - Münster: Davert (Terlutter leg. 1990, CTM) - Lüdinghausen: Olfen (Terlutter leg. 1992, CTM) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1993/95, CRB) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1998, CRE).
- UWB: Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/86/87/88, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Klaas leg. 1992, KACHE i.l., Kache leg. 1992/93/94, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1994/95/96, CRB) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1998/99/2000, CRB) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 2000, CRB) - Detmold: Heidenthal (Renner leg. 2000, CRB) - Detmold: Lippischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).
- OWB: Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1982/83, CRB) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982, CRB, RENNER 1985) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91, CWB).
- SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Witten (FÜGNER 1902) - Erkrath (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Wuppertal (KOLBE 1973, 1978) - Solingen (KOLBE 1981, 1984a, 1984c, 1987, 1988, 1992) - Radevormwald (Wenzel leg. 1985/86/88/90, WENZEL 1989) - Plettenberg (Erbeling leg. 1988, CErL) - Hagen: Ennepetal (Drees leg. 1989, CDH, DREES 1998) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1991, WENZEL 1997) - Hagen: Hengsteysee (Drees leg. 1993, CDH, DREES 1998) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1999, CWR).

Atheta debilis (Er., 1837)

23-188-.021-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: nur aus OWB noch nicht gemeldet.

- DGN: Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991) - Dümmer: Hüde (Renner leg. 1983, CRB).
- WTL: Oelde (Dahms leg. 1923, DAHMS 1928) - Münster (Peetz leg. 1936, PEETZ 1937, LMM) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Emsdetten: NSG Emsdettener Venn (Terlutter leg. 1996, CTM).
- UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1936, LMM) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1989, CRB) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).
- SBL: Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Solingen (Gräf leg. 1970, KOCH 1992) - Hückeswagen (Wenzel leg. 1985/89/90, WENZEL 1991, KOCH 1992) - Radevormwald (Wenzel leg. 1986/90, WENZEL 1989, 1991, KOCH 1992) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1991/92, WENZEL 1997) - Much: Herrensee (Wenzel leg. 1991, CWR) - Radevormwald (Wenzel leg. 1993, CWR) - Witten (Drees leg. 1995, CDH).

- Atheta scotica* (Eil., 1909) 23-188-023-
D.: Süden, Norden, Osten, zerstreute Funde.
Westf.: nur zwei Funde aus SBL.
SBL: Westerwald: Waldbreitbach (KÖHLER 1992) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1992, WENZEL 1997).
- Atheta parca* (Muls.Rey, 1873) 23-188-024-
D.: fast in ganz Deutschland.
Westf.: sehr wenige Funde.
WTL: Münster: Lövelingloh (Terlutter leg. 1982, CTM).
UWB: Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.).
OWB: Scherfede: Hardehausen (Grundmann leg. 1989, CGL).
SBL: Solingen (Gräf leg. 1987, KOCH 1992).
- Atheta deformis* (Kr., 1856) 23-188-025-
D.: in ganz Deutschland.
Westf.: in allen fünf Teilgebieten.
DGN: Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991).
WTL: Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Münster (Hozman leg. 1986, CHE) - Warendorf: Drensteinfurt (Terlutter leg. 1986, CTM) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1987, CRB) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1993, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1994/95/96/97/98/99/2000, CRB).
UWB: Bielefeld: Amshausen, Schildesche, Leopoldshöhe (Renner leg. 1982, CRB, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Herford: Herringhausen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Porta Westf. (Renner leg. 1983, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/85/87/88/94/96/98/99/2000, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Kache leg. 1992, KACHE 1998) - Detmold: Lippischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).
OWB: Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982, CRB, RENNER 1985) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1982/83, CRB, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Lichtenau: Altenau-Tal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Scherfede: Hardehausen (Grundmann leg. 1989, CGL) - Willebadessen: Egge-Gebirge (Renner leg. 1989, CRB).
SBL: Elberfeld (Scriba leg., KOCH 1968) - Elberfeld (Cornelius leg., MKB) - Arolsen: Landau (Renner leg. 1986, CRB) - Radevormwald (Wenzel leg. 1986/87/89, WENZEL 1989, KOCH 1992) - Attendorn: Repetal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop-Wildewiese (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Meinerzhagen: Fürwigge-Talsperre (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988/90, CGL) - Sundern-Allendorf (Grundmann leg. 1988/89, CGL) - Neheim-Hüsten: Herdringen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Hagen: Ennepetal (Drees leg. 1997, CDH, DREES 1998).

- Atheta ripicola* Hanssen, 1932 23-.188-.028-
D.: Meldungen aus den meisten Teilgebieten.
Westf.: nur wenige Funde.
 DGN: Petershagen (Renner, Grundmann leg. 1982, CRB, CGL, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Häverner Marsch (Grundmann leg. 1982, CGL).
 UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1967, CJB).
 OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1966/67, CJB) - Diemeltal: Lamerden (Terlutter leg. 1986, CTM) - Godelheim/Weser (Renner leg. 1988, CRB, RENNER 1991).
- Atheta rhenana* Benick, 1965 23-.188-.029-
D.: im Südwesten, Rheinland, Thüringen.
Westf.: keine Meldung.
 Westerwald (Rüschkamp leg. 1881,1905, KOCH 1968).
- Atheta fallaciosa* (Shp., 1869) 23-.188-.030-
D.: fast in ganz Deutschland.
Westf.: keine Meldung
- Atheta luteipes* (Er., 1837) 23-.188-.031-
D.: in ganz Deutschland.
Westf.: nur wenige Funde.
 WTL: Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Bokel/Ems (1989, WASNER i.l.) - Nottuln (Terlutter leg. 1993, CTM) - Vreden (Terlutter leg. 1993, CTM).
 UWB: Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).
 OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1974, CJB).
 SBL: Neandertal (Koch leg. 1963, KOCH 1968) - Hagen: Bathey (Drees leg. 1992, CDH) - Witten (Drees leg. 1995, CDH).
- Atheta vilis* (Er., 1837) 23-.188-.033-
D.: fast in ganz Deutschland.
Westf.: nur zwei Funde.
 UWB: Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).
 SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968).
- Atheta laticeps* (Thoms., 1856) 23-.188-.034-
D.: nur in wenigen Gebieten.
Westf.: eine sehr alte Meldung aus SBL.
 SBL.: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884).

Atheta occulta (Er., 1837)

23-188-.036-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: nur aus OWB keine Meldung.

- DGN: Hartum (Jankowski leg. 1977/81, CJB) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).
- WTL: Dortmund (Suffrian leg., WESTHOFF 1881) - Oelde (Dahms leg. 1926, DAHMS 1928) - Oelde (Dahms leg. 1930, LMM) - Essen (Hozman leg. 1970, CHE) - Oerlinghausen: Senne (Grundmann leg. 1982, CGL) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB).
- UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1977/78/80, CJB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1988, CRB) - Detmold: Lippischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).
- SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hückeswagen (Eigen leg., MKB) - Solingen (Modrow leg. 1950/56, MKB) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1962, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Altena-Brachtenbeck (Grundmann leg. 1988, CGL) - Letmathe (Drees leg. 1993, CDH).

Atheta fungivora (Thoms., 1867)

23-188-.037-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: im Bergland.

- UWB: Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1977, CRB, RENNER 1981a, b) - Bad Salzuflen: Bexter Wald (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bad Salzuflen (Grundmann leg. 1982, CGL, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/85/86/87, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1993, KACHE 1998) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1998/99/2000, CRB).
- OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1975, CJB) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982/83, CRB, RENNER 1985) - Lichtenau: Geimer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Marsberg: Dahlberg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91/92/93, CWB, SMB).
- SBL: Solingen (Modrow leg. 1968, KOCH 1974, MKB) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1986, WENZEL 1989, KOCH 1992) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1991, WENZEL 1997).

Atheta monticola (Thoms., 1852)

23-188-.038-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

- DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).
- WTL: Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993/94/95/99, CRB) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1994, CRB).
- UWB: Bad Salzuflen (Grundmann leg. 1982, CGL, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Bad Salzuflen: Bexter Wald (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bie-

- lefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983/87/88/89/98, CRB) - Kalletal/Lippe (Grundmann leg. 1988, CGL) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 2000, CRB) - Detmold: Lip-pischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).
- OWB: Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982, CRB, RENNER 1985) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1983, CRB) - Lichtenau: Geimer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91/92, CWB, SMB) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1994, CFM, FELDMANN & LÜCKMANN 1998) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).
- SBL: Solingen (Modrow leg. 1958/60, KOCH 1968, MKB) - Solingen (Gräf leg. 1968, KOCH 1974) - Hagen (Drees leg. 1981, CDH) - Hilchenbach (Grundmann leg. 1983, CGL) - Letmathe (Drees leg. 1985, CDH) - Iser-lohn (Erbeling leg. 1986, ERBELING & DREES 1992) - Schmalleberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/87/88, CGL) - Attendorn: Echtern-hagen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Attendorn: Windhausen (Grund-mann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid (Hellweg leg. 1988, CHF) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Sundern-Langscheid (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Lahmer Bachtal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Altenkirchen (Terlutter leg. 1989, CFM) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Plettenberg-Sonne-born (Grundmann leg. 1990, CGL) - Althenudem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Letmathe (ERBELING & DREES 1992) - Olpe: Reichs-hof (Gerhard leg. 1995, CGR).

Atheta excellens (Kr., 1856)

23-188-039-

D.: im Norden und Westen, sonst zerstreut.

Westf.: nur wenige Funde.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, RENNER et al. 1986, GRUNDMANN 1991).

UWB: Minden: Wesertal (Renner leg. 1984, CRB).

SBL: Elberfeld (Scriba leg., KOCH 1968) - Schmalleberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986, CGL).

Atheta spatula (Fauv., 1872)

23-188-041-

D.: Bayern, Pfalz, Sachsen.

Westf.: keine Meldung.

Atheta euryptera (Steph., 1832)

23-188-042-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

An Saftflüssen.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991).

- WTL: Oelde (Dahms leg. 1932, LMM) - Essen (Hozman leg. 1971, CHE) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1976/77, CRB, RENNER 1980) - Heek/Ahaus: NSG Füchte-Kallenbeck (Terlutter leg. 1983, CTM) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1983, CTM) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Münster: Davert (Feldmann leg. 1993, CFM) - Nottuln (Terlutter leg. 1993, CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1997, CRB).
- UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1936, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1958/63, CJB) - Bielefeld: Quelle (Renner leg. 1977, CRB) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Osna-brück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).
- OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Nammener Wald (Jan-kowski leg. 1956/77/79, CJB) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1980, CRB) - Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1980/81/82, CRB) - Lage: Hardisser Moor (Renner leg. 1980, CRB) - Warburg: Hellberg/Scherfede (Renner leg. 1980/81, CRB) - Diemeltal: Lamerden (Renner leg. 1981, CRB) - Paderborn-Wewer (Renner leg. 1981, CRB, RENNER 1985) - Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1981/82, CRB) - Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1981, CRB) - Schwa-ney/Egge (Grundmann leg. 1983/86, CGL) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91, CWB, SMB).
- SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchen-bach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Imhau-sen/Sieg (Appel leg. 1948, MKB) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1960, KOCH i.l.)- Erkrath (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Schmallenberg: Latrop-Tal (Grundmann leg. 1984, CGL) - Schmallen-berg: Aberg (Grundmann leg. 1985/88, CGL) - Hilchenbach (Grund-mann leg. 1985, CGL) - Attendorn: Repetal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Meinerzhag-en: Fürwigge-Talsperre (Grundmann leg. 1988, CGL) - Schmallen-berg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1988, CGL) - Sundern-Allendorf (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Neuenrade: Alten-affeln (Grundmann leg. 1990, CGL).

Atheta divisa (Märk., 1844)

23-188-043-

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, aber aus WTL noch nicht gemeldet.

DGN: Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 1996, CTM) - Hopsten: NSG Halverder Moor (Terlutter leg. 1998, CTM).

UWB: Eickum (Barner leg. 1934, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1951, CJB) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984, CRB).

OWB: Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1983, CRB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Witten (FÜGNER 1902) - Gruiten (Koch leg. 1960, KOCH i.l.)- Düsseldorf: Gra-

fenberg (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Wuppertal (KOLBE 1982) - Hagen (Drees leg. 1992/95, CDH).

Atheta nigricornis (Thoms., 1852)

23-188-.045-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 1994, CTM).

WTL: Ennigerloh (Dahms leg. 1929, LMM) - Essen (Hozman leg. 1970, CHE) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1976/77, CRB, RENNER 1980) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1985, CRB, RENNER 1987) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991/92, CKB) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1992, CRE) - Münster: Davert (Feldmann leg. 1992, CFM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1992/93, CRB).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935, LMM) - Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1977, CRB, RENNER 1981b) - Bielefeld: Quelle (Renner leg. 1977, CRB) - Bielefeld: Lämershagen (Renner leg. 1978, CRB) - Bielefeld (SPÄH 1980) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Enger (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Schildesche (Renner leg. 1986, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1987/2000, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995) - Osnabrück (Klaas leg. 1992, KACHE i.l., Kache leg. 1992/93/94, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1963, CJB) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1980/83, CRB) - Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1980/82, CRB) - Lage: Hardisser Moor (Renner leg. 1980, CRB) - Warburg: Hellberg/Scherfede (Renner leg. 1980, CRB) - Diemeltal: Lamerden (Renner leg. 1981, CRB) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1981/83, CRB, RENNER 1985) - Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1981/82, CRB) - Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1981/82, CRB) - Eggegebirge: Schwaney (Terlutter leg. 1986, CTM) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91/92/93, CWB, SMB) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hückeswagen (Eigen leg., MKB) - Hösel (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1963/64, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Solingen (KOLBE 1981, 1987, 1992) - Hückeswagen (Wenzel leg. 1985, CWR) - Radevormwald (Wenzel leg. 1986/87, WENZEL 1989) - Schmalenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/87/88, CGL) - Wetter/Ruhr (Drees leg. 1986, CDH) - Attendorn: Repetal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Becke (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg.

1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Hagen (Drees leg. 1990/92, CDH) - Marienheide/Gimborn (Wenzel leg. 1990, CWR) - Finnentrop: Ostentrop (Grundmann leg. 1991, CGL) - Plettenberg (Erbeling leg. 1991, CErL) - Plettenberg: Sechtenbecker Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1991, CGL) - Wuppertal (KOLBE 1994, 1996) - Waldbröl (Köhler leg. 1996, CKB) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel, Lappann leg. 1998/99, CWR) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1999, CWR).

Atheta harwoodi Will., 1930

23-188-046-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) - Hartum (Jankowski leg. 1977, CJB) - Häverner Marsch (Grundmann leg. 1982, CGL) - Dümmer: Hüde (Renner leg. 1983, CRB).

WTL: Oelde (Dahms leg. 1932/33, LMM) - Schloß Holte-Stukenbrock (Renner leg. 1975, CRB) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1977, CRB, RENNER 1980) - Salzkotten (Renner leg. 1982, CRB) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1985, CRB, RENNER 1987) - Heek/Ahaus: NSG Füchte-Kallenbeck (Terlutter leg. 1986, CTM) - Münster: Davert (Feldmann leg. 1992, CFM) - Münster-Handorf (Röwekamp leg. 1993, CRE).

UWB: Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1978, CRB, RENNER 1981a, b) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995, Kache leg. 1992/93/94, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1999, CRB).

OWB: Lage: Hardisser Moor (Renner leg. 1980, CRB) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1980/82, CRB) - Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1980/82, CRB) - Warburg: Hellberg/Scherfede (Renner leg. 1980/81/82, CRB) - Diemeltal: Lamerden (Renner leg. 1981, CRB) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1981/82, CRB, RENNER 1985) - Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1981/82, CRB) - Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1981/82, CRB) - Eggegebirge: Schwaney (Terlutter leg. 1986, CTM) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91, CWB).

SBL: Hückeswagen (Eigen leg., MKB) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1961, KOCH 1968) - Solingen (Modrow leg. 1961/63, KOCH 1968, 1974) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1966, KOCH 1968) - Hohenlimburg (Drees leg. 1981, CDH) - Hagen (Drees leg. 1983/92, CDH) - Schmalenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/88, CGL) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1987, WENZEL 1989) - Solingen (KOLBE 1987, 1992) - Attendorn: Repetal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Attendorn-Windhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop-Rönkhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg.

1989, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Halver/Ennepe (Drees leg. 1991, CDH) - Schmalleberg: Altenilpe (Grundmann leg. 1994, CGL) - Unna: Geisecke (Flake leg. 1996, CFM) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel, Lappann leg. 1998, CWR) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1999, CWR).

Atheta liturata (Steph., 1832) 23-188-.047-

D.: weit zerstreute, meist alte Funde.

Westf.: nur zwei sehr alte Funde.

OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881).

SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884, WESTHOFF 1886, KOCH 1968).

Atheta nigrifolia (Grav., 1802) 23-188-.048-

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: nur aus OWB noch nicht gemeldet.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Oelde (Dahms leg. 1935, LMM) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1976/78, CRB, RENNER 1980) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1983/88, CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1996, CRB).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1936, LMM).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Solingen (Modrow leg. 1957/60, MKB) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) -

Atheta corvina (Thoms., 1856) 23-188-.049-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, aber aus DGN und OWB noch nicht gemeldet.

Besonders mycetophile Art (BENICK 1952).

WTL: Oelde (Dahms leg. 1930, LMM) - Münster: Wolbecker Tiergarten (Terlutter leg. 1983, CTM) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Münster: Davert (Feldmann leg. 1992, CFM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1995/97/98, CRB).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1954/56/66, CJB) - Detmold: Donoper Teiche (Grundmann leg. 1982, CGL) - Herford: Elverdissen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Düsseldorf: Geresheim (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1964, KOCH 1974, KÖHLER 1994) - Hückeswagen (Eigen leg., KOCH 1968, KÖHLER 1994) - Solingen (Gräf leg. 1983, KOCH 1992) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Sundern-Allendorf (Grundmann leg. 1988, CGL) - Marienheide/Gimborn (Wenzel leg. 1990, CWR) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Her-

scheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992, CWR, WENZEL 1994) - Hagen: Vorhalle (Drees leg. 1997, CDH).

Atheta nitella Brundin, 1948 23-.188-.0491.

D.: nur in wenigen Gebieten.

Westf.: ein einziger Fund.

SBL: Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL).

Atheta soedermani Bernh., 1931 23-.188-.050-.

D.: Hessen, Weser-Ems, Brandenburg.

Westf.: keine Meldung.

Atheta puberula (Shp., 1869) 23-.188-.055-.

D.: wenige, weit zerstreute Funde.

Westf.: wenige Funde.

UWB: Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1998, CRB).

OWB: Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982, CRB, RENNER & GRUNDMANN 1984, RENNER 1985) - Lichtenau: Geimer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Marsberg: Dahlberg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Warburg: Weldaer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Höxter (Gerken leg. 1989, ASSING i.l.) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1992/93/94, CFM, FELDMANN & LÜCKMANN 1998).

Atheta kochi Roub., 1937 23-.188-.056-.

D.: nur in wenigen Gebieten.

Westf.: nur drei Funde.

UWB: Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).

SBL: Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL).

Atheta palleola (Er., 1837) 23-.188-.063-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: fast nur alte Funde.

WTL: Münster (REEKER 1887).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Hilden (Koch leg. 1959, KOCH i.l.).

Atheta benickiella Brundin, 1948 23-.188-.064-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: überall nicht häufig, aus DGN noch nicht gemeldet.

WTL: Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB).

- UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1978, CJB) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Osnabrück (Kache leg. 1993/94, KACHE 1998) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1999/2000, CRB).
- OWB: Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1982, CRB, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).
- SBL: Elberfeld (Cornelius leg., CORNELIUS 1884) - Hönnetal (REHAGE & FELDMANN 1977) - Herdecke/Ruhr (Drees leg. 1982, CDH) - Hohenlimburg (Hellweg leg. 1987, CHF; Drees leg. 1990, CDH).

Atheta amicorum Lohse, 1973

23-.188-.067-.

D.: nur für Westfalen gemeldet.

Westf.: Das „+“ bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) beruht auf Fehlbestimmung.

Atheta amicula (Steph., 1832)

23-.188-.068-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

Besonders mycetophile Art (BENICK 1952).

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) - Häverner Marsch (Grundmann leg. 1982, CGL).

WTL: Münster (WESTHOFF 1881) - Oelde (Dahms leg. 1932, LMM) - Essen (Hozman leg. 1971, CHE) - Bochum (Hozman leg. 1973, CHE) - Coesfeld (Hozman leg. 1975, CHE) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1977/78, CRB, RENNER 1980) - Lippstadt: Geseke (Renner leg. 1981, CRB) - Salzkotten (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Nottuln (Terlutter leg. 1989, CTM) - Münster (Feldmann leg. 1990, CFM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1994/97/98/2000, CRB).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1934/35, LMM) - Eickum (Barner leg. 1934/36, LMM) - Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1975/76/77, CRB, RENNER 1981b) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Bröninghausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Leopoldshöhe (Renner leg. 1982, CRB) - Oerlinghausen (Renner leg. 1983, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/87/89/94/98, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995, Kache leg. 1992/93/94, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).

OWB: Paderborn (WESTHOFF 1881) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1978, CJB) - Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1980, CRB) - Lage: Hardisser Moor (Renner leg. 1980, CRB) - Diemeltal: Lamerden (Renner leg. 1981, CRB) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1981/82, CRB, RENNER 1985) - Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1981, CRB) - Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1981, CRB) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1982/83, CRB) - Warburg: Hellberg/Scherfede (Renner leg. 1983, CRB) - Diemeltal: Lamerden

(Terlutter leg. 1986, CTM) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91/92/93, CWB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Erkrath (Koch leg. 1959/61, KOCH i.l.) - Düsseldorf: zahlreiche F. (Koch leg. 1961-66, KOCH KOCH i.l.) - Hönnetal (REHAGE & FELDMANN 1977) - Solingen (KOLBE 1981, 1987, 1992) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1985, WENZEL 1989) - Hagen (Drees leg. 1988/91, CDH) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1990, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1991, CGL) - Sundern: Röhrensprung (Grundmann leg. 1991, CGL) - Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1993, CWR) - Radevormwald (WENZEL 1994).

Atheta pittionii Scheerp., 1950

23-188-070-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, aber aus DGN noch nicht gemeldet.

WTL: Lippstadt: Geseke (Renner leg. 1981, CRB) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1977, CRB, RENNER 1980) - Dortmund (Hellweg leg. 1987, CHF) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1993, CRB) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1993, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993/95/97, CRB).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1949/50, CJB) - Bielefeld: Hoberge-Uerenstrup (Renner leg. 1978, CRB, RENNER 1981a, b) - Leopoldshöhe (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1987/98, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Klaas leg. 1992, KACHE i.l., Kache leg. 1992/93/94, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.).

OWB: Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1981, CRB) - Paderborn-Wewer (Renner leg. 1981, CRB, RENNER 1985) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1982, CRB) - Lichtenau: Geimer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Marsberg: Dahlberg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Warburg: Weldaer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Lichtenau: Altenau-Tal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Scherfede: Hardehausen (Grundmann leg. 1989, CGL) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/92/93, CWB, SMB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1956/62, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Wuppertal (Pospischil leg. 1977, POSPISCHIL 1981) - Solingen (KOLBE 1981, 1984a, 1984c, 1988, 1992) - Solingen (Gräf leg. 1983, MKB) - Wuppertal (KOLBE 1982, 1996) - Radevormwald (Wenzel leg. 1985/86/89, WENZEL 1989) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/87/88, CGL) - Finnentrop (Hellweg leg. 1987, CHF) - Altena-Brachtenbeck (Grundmann leg. 1988, CGL) - Attendorn-Windhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988/91, CGL) - Meinerzhagen: Fürwigge-Talsperre (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Selscheid (Grundmann leg.

1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Sundern-Allendorf (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Hagen (Drees leg. 1989/90/99, CDH) - Langscheid/Sorpese (Grundmann leg. 1989, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1990/91, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Finnentrop: Ostentrop (Grundmann leg. 1991, CGL) - Neuenrade: Affeln (Grundmann leg. 1991, CGL) - Plettenberg: Eiringhausen (Grundmann leg. 1991, CGL) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1991, CGL) - Schmalleberg: Latrop-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Sundern: Röhrensprung (Grundmann leg. 1991, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1993/95, CWR) - Radevormwald (WENZEL 1994) - Menden: Hönnetal (Feldmann leg. 1995, CFM) - Hallenberg: Hesborn (Terlutter leg. 1996, CTM) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel, Lappann leg. 1998, CWR) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1999, CWR).

Atheta inquinula (Grav., 1802)

23-.188-.072-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Nettelstedter Moor (Peetz leg. 1935, LMM) - Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Feldmann leg. 1998, CFM).

WTL: Münster (Kolbe leg., WESTHOFF 1881) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1993/95/96, CRB) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1993, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993/94/95/96/97/98/99/2000, CRB) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1996, CRB) - Emsdetten: NSG Emsdettener Venn (Terlutter leg. 1996, CTM).

UWB: Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983/84/85/87, CRB) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Minden: Barkhausen (Renner leg. 1983, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1992/93, KACHE 1998) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1998/99/2000, CRB).

OWB: Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1983, CRB) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1983, CRB) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990, CWB) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1992/93/94, CFM, FELDMANN & LÜCKMANN 1998).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Hilden (Koch leg. 1956, KOCH i.l.) - Düsseldorf-Ost (Koch leg. 1959/67, KOCH i.l.) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1962, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1967, KOCH i.l.) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Attendorn-Ebbelingen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Schmalleberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1990, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Hagen (Drees leg. 1992/98, CDH) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel leg. 1998, CWR).

Atheta atricolor (Shp., 1869)

23-.188-.073-.

D.: Norden und Westen.

Westf.: wenige Funde.

UWB: Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983, CRB, RENNER et al. 1986).

SBL: Solingen: Ohligs (Koch leg. 1962, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1967, KOCH i.l.) - Solingen (KOLBE 1981, 1984a, 1984c, 1987, 1992, KOCH 1992) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Schmalleberg: Altenilpe (Grundmann leg. 1995, CGL) - Schmalleberg (Grundmann leg. 1995, CGL).

Atheta ganglbaueri Brundin, 1948

23-.188-.074-.

D.: weit zerstreute Funde.

Westf.: keine Meldung

Nordharz (SCHOLZE & JUNG 1994).

Atheta subtilis (Scriba, 1866)

23-.188-.076-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, nur aus OWB noch nicht gemeldet.

DGN: Hartum (Jankowski leg. 1977, CJB).

WTL: Bochum (Hozman leg. 1973, CHE) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1994, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1994/99, CRB).

UWB: Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1990, CRB) - Bielefeld: Niederdornberg (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Brönnighausen (Grundmann leg. 1982, CGL).

SBL: Ratingen (Koch leg. 1961/63/64/67, KOCH i.l.) - Gruiten (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Neandertal (Koch leg. 1964/65, KOCH 1968) - Ratingen: Homberg (Koch leg. 1965, KOCH i.l.) - Solingen (Gräf leg. 1968, KOCH 1974) - Solingen (KOLBE 1981, 1987, 1992, KOCH 1992) - Plettenberg (Hellweg leg. 1985, CHF) - Schmalleberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/87/88, CGL) - Attendorn: Repetal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop-Rönkhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Schwarze Ahe (Grundmann leg. 1988, CGL) - Meinerzhagen: Fürwigge-Talsperre (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Neuenrade: Affeln (Grundmann leg. 1991, CGL) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1991, CGL) - Sundern: Röhrensprung (Grundmann leg. 1991, CGL) - Wuppertal (KOLBE 1992, 1994, 1996) - Radevormwald (Wenzel leg. 1995, CWR).

Atheta aegra (Heer, 1841)

23-.188-.081-.

D.: nur im Norden weitgehend fehlend.

Westf.: nur aus DGN nicht gemeldet.

WTL: Münster-Baumberge (Beyer leg., LMM, BEYER 1932) - Lüdinghausen: Olfen (Terlutter leg. 1992, CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1998, CRB).

UWB: Osnabrück (Klaas leg. 1992, KACHE i.l.) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1999, CRB).

OWB: Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1983, CRB, RENNER et al. 1986) - Marsberg: Dahlberg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Warburg: Weldaer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1991, CWB) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1992, FELDMANN & LÜCKMANN 1998).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Solingen (KOLBE 1981, 1984, 1987, 1992, KOCH 1992) - Burscheid (Kolbe leg. 1986, KOLBE & BRUNS 1988, KÖHLER 1997, MKB) - Wuppertal (KOLBE 1994, 1996).

Atheta atomaria (Kr., 1856) 23-188-082-

D.: nur in wenigen Gebieten.

Westf.: nur zwei Funde aus SBL.

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Schmallebenberg (Grundmann leg. 1995, CGL).

Atheta minuscula (Bris., 1859) 23-188-087-

D.: Nordrhein, Holstein, Sachsen.

Westf.: keine Meldung.

Atheta glabricula Thoms., 1867 23-188-089-

D.: im Norden und Westen, sonst zerstreut.

Westf.: wenige Funde aus SBL.

SBL: Wuppertal (KOLBE 1984a, KOCH 1992) - Attendorn: Repetal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Plettenberg: Bommecke-Tal (Grundmann leg. 1992, CGL) - Solingen (KOLBE 1992).

Atheta indubia (Shp., 1869) 23-188-090-

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, aber aus DGN noch nicht gemeldet.

WTL: Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1994/95/96/98/99/2000, CRB) - Emsdetten: NSG Emsdettener Venn (Terlutter leg. 1996, CTM).

UWB: Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1987/98/99/2000, CRB).

OWB: Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982, CRB, RENNER & GRUNDMANN 1984, RENNER 1985) - Scherfede: Hardehausen (Grundmann leg. 1989, CGL).

SBL: Elberfeld (Scriba leg., KOCH 1968) - Hagen (Drees leg. 1982/91/93, DREES 1996) - Herdecke/Ruhr (Drees leg. 1982, CDH) - Solingen (KOLBE 1984a, 1992, KOCH 1992) - Iserlohn (Erbeling leg. 1986, ERBELING & DREES 1992) - Schmallebenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/87, CGL) - Attendorn: Repetal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop-Rönkhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988/91, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988/90, CGL) - Altena: Lahmer Bachtal (Grundmann

leg. 1989, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL)
- Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Harkortsee/
Ruhr (Drees leg. 1991, CDH) - Hückeswagen (Wenzel leg. 1991, CWR)
- Letmathe (ERBELING & DREES 1992) - Radevormwald (Wenzel leg.
1992, CWR) - Wuppertal (KOLBE 1996).

Atheta liliputana (Bris., 1860)

23-.188-.091-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) -
Dümmer: Hüde (Renner leg. 1983, CRB).

WTL: Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1982/83, CRB, RENNER et al. 1986)
- Hövelhof/Senne (Renner leg. 1994, CRB) - Paderborn: Südsenne
(Renner leg. 1995/97, CRB).

UWB: Bielefeld: Schildesche (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Isingdorf
(Renner leg. 1998/2000, CRB) - Detmold: Lippischer Wald (Renner leg.
2000, CRB).

OWB: Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982, CRB, RENNER 1985) - Bra-
kel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1983, CRB) - Scherfede: Hardehau-
sen (Grundmann leg. 1989, CGL).

SBL: Finnentrop-Rönkhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid:
Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988/91, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal
(Grundmann leg. 1991, CGL).

Atheta boreella Brundin, 1948

23-.188-.092-.

D.: Meldungen aus den meisten Teilgebieten.

Westf.: wenige Funde aus WTL, UWB.

WTL: Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1997, CRB).

UWB: Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984, CRB, RENNER et al. 1986; Ren-
ner leg 1987/88, CRB) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING
1994).

Atheta cribrata (Kr., 1856)

23-.188-.094-.

D.: vom Niederrhein über Holstein bis Sachsen, sonst zerstreut.

Westf.: aus DGN, OWB nicht gemeldet.

WTL: Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993/94/95, CRB) - Hövelhof/Senne
(Renner leg. 1994, CRB) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1996,
CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1996/97/99, CRB).

UWB: Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 2000, CRB) - Detmold: Lip-
pischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).

SBL: Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonne-
born (Grundmann leg. 1988, CGL) - Schmalleben: Wilzenberg
(Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann
leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992).

- Atheta mortuorum* Thoms., 1867 23-.188-.095-.
 D.: hauptsächlich im Westen.
 Westf.: wenige Funde.
 UWB: Detmold: Lippischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).
 SBL: Finnentrop-Wildewiese (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Sundern: Röhrenspring (Grundmann leg. 1991, CGL).
- Atheta testaceipes* (Heer, 1841) 23-.188-.097-.
 D.: hauptsächlich im Westen.
 Westf.: wenige Funde.
 UWB: Osnabrück (Klaas leg. 1992, KACHE i.l.).
 OWB: Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1981, CRB, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Höxter (Gerken leg. 1989, CAH, ASSING i.l.) - Beverungen (Figura leg. 1990, ASSING i.l.).
 SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968).
- Atheta pervagata* Benick, 1974 23-.188-.099-.
 D.: Süden und Mitte.
 Westf.: wenige Funde.
 UWB: Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995, Kache leg. 1992/93, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1999, CFM).
 OWB: Höxter (BENICK 1975) Höxter (Gerken leg. 1989, CAH, ASSING i.l.) - Beverungen (Figura leg. 1990, CAH, ASSING i.l.) - Marsberg/Diemel (Landwehr leg. 1991) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1994, FELDMANN & LÜCKMANN 1998).
- Atheta dilaticornis* (Kr., 1856) 23-.188-.102-.
 D.: nur in wenigen Gebieten.
 Westf.: nur eine alte Meldung.
 SBL: Hückeswagen (Eigen leg., KOCH 1968).
- Atheta voeslauensis* Bernh., 1944 23-.188-.105-.
 D.: nur in wenigen Gebieten.
 Westf.: nur ein Fund.
 WTL: Vreden: NSG Ellewicker Feld (Terlutter leg. 1988, CTM).
- Atheta sodalis* (Er., 1837) 23-.188-.109-.
 D.: in ganz Deutschland.
 Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

Besonders mycetophile Art (BENICK 1952).

- DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).
- WTL: Oelde (Dahms leg. 1930, 1935, LMM) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1977/78, CRB, RENNER 1980) - Gütersloh: Barrelpäule/Brockhagen (Grundmann leg. 1980, CGL) - Haltern (Hozman leg. 1980, CHE) - Lünen: Cappenberger Wald (Terlutter leg. 1984, CTM) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1987/96, CRB) - Heek/Ahaus: NSG Füchte-Kallenbeck (Terlutter leg. 1988, CTM) - Münster: Handorf (Grundmann leg. 1989, CGL) - Münster: Davert (Terlutter leg. 1990, CTM) - Münster: Wolbeck (Renner leg. 1991, CRB, Köhler leg. 1991/92, CKB) - Lüdinghausen: Olfen (Terlutter leg. 1992, CTM) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1993/97, CRE) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1993, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1994, CRB).
- UWB: Eickum (Barner leg. 1934, LMM) - Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1976/77, CRB, RENNER 1981b) - Barkhausen (Jankowski leg. 1977, CJB) - Bielefeld: Quelle (Renner leg. 1977, CRB) - Holzhausen (Jankowski leg. 1977, CJB) - Bielefeld: Lämershagen (Renner leg. 1978/2000, CRB) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Bad Salzuflen: Bexter Wald (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Bröninghausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Lage: Altholzhausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Minden: Barkhausen (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1988/89, CRB) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995, Kache leg. 1992/93/94, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcharding leg., BORCHERDING 1994).
- OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Lage: Hardisser Moor (Renner leg. 1980, CRB) - Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1981/82, CRB) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982, CRB, RENNER 1985) - Schlangen (Braun leg. 1982, CBP) - Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1982, CRB) - Schwaney/Egge (Grundmann leg. 1985/86, CGL) - Eggegebirge: Schwaney (Terlutter leg. 1986, CTM) - Marsberg: Dahlberg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91/92/93, CWB, SMB) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).
- SBL: Arnsberg (Varendorff leg., WESTHOFF 1881) - Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Düsseldorf: zahlreiche Funde Koch 60-68 - Wuppertal (KOLBE & HOUVER 1977, KOLBE 1978, 1982, 1992, 1994, 1996) - Hagen (Drees leg. 1980/88/90/92, CDH) - Solingen (KOLBE 1981, 1984a, 1984c, 1987, 1988, 1992) - Schmallenberg: Härdler (Terlutter leg. 1982, CTM) - Hilchenbach (Grundmann leg. 1983/86, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1983/84/85/86, WENZEL 1989) - Schmallenberg: Latrop-Tal (Grundmann leg. 1984/88, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Iserlohn: Hemer (Renner leg. 1988, CRB) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988/90, CGL) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1988, CGL) - Sundern-Allendorf (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Herscheid: Hüinghausen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Plettenberg: Pasel (Grundmann leg.

1990/91, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL)
- Altenkirchen (WAGNER 1992) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992/93,
CWR, WENZEL 1994) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993)
- Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel, Lappann leg. 1997/98/99,
CWR).

Atheta gagatina (Baudi, 1848)

23-.188-.110-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

Besonders mycetophile Art (BENICK 1952).

DGN: Lübbecke: Fiestel (Renner leg. 1978, CRB) - Oppenweher Moor
(Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) - Hopsten: NSG Hei-
liges Meer (Terlutter leg. 1994, CTM) .

WTL: Münster (Kolbe leg., WESTHOFF 1881) - Oelde (Dahms leg. 1924,
DAHMS 1928; Dahms leg.1935, LMM) - Ostenfelde (Dahms leg. 1929,
LMM) - Benteler (Dahms leg. 1930, LMM) - Sünninghausen (Dahms
leg. 1932, LMM) - Coesfeld (Hozman leg. 1975, CHE) - Bielefeld-Sen-
nestadt (Renner leg. 1976/77/78, CRB, RENNER 1980) - Oerlinghausen:
Senne (Grundmann leg. 1981, CGL) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn
(Terlutter leg. 1983, CTM) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1985,
CRB, RENNER 1987) - Dortmund (Hellweg leg.1986, CHF)
- Heek/Ahaus: NSG Fichte-Kallenbeck (Terlutter leg. 1986, CTM) -
Ahaus: Bröke (Terlutter leg. 1989, CTM) - Münster: Davert (Röwe-
kamp, Terlutter leg. 1990, CRE, CTM) - Münster: Wolbeck (Köhler leg.
1991, CKB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1994, CRB) - Emsdet-
ten: NSG Emsdettener Venn (Terlutter leg. 1996, CTM).

UWB: Eickum (Barner leg. 1935, LMM) - Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935,
LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1956, CJB) - Halle: Jakobsberg
(Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Bielefeld: Jöllen-
beck (Grundmann leg. 1982, CGL) - Lage: Altholzhausen (Grundmann
leg. 1982, CGL) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993)
- Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995) - Osa-
nabrück (Klaas leg. 1992, KACHE i.l., Kache leg. 1992/93, KACHE 1998) -
Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bramsche (Kunze
leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).

OWB: Warburg: Heineberg/Ossendorf (Renner leg. 1978/81/82, CRB) -
Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1980/82, CRB) - Warburg:
Hellberg/Scherfede (Renner leg. 1980/81, CRB) - Brakel:
Hamberg/Riesel (Renner leg. 1981/82, CRB) - Diemeltal: Lamerden
(Renner leg. 1981, CRB) - Paderborn-Wewer (Renner leg. 1981, CRB,
RENNER 1985) - Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1981, CRB) - War-
burg: Weldaer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Scherfede: Scheffel-
berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg.
1992/93/94, FELDMANN & LÜCKMANN 1998).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchen-
bach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Leu-
scheid/Sieg (Appel leg. 1954/74, MKB) - Ratingen (Koch leg. 1960,
KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1961/63, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Ger-
resheim (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1963,

KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Wuppertal (KOLBE & HOUVER 1973, KOLBE 1973, 1978, 1982) - Hagen (Drees leg. 1982/90/91/92, CDH, Hellweg leg. 1987, CHF) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/88, CGL) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1987, WENZEL 1989) - Allendorf (Hellweg leg. 1988, CHF) - Fredeburg: NSG Hunau (Terlutter leg. 1989, CTM) - Plettenberg: Bommecke-Tal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1990, CGL) - Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1993, CWR, WENZEL 1994).

Atheta pallidicornis (Thoms., 1856)

23.-188.-111.-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, aber aus DGN noch nicht gemeldet.

Besonders mycetophile Art (BENICK 1952).

WTL: Oelde (Dahms leg. 1932, LMM) - Essen (Hozman leg. 1970, CHE) - Dülmen (Hozman leg. 1975, CHE) - Lünen: Cappenberger Wald (Terlutter leg. 1984, CTM) - Münster: Wolbeck (Starke leg. 1985, CSW) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1997/99, CRB).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1980, CJB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1994/98/99, CRB) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1978, CJB) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Ratingen (Koch leg. 1956/60/63/64/66, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1957/66, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1959/64, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1960/64, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1960/61/62/63, KOCH i.l.) - Mettmann: Schöller (Koch leg. 1961/62/64, KOCH i.l.) - Ratingen: Bellscheidt (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1962, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1962/63/64, KOCH i.l.) - Gruiten (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1966, KOCH i.l., Gräf leg. 1983, MKB) - Engelskirchen (Appel leg. 1973, MKB) - Hönnetal (REHAGE & FELDMANN 1977) - Wuppertal (Pospischil leg. 1977, POSPISCHIL 1981) - Wuppertal (KOLBE 1982) - Radevormwald (Wenzel leg. 1983/85/86, WENZEL 1989) - Solingen (KOLBE 1984a, 1992) - Plettenberg (Hellweg leg. 1985, CHF) - Altena-Brachtenbeck (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop-Rönkhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Selscheid (Grundmann leg. 1988, CGL) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1988, CGL) - Sundern: Allendorf (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecke-Tal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1990, CGL) - Herdecke/Ruhr (Drees leg. 1991/95, CDH) - Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1993, CWR) - Wiblingwerde: Nachrodt (Terlutter leg. 1994, CTM).

Atheta hybrida (Shp., 1869)

23-.188-.112-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: aus DGN noch nicht gemeldet.

- WTL: Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1977/78, CRB, RENNER 1980) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1996, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1999/2000, CRB).
- UWB: Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1976, CRB, RENNER 1981a, b) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1985, CRB) - Osnabrück (Klaas leg. 1992, KACHE i.l., Kache leg. 1992, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).
- OWB: Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1981, CRB) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982, CRB, RENNER 1985) - Schlangen (Braun leg. 1982, CBP) - Marsberg: Dahlberg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91/92, CWB) - Lichtenau (Braun leg. 1992, CBP) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1993, FELDMANN & LÜCKMANN 1998) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).
- SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Witten (FÜGNER 1902) - Hagen (Drees leg. 1988/94, CDH) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Waldbröl (Köhler leg. 1996, CKB) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Lappann, Wenzel leg. 1997, CWR, CRB).

Atheta trinotata (Kr., 1856)

23-.188-.114-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

- DGN: Heiliges Meer (Peetz leg. 1937, LMM) - Dümmer: Hüde (Renner leg. 1983, CRB) - Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991).
- WTL: Münster (WESTHOFF 1881) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1977/78, CRB, RENNER 1980) - Oerlinghausen: Senne (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Münster: Rieselfelder Münster (Terlutter leg. 1987, CTM) - Gronau: NSG Amtsvenn (Starke leg. 1989, CSW) - Münster: Davert (Terlutter leg. 1990, CTM) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1992/95/97/99, CRB) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1995, CRB).
- UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1956, CJB) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Lage: Altholzhausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Oerlinghausen (Renner leg. 1983, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/87/89/94/98, CRB).
- OWB: Paderborn (Westhoff 1881) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1975, CJB) - Paderborn-Wewer (Renner leg. 1979/81, CRB, RENNER 1985) - Lage: Hardisser Moor (Renner leg. 1980, CRB) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1981/82, CRB) - Diemeltal: Lamerden (Renner leg.

1981, CRB) - Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1981, CRB) - Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1981/82, CRB) - Warburg: Hellberg/Scherfede (Renner leg. 1982/83, CRB) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990, CWB, SMB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Elberfeld (WESTHOFF 1881) - Hilchenbach (WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Ratingen (Koch leg. 1960/64/67, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1968, KOCH i.l.) - Radevormwald (Wenzel leg. 1978/83/84/87, WENZEL 1989) - Herdecke/Ruhr (Drees leg. 1984, CDH) - Plettenberg (Erbeling leg. 1987/91, CErL) - Finnentrop-Rönkhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988/90, CGL) - Sundern-Allendorf (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Hagen (Drees leg. 1989/90, CDH) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Marienheide/Gimborn (Wenzel leg. 1990, CWR) - Neheim-Hüsten: Herdringen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Finnentrop: Ostentrop (Grundmann leg. 1991, CGL) - Schmalleberg: Altenilpe (Grundmann leg. 1994, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1995, CWR) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel, Lappann leg. 1998, CWR).

Atheta cadaverina (Bris., 1860)

23-188-118-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: aus DGN noch nicht gemeldet.

WTL: Münster: Lövelingloh (Terlutter leg. 1986, CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1989/96/99, CRB) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1990/96, CRB) - Münster: Davert (Terlutter leg. 1990, CTM) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB).

UWB: Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1985/87, CRB) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1975, CJB) - Marsberg: Dahlberg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Witten (FÜGNER 1902) - Hückeswagen (Eigen leg., MKB) - Ratingen (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Wuppertal (KOLBE 1973, 1978, 1982) - Radevormwald (Wenzel leg. 1983/86, WENZEL 1989) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988/90, CGL) - Schmalleberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Marienheide/Gimborn (Wenzel leg. 1990, CWR) - Sundern: Röhrenspring (Grundmann leg. 1991, CGL) - Hagen (Drees leg. 1993, CDH).

- Atheta hansseni* Strand, 1943 23-.188-.119-
D.: im Norden weitgehend fehlend, sonst zerstreute Funde.
Westf.: wenige Funde.
UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1979, CJB).
OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1980, CJB).
SBL: Menden (Hellweg leg. 1987, CHF) - Schmallebenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1988, CGL) - Solingen (KOLBE 1992) - Schmallebenberg: Altenilpe (Grundmann leg. 1995, CGL).
- Atheta subglabra* (Shp., 1869) 23-.188-.120-
D.: Funde weit zerstreut.
Westf.: aus DGN und OWB nicht gemeldet.
WTL: Hövelhof/Senne (Renner leg. 1994, CRB, RENNER 1998).
UWB: Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983, CRB, RENNER et al. 1986) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1999/2000, CRB, CFM) - Detmold: Lip-pischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).
SBL: Solingen (KOLBE 1984a, 1992, KOCH 1992) - Altena-Brachtenbeck (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop-Wildewiese (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988/91, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988/90, CGL) - Plettenberg: Bommecke-Tal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBE-LING 1992) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL).
- Atheta tibialis* (Heer, 1839) 23-.188-.121-
D.: Alpen, Schwarzwald, Harz.
Westf.: kein eindeutiger Nachweis.
Art der höheren Gebirge.
WTL: Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1990, CRB) ; verschleppt? Nachsuche im Kältebiotop ohne Erfolg.
SBL: Hückeswagen (Eigen leg.: Fundortverwechslung, KOCH 1968).
- Atheta serrata* Benick, 1938 23-.188-.123-
D.: nur einzelne Funde zwischen Bayern und Holstein.
Westf.: keine Meldung.
- Atheta picipes* (Thoms., 1856) 23-.188-.126-
D.: in ganz Deutschland.
Westf.: aus DGN noch nicht gemeldet.
WTL: Oelde (Dahms leg. 1925, DAHMS 1928) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1976/90, CRB).
UWB: Barkhausen (Jankowski leg. o.J., CJB) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).
OWB: Klein Möllenbeck (Jankowski leg. 1982, CJB) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982/83, CRB, RENNER 1985) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884, WESTHOFF 1886, KOCH 1968) - Solingen (Gräf leg. 1967, 1980, KOCH 1974, 1992) - Schmallebenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/88, CGL).

Atheta melanaria (Mannh., 1830) 23-188-131-

D.: im Norden und Westen, sonst zerstreut.

Westf.: wenige Funde.

DGN: Oppenweher Moor (Renner leg. 1984, CRB, RENNER et al. 1986).

WTL: Saerbeck/Ems (Peetz leg. 1936, PEETZ 1937, LMM).

UWB: Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983, CRB, RENNER et al. 1986) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1998, CRB).

SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884, WESTHOFF 1886, KOCH 1968) - Witten (FÜGNER 1902) - Hagen (Drees leg. 1991, CDH).

Atheta clientula (Er., 1839) 23-188-132-

D.: fast aus allen Teilgebieten gemeldet, nur an den Küsten häufiger.

Westf.: eine sehr alte, unbelegte Meldung. Das „+“ bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) beruht auf Fehlbestimmung.

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968).

Atheta fussi Bernh., 1908 23-188-133-

D.: nur in wenigen Gebieten.

Westf.: eine sehr alte Meldung.

SBL: Hückeswagen (Eigen leg., KOCH 1968).

Atheta orphana (Er., 1837) 23-188-134-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, aber aus DGN noch nicht gemeldet.

WTL: Ennigerloh (Dahms leg. 1924, DAHMS 1928) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1985, CRB, RENNER 1987) - Ladbergen: Eltingmühlenbach (Terlutter leg. 1993, CTM) - Münster: Davert (Feldmann leg. 1993, CFM) - Emsdetten: NSG Emsdettener Venn (Terlutter leg. 1996, CTM).

UWB: Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1987, CRB) - Barkhausen (Borcherdig leg., BORCHERDING 1994) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.) - Minden: Wesertal (Renner leg. 1995, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1981, CRB) - Lichtenau: Altena-Tal (Grundmann leg. 1989, CGL).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Overath (Rüschkamp leg. 1929, KOCH 1968) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1957/62/66, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1962/63, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Gerresheim

(Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Solingen (Modrow leg. 1963, KOCH 1974) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1968, KOCH i.l.) - Solingen (KOLBE 1984a, 1987, 1992) - Plettenberg: Pasel (Grundmann leg. 1990, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1990, CGL) - Altenhudem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992/93/96, CWR) - Westerwald: Altenkirchen (WAGNER 1992) - Wissen/Sieg: Gebhardshain (WAGNER 1992) - Radevormwald (WENZEL 1994) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1998, CWR).

Atheta orbata (Er., 1837)

23-.188-.135-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, aber aus DGN noch nicht gemeldet.

WTL: Münster (PEETZ 1937) - Saerbeck/Ems (PEETZ 1937) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1988, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1988/91/93, CRB) - Warendorf (Starke leg. 1988, CSW) - Münster: Handorf (Grundmann leg. 1989, CGL) - Münster: Davert (Terlutter leg. 1990, CTM) - Lüdinghausen: Olfen (Terlutter leg. 1992, CTM) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1996, CRE).

UWB: Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Lage (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1998/99, CRB) - Bielefeld: Buschkamp (Renner leg. 2000, CRB) - Detmold: Lip-pischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Lage: Hardisser Moor (Renner leg. 1980, CRB) - Georgsberg/Willeba-dessen (Renner leg. 1980, CRB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Solingen (KOLBE 1987, KOCH 1992) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1990, CGL) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1992, WENZEL 1997) - Wuppertal (KOLBE 1992, 1996) - Hagen: Hengsteysee (Drees leg. 1993, CDH) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel, Lappann leg. 1998, CWR).

Atheta fungi (Grav., 1806)

23-.188-.136-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: überall eine der häufigsten Atheten.

Besonders mycetophile Art (BENICK 1952).

Atheta negligens (Muls.Rey, 1873)

23-.188-.1361.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Hiller Moor (Renner leg. 1981, CRB).

WTL: Essen (Hozman leg. 1970, CHE) - Vreden: Ammeloe (Hozman leg. 1984, CHE) - Münster: Handorf (Grundmann leg. 1989, CGL) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Haltern (Ahrens leg. 1992, KÖHLER i.l.) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1995, CRB) - Ahlen:

- Enniger (Röwekamp leg. 1996, CRE) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1997, CRB).
- UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935, LMM) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1994, CRB).
- OWB: Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91/92, CWB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).
- SBL: Wuppertal (Pospischil leg. 1977, POSPISCHIL 1981) - Hagen (Drees leg. 1982, CDH) - Hohenlimburg (Drees leg. 1982, CDH) - Solingen (KOLBE 1984a, 1988, 1992) - Iserlohn (Erbeling leg. 1986, ERBELING & DREES 1992) - Letmathe (Drees leg. 1986, CDH, ERBELING & DREES 1992) - Nachrodt/Lenne (Feldmann leg. 1997, CFM).

Atheta ampliocollis (Muls.Rey, 1873)

23-188-1362.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

- DN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).
- WTL: Saerbeck/Ems (Peetz leg. 1936, LMM) - Münster (Peetz leg. 1936, LMM) - Dorsten (Hozman leg. 1975, CHE) - Gütersloh: Verl (Renner leg. 1975/79, CRB) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1977, CRB, RENNER 1980) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1977, CRB) - Gütersloh: Barrelpäule/Brockhagen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Warendorf (Starke leg. 1986/87/92, CSW) - Münster: Handorf (Grundmann leg. 1989, CGL) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1991/94, CRB) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1993, CRE) - Ahlen-Dolberg (Röwekamp leg. 1995, CRE) - Ahaus: NSG Graeser Venn (Terlutter leg. 1996, CTM) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1996, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1998/99, CRB).
- UWB: Porta/Weser (Peetz leg. 1932/36, LMM) - Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1978, CRB, RENNER 1981a, b) - Bad Salzuflen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Herford-Herringhausen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Lage (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.) - Minden: Wesertal (Renner leg. 1995, CRB).
- OWB: Höxter (Gerken leg. 1989, ASSING i.l.) - Solingen (Gräf leg. 1968/81, KOCH 1992) - Lichtenau: Geimer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Scherfede: Hardehausen (Grundmann leg. 1989, CGL) - Beverungen (Figura leg. 1990, ASSING i.l.) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990, CWB) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1994, FELDMANN & LÜCKMANN 1998).
- SBL: Solingen (Modrow leg. 1958/64/66, KOCH 1968; Modrow leg. 1964/66/71, KÖHLER 1993, MKB) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Attendorn (Renner leg. 1967, CRB) - Westhofen (Drees leg. 1981, CDH) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1985, WENZEL 1989) - Schmalleben: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/88, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Lahmer Bachtal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Plettenberg: Bommecketal

(Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Plettenberg (Erbeling leg. 1990/91/92, CErL) - Plettenberg: Pasel (Grundmann leg. 1990/91, CGL) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1990, CGL) - Plettenberg: Eiringhausen (Grundmann leg. 1991, CGL) - Schwerte (Drees leg. 1991, CDH) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1992, WENZEL 1997) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992/93, CWR) - Schmallenberg: Altenilpe (Grundmann leg. 1994, CGL).

Atheta gilvicollis Scheerp., 1949 23-.188-.1363.

D.: im westlichen Deutschland.

Westf.: nur zwei Funde.

SBL: Lüderich/Sülz (Appel leg. 1971, MKB) - Wuppertal (KOLBE 1982).

Atheta subsinuata (Er., 1839) 23-.188-.150-.

D.: vom Rheinland über Holstein bis Sachsen.

Westf.: nur drei Funde aus SBL.

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Hückeswagen (Eigen leg., KOCH 1968) - Sundern: Röhrenspring (Grundmann leg. 1991, CGL).

Atheta zosteræ (Thoms., 1856) 23-.188-.151-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: sehr wenige Funde.

WTL: Essen: Frintrop (Hozman leg. 1970, CHE) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1983, CTM) - Vreden: NSG Ellewicker Feld (Terlutter leg. 1988, CTM).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968).

Atheta nigra (Kr., 1856) 23-.188-.153-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

Besonders mycetophile Art (BENICK 1952).

DGN: Nettelstedter Moor (Peetz leg. 1935, LMM) - Häverner Marsch (Grundmann leg. 1982, CGL) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) - Ovenstädt (Renner leg. 1984, CRB).

WTL: Essen (Hozman leg. 1970, CHE) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1978, CRB, Renner 1980) - Herzebrock: Clarholz (Terlutter leg. 1980, CTM) - Salzkotten (Renner leg. 1982, CRB) - Heek/Ahaus: NSG Fächte-Kallenbeck (Terlutter leg. 1986, CTM) - Münster: Westbevern (Terlutter leg. 1986, CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1989/92/93/94/98/99, CRB) - Lüdinghausen: Olfen (Terlutter leg. 1992, CTM) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1993, CRB) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1994, CRB) - Billerbeck (Terlutter leg. 1995, CTM).

- UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1934/35/36, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1958/76, CJB) - Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1975/76/77, CRB, RENNER 1981b) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Bielefeld: Niederdornberg (Grundmann leg. 1981, CGL) - Lage: Altholzhausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Minden: Barkhausen (Renner leg. 1983, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/85/87/88/98/99/2000, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Kache leg. 1992/93, KACHE1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).
- OWB: Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1982/83, CRB) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982/83, CRB, RENNER 1985) - Brakel: Hamburg/Riesel (Renner leg. 1983, CRB) - Warburg: Hellberg/Scherfede (Renner leg. 1983, CRB) - Lichtenau: Altenau-Tal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91, CWB) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1994, FELDMANN & LÜCKMANN 1998) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).
- SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Hagen (Drees leg. 1984/88/89/90, CDH) - Solingen (KOLBE 1984a, 1987, 1988, 1992) - Radevormwald (Wenzel leg. 1986, WENZEL 1989) - Attendorn: Repetal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Meinerzhagen: Fürwigge-Talsperre (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988/90, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Finnentrop: Ostentrop (Grundmann leg. 1991, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Plettenberg: Pasel (Grundmann leg. 1991, CGL) - Sundern: Röhrenspring (Grundmann leg. 1991, CGL) - Hönnetal (Grundmann leg. 1994, CGL) - Schmallenberg: Altenilpe (Grundmann leg. 1994, CGL) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel, Lappann leg. 1998, CWR).

Atheta dadopora (Thoms., 1867)

23-188-155-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 1995, CTM).

WTL: Oelde (Dahms leg. 1929, 1933 LMM) - Bochum (Hozman leg. 1971, CHE) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1977/78/79, CRB, RENNER 1980) - Lünen: Cappenberger Wald (Terlutter leg. 1984, CTM) - Münster: Lövelingloh (Terlutter leg. 1986, CTM) - Vreden: NSG Ellewicker Feld (Terlutter leg. 1988, CTM) - Ahaus: Bröke (Terlutter leg. 1989, CTM) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Münster: Davert (Feldmann leg. 1992, CFM) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1994, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1995/98/2000, CRB).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1975, CJB) - Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1975/76/77, CRB, RENNER 1981a, b) - Bad Salzuflen (Grundmann leg. 1980, CGL) - Bielefeld: Niederdornberg (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1990/99, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1993, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding

leg., BORCHERDING 1994) - Detmold: Lippischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1966/67, CJB) - Lichtenau: Altenau-Tal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Solingen (Modrow leg. 1955/57, KOCH 1968) - Hilden (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1960/63/64, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1962/64, KOCH i.l.) - Hagen (Drees leg. 1981/87/90/92, CDH) - Solingen (Gräf leg. 1983, MKB) - Schmalleben: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/87/88, CGL) - Finnentrop-Rönkhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Oester-Talsperre (Grundmann leg. 1988, CGL) - Lennestadt (Hellweg leg. 1988, CHF) - Altena: Lahmer Bachtal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Marienheide/Gimborn (Wenzel leg. 1990, CWR) - Neheim-Hüsten: Herdringen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1990, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1990, CWR) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1991, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992/93, CWR) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Radevormwald (WENZEL 1994).

Atheta canescens (Shp., 1869)

23-.188-.157-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: aus DGN, OWB nicht gemeldet.

WTL: Sünninghausen (Dahms leg. 1930, LMM) - Bochum (Hozman leg. 1971, CHE) - Nottuln (Terlutter leg. 1993, CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993/97, CRB).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1956, CJB) - Bielefeld: Niederdornberg (Grundmann leg. 1981, CGL) - Barkhausen (Borchering leg., BORCHERDING 1994).

SBL: Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1963/67, KOCH i.l.) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1986, WENZEL 1989) - Meinerzhagen: Fürwigge-Talsperre (Grundmann leg. 1988, CGL) - Hagen (Drees leg. 1990/93, CDH, DREES 1996) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992, CWR, WENZEL 1994).

Atheta sordidula (Er., 1837)

23-.188-.158-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Nettelstedter Moor (Peetz leg. 1936, LMM) - Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991).

WTL: Gütersloh: Barrelpäule/Brockhagen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Vreden: NSG Ellewicker Feld (Terlutter leg. 1983, CTM) - Gronau: Luchtbült (Terlutter leg. 1985, CTM) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1993/96, CRB) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1993, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1995/98/99, CRB) - Ahaus: NSG Graeser

Venn (Terlutter leg. 1996, CTM) - Emsdetten: NSG Emsdettener Venn (Terlutter leg. 1996, CTM).

- UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1975, CJB) - Bad Salzufflen: Bexter Wald (Grundmann leg. 1980, CGL) - Bielefeld: Niederdornberg (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/87/96, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Kache leg. 1992, KACHE 1998) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 2000, CRB) - Detmold: Lippischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).
- OWB: Minden: Vennebeck (Renner leg. 1983, CRB) - Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1983, CRB) - Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1983, CRB) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1991, CWB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).
- SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Hösel (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Hildden (Koch leg. 1964, Koch i.l.) - Wissen/Sieg: Roth (Stock leg. 1976, CSR) - Solingen (KOLBE 1988, 1992) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Hagen (Drees leg. 1992, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992, CWR, WENZEL 1994) - Westerwald: Altenkirchen (WAGNER 1992) - Wuppertal (KOLBE 1994, 1996).

Atheta celata (Er., 1837)

23-188-159-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

Besonders mycetophile Art (BENICK 1952).

- DGN: Nettelstedter Moor (Peetz leg. 1935, LMM) - Hiller Moor (Grundmann leg. 1981, CGL) - Hiller Moor (Renner leg. 1981, CRB) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) - Recke: NSG Recker Moor (Terlutter leg. 1993, CTM) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 1998, CTM).
- WTL: Oelde (Dahms leg. 1933, LMM) - Münster: Rieselfelder Münster (Terlutter leg. 1987, CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1989/94/96/97/99, CRB) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1990, CRB) - Münster: Davert (Terlutter leg. 1990, CTM) - Nottuln (Terlutter leg. 1990, CTM) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Lüdinghausen: Olfen (Terlutter leg. 1992, CTM).
- UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935, LMM) - Bielefeld: Hoberge-Uerenstrup (Renner leg. 1975, CRB, RENNEN 1981b) - Barkhausen (Jankowski leg. 1976, CJB) - Bad Salzufflen: Bexter Wald (Grundmann leg. 1980, CGL) - Bielefeld: Niederdornberg (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Brönninghausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Jöllenberg (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983/87/88/89/98, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Kache leg. 1993, KACHE 1998) - Bielefeld: Stadt (Renner leg. 2000, CRB).
- OWB: Lemgo (Grundmann leg. 1981/82, CGL) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1982/83, CRB) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982,

CRB, RENNER 1985) - Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1983, CRB) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1994, FELDMANN & LÜCKMANN 1998) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1957/62/64, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1959/63, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1961/64, KOCH i.l.) - Mettmann: Schöller (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Gruiten (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1964/65, KOCH i.l.) - Hagen (Drees leg. 1982/93, CDH) - Schmallebenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1987/88, CGL) - Solingen (KOLBE 1987, 1988, 1992) - Attendorn: Reptal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop-Rönkhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988/91, CGL) - Herscheid: Becke (Grundmann leg. 1988, CGL) - Iserlohn: Hemer (Renner leg. 1988, CRB) - Meinerzhagen: Fürwigge-Tal-sperre (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Sundern-Allendorf (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Radevormwald (Wenzel leg. 1989, CWR) - Plettenberg: Eiringhausen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1990, CGL) - Wiblingwerde (Drees leg. 1990, CDH) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Herscheid: Elsen (Grundmann leg. 1991, CGL) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1991/92, WENZEL 1997) - Sundern: Röhrenspring (Grundmann leg. 1991, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992, CWR, WENZEL 1994) - Schmallebenberg: Altenilpe (Grundmann leg. 1994, CGL) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Lappann leg. 1998, CWR) - .

Atheta hypnorum (Kiesw., 1850)

23-.188-.161-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1987/90, CRB, RENNER 1987) - Ahaus: Bröke (Terlutter leg. 1989, CTM) - Münster: Davert (Terlutter leg. 1990, CTM) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1976, CJB) - Osnabrück (Kache leg. 1993, KACHE 1998).

OWB: Schwaney/Egge (Grundmann leg. 1983, CGL).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Witten (FÜGNER 1902) - Hösel (Koch leg. 1962, KOCH i.l.) - Solingen (Modrow leg. 1963, KOCH 1974, KÖHLER 1993, MKB; Gräf leg. 1968, KOCH 1992) - Hückeswagen (Eigen leg., KOCH 1968) - Remscheid (Bremer leg. 1974, KÖHLER i.l.) - Schmallebenberg: Härdler (Terlutter leg. 1983, CTM) - Hilchenbach (Grundmann leg. 1985/86, CGL) - Schmallebenberg: Aberg (Grundmann leg. 1985/86/87, CGL) - Schmallebenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986, CGL) - Schmallebenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986, CGL) - Hagen (Drees leg. 1986,

CDH) - Gummersbach: Engelskirchen (Gerhard leg. 1988, CGR) - Olpe: Reichshof (Gerhard leg. 1988, CGR) - Solingen (KOLBE 1988, 1992, KOCH 1992) - Fredeburg: NSG Hunau (Terlutter leg. 1989, CTM) - Gummersbach: Wiehl (Gerhard leg. 1989, CGR) - Plettenberg-Sonnenborn (Grundmann leg. 1990, CGL) - Finnentrop: Kuckuck (Grundmann leg. 1991, CGL) - Halver/Ennepe (Drees leg. 1991, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992/93, CWR, WENZEL 1994) - Wuppertal (KOLBE 1992, 1996) - Wuppertal (Thiele leg., KÖHLER 1993, MKB).

Atheta brunneipennis (Thoms., 1852)

23-188-164-

D.: nur in wenigen Gebieten .

Westf.: wenige Funde.

UWB: Osnabrück (Kache leg. 1992, KACHE 1998).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., KOCH 1968) - Attendorf-Echternhagen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992).

Atheta castanoptera (Mannh., 1831)

23-188-165-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

Besonders mycetophile Art (BENICK 1952).

DGN: Hartum (Jankowski leg. 1979, CJB) - Lübbecke: Fiestel (Renner leg. 1978, CRB).

WTL: Oelde (Dahms leg. 1925, DAHMS 1928) - Oelde (Dahms leg. 1933, LMM) - Osnabrück: Rulle (Hozman leg. 1970, CHE) - Bochum (Hozman leg. 1972, CHE) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1978, CRB, RENNER 1980) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1980/87, CRB, RENNER 1987) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Lünen: Cappenberger Wald (Terlutter leg. 1984, CTM) - Münster: Wolbeck (Köhler, Renner leg. 1991, CKB, CRB).

UWB: Preuß. Oldendorf (PEETZ 1931; Peetz leg. 1935, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1966/79, CJB) - Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1976/77/78, CRB, RENNER 1981b) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/85/87/88, CRB) - Detmold: Lippischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1979, CJB) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1981/82, CRB, RENNER 1985) - Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1981, CRB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Hösel (Koch leg. 1957/58/60/68, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1959/61, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1962, KOCH i.l.) - Gruiten (Koch leg. 1962/63, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Attendorf (Renner leg. 1967, CRB) - Wuppertal

(KOLBE & HOUVER 1973, KOLBE 1973, 1978) - Hagen (Drees leg. 1981, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1981/85, WENZEL 1989) - Wissen/Sieg: Roth (Stock leg. 1982, CSR) - Hohenlimburg (Drees leg. 1984, CDH) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/88, CGL) - Hagen (Drees leg. 1988/91, CDH) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1991, CGL) - Attendorn: Borghausen (Grundmann leg. 1991, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992/94, CWR, WENZEL 1994) - Schmallenberg: Altenilpe (Grundmann leg. 1994, CGL).

Atheta ermischi Benick, 1934

23-.188-.167-.

D.: von Bayern über Hannover bis Sachsen.

Westf.: keine Meldung.

Atheta triangulum (Kr., 1856)

23-.188-.168-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Holzhausen (Peetz leg. 1936, LMM) - Hiller Moor (Grundmann leg. 1981, CGL) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Münster (PEETZ 1937) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1997, CRB) - Harsewinkel (Dahms leg. 1929, LMM) - Bochum (Hozman leg. 1976, CHE) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1977/78, CRB, RENNER 1980) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1984, CTM) - Münster: Westbevern (Terlutter leg. 1986, CTM) - Warendorf: Drensteinfurt (Terlutter leg. 1986, CTM) - Telgte (Starke leg. 1987, CSW) - Bokel/Ems (1989, WASNER i.l.) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1992/94, CRE) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1993/95, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993/94/95/96/97/99, CRB) - Ahaus: Butenfeld (Terlutter leg. 1994, CTM).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1936, LMM) - Bielefeld: Hoberge-Uerenstrup (Renner leg. 1978, CRB, RENNER 1981b) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Herford: Herringhausen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Lage: Altholzhausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Lage (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bad Salzuflen: Bexter Wald (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983/84/87/89/94/95/96/99/2000, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1992/93/94, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1978, CJB) - Körbecke (Kroker leg. 1978/79, KROKER 1981, KROKER & RENNER 1983) - Lage: Hardisser Moor (Renner leg. 1980, CRB) - Paderborn-Wewer (Renner leg. 1981/82, CRB, RENNER 1985) - Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1981/82, CRB) - Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1981/82, CRB) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1982/83, CRB) - Diemel-

tal: Lamerden (Renner leg. 1982, CRB) - Lemgo (Grundmann leg. 1982, CGL) - Neuenbeken (Braun leg. 1982, CBP) - Paderborn (Braun leg. 1982, CBP) - Warburg: Hellberg/Scherfede (Renner leg. 1982, CRB) - Marsberg: Dahlberg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Schwaney/Egge (Grundmann leg. 1986, CGL) - Lichtenau: Altenau-Tal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Scherfede: Hardehausen (Grundmann leg. 1989, CGL) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91/92, CWB, SMB) - Paderborn: Kirchborchen (Braun leg. 1992, CBP) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1994, FELDMANN & LÜCKMANN 1998) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Solingen (Modrow leg. 1950, MKB) - Hönnetal (REHAGE & FELDMANN 1977) - Hagen (Drees leg. 1979/81/88, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1981/82/85/86, WENZEL 1989) - Solingen (KOLBE 1981, 1984a, 1984b, 1984c, 1987, 1988, 1992) - Schmalleberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1987/88, CGL) - Altena-Brachtenbeck (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988/91, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1990, CGL) - Marienheide/Gimborn (Wenzel leg. 1990, CWR) - Finnentrop: Ostentrop (Grundmann leg. 1991, CGL) - Westhofen (Drees leg. 1991, CDH) - Dortmund (Drees leg. 1992, CDH) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1992, WENZEL 1997) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992/93/95, CWR, WENZEL 1994) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Wuppertal (KOLBE 1994, 1996) - Heiligenhaus: Vogel-sangbachtal (Lappann leg. 1998, CWR) - Heiligenhaus: NSG Hofer-mühle (Wenzel leg. 1999, CWR).

Atheta xanthopus (Thoms., 1856)

23-188-169-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, aus DGN noch nicht gemeldet.

WTL: Schloß Holte-Stukenbrock (Renner leg. 1974, CRB) - Dortmund (Hellweg leg. 1987, CHF) - Münster: Rieselfelder Münster (Terlutter leg. 1987, CTM) - Nottuln (Terlutter leg. 1989, CTM) - Ahlen (Röwekamp leg. 1992, CRE) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1995, CRB).

UWB: Eickum (Barner leg. 1935, LMM) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1988, CRB).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1967, CJB) - Lage: Hardisser Moor (Renner leg. 1980, CRB) - Porta Westfalica (Grundmann leg. 1983, CGL) - Scherfede: Hardehausen (Grundmann leg. 1989, CGL) - Beverungen (Figura leg. 1990, ASSING i.l.) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990, CWB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Imhausen/Sieg (Appel leg. 1948, MKB) - Hilden (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1985, WENZEL 1989) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Selscheid (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988/90, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989,

CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Hagen (Drees leg. 1993, CDH) - Witten (Drees leg. 1994, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1995, CWR) - Wetter/Ruhr (Drees leg. 1998, CDH).

Atheta graminicola (Grav., 1806)

23-.188-.170-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1955, CJB) - Dümmer: Hüde (Renner leg. 1983, CRB) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 1996, CTM).

WTL: Münster-Baumberge (Beyer leg. 1929, LMM) - Wiedenbrück (Rehage leg., CRD, REHAGE 1972) - Bielefeld-Eckardsheim (Renner leg. 1975, CRB) - Schloß Holte-Stukenbrock (Renner leg. 1976, CRB) - Gütersloh: Barrelpöule/Brockhagen (Grundmann leg. 1980, CGL) - Senne: Moosheide (Grundmann leg. 1981, CGL) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1983, CTM) - Münster: Handorf (Terlutter leg. 1986, CTM) - Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Münster: Rieselfelder Münster (Terlutter leg. 1987, CTM) - Vreden: NSG Ellewicker Feld (Terlutter leg. 1988, CTM) - Bokel/Ems (1989/91, WASNER i.l.).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1929, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1957/58/59, CJB) - Holzhausen (Jankowski leg. 1961/67, CJB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/90/96, CRB) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1996, CRB).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1956/66/81/82, CJB) - Klein Möllenbeck (Jankowski leg. 1962, CJB) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/92, CWB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Siegen (Suffrian leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Benrath (Eigen leg., MKB) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1957/62/64/66, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1957, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1968, MKB) - Westhofen (Drees leg. 1980/87, CDH) - Schmallenberg: Aberg (Grundmann leg. 1984, CGL) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1985, WENZEL 1989) - Hückeswagen (Wenzel leg. 1986/88, CWR) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1990, CGL) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1991/92, WENZEL 1997) - Wuppertal (KOLBE 1994, 1996) - Witten (Drees leg. 1995, CDH).

Atheta ebenina (Muls.Rey, 1874)

23-.188-.171-.

D.: weit zerstreute Funde.

Westf.: sehr wenige Funde aus SBL.

SBL: Attendorn: Repetal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Attendorn: Borghausen (Grundmann leg. 1991, CGL) - Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL).

Atheta contristata (Kr., 1856)

23-188-172-

D.: weit zerstreute Funde.

Westf.: nur ein sehr alter Fund.

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968).

Atheta heymesii Hubth., 1913)

23-188-173-

D.: außer im Norden fast in allen Regionen.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Essen (Hozman leg. 1971, CHE).

UWB: Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983/87/88/89/98/99, CRB).

OWB: Paderborn-Wewer (Renner leg. 1981, CRB, RENNER & GRUNDMANN 1984, RENNER 1985) - Lichtenau: Geimer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91/92, CWB).

SBL: Erkrath (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Hückeswagen (Eigen leg., KOCH 1968) - Hagen (Drees leg. 1980/90/94/97, CDH) - Finnentrop-Rönkhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid (Hellweg leg. 1988, CHF) - Plettenberg-Selscheid (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Herscheid: Hüinghausen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Neuenrade: Borke (Grundmann leg. 1990, CGL) - Plettenberg: Eiringhausen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Werdohl: Neuenrade (Erbeling leg. 1990, CERL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Finnentrop: Ostentrop (Grundmann leg. 1991, CGL) - Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1999, CWR).

Atheta aquatilis (Thoms., 1867)

23-188-175-

D.: fast aus allen Teilgebieten gemeldet.

Westf.: im Bergland.

UWB: Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1987, CRB) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).

OWB: Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990, CWB).

SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884, WESTHOFF 1886) - Schmalleberg: Härdler (Terlutter leg. 1983, CTM) - Radevormwald (Wenzel leg. 1984/86, WENZEL 1989, KOCH 1992) - Finnentrop (Hellweg leg. 1987, CHF) - Olpe: Reichshof (Gerhard leg. 1987, CGR) - Finnentrop-Wildewiese (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Becke (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Oester-Talsperre (Grundmann leg. 1988, CGL) - Lennetal: Latrop (Terlutter leg. 1988, CTM) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Schmalleberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1988, CGL) - Sundern-Allendorf (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Waldbröl (Gerhard leg. 1989, CGR) - Fredeburg: NSG Hunau (Terlutter leg. 1990, CTM) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1990, CGL) -

Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1991, WENZEL 1997) - Neuenrade: Altenaffeln (Grundmann leg. 1991, CGL) - Plettenberg: Almecke (Grundmann leg. 1991, CGL) - Altenhudem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Hagen (Drees leg. 1992, CDH) - Siegen: Friesenhagen (WAGNER 1992) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Radevormwald (Wenzel leg. 1994, CWR).

Atheta incognita (Shp., 1869)

23-188-176-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: weit verbreitet, aber aus DGN noch nicht gemeldet.

WTL: Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1987, CRB, RENNER 1987) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1993, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993/94/95/96/98/99/2000, CRB).

UWB: Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Grundmann leg. 1981, CGL) - Leopoldshöhe (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1987/98/99/2000, CRB) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.) - Detmold: Lippischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Scherfede: Hardehausen (Grundmann leg. 1989, CGL) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1992, CWB) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB).

SBL: Solingen (Modrow leg. 1963, KOCH 1974, MKB) - Leuscheid/Sieg, Appel leg. 1969, KOCH 1974) - Hagen (Drees leg. 1982, CDH) - Schmallenberg: Härdler (Terlutter leg. 1983, CTM) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/87/88, CGL) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1986, WENZEL 1989, KOCH 1992) - Altena-Brachtenbeck (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop-Rönkhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Meinerzhagen: Fürwigge-Talsperre (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988/90/91, CGL) - Sundern-Allendorf (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Fredeburg: NSG Hunau (Terlutter leg. 1990, CTM) - Neheim-Hüsten: Herdringen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Wipperfürth (Wenzel leg. 1991, CWR) - Wuppertal (KOLBE 1992, 1994, 1996) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Schmallenberg: Altenilpe (Grundmann leg. 1994, CGL).

Atheta aquatica (Thoms., 1952)

23-188-177-

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: nicht häufig, aus DGN nicht gemeldet.

WTL: Oelde (Dahms leg. 1926, DAHMS 1928) - Essen: Frintrop (Hozman leg. 1970, CHE) - Dortmund (Hellweg leg. 1987, CHF) - Münster (Feldmann leg. 1990, CFM).

UWB: Osnabrück (Kache leg. 1992/93, KACHE 1998).

OWB: Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1994, FELDMANN & LÜCKMANN 1998).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Gruiten (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Ennepetal (Drees leg. 1980, CDH) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1984, WENZEL 1989) - Hückeswagen (Wenzel leg. 1988, CWR) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Hagen: Hengsteysee (Drees leg. 1990, CDH) - Hallenberg (Feldmann leg. 1990, CFM) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel leg. 1998, CWR).

Atheta aeneicollis (Shp., 1869)

23-.188-.178-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: recht häufig, aber aus DGN noch nicht gemeldet.

WTL: Oelde (Dahms leg. 1935, LMM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993/94/96/97/99, CRB) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1996, CRB).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1976, CJB) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1987/88/94, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1992/93/94, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1996/98/99/2000, CRB).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1966, CJB) - Neuenbeken (Braun leg. 1982, CBP) - Paderborn (Braun leg. 1982, CBP) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990, CWB) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884, WESTHOFF 1886) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1955/63, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1957/64, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Geresheim (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1963, MKB) - Ratingen (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Wuppertal (KOLBE 1973, 1978) - Sundern-Langscheid (Grundmann leg. 1988, CGL) - Schmalenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1990, CGL) - Hagen (Drees leg. 1992/93, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992, CWR, WENZEL 1994) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel, Lappann leg. 1998, CWR).

Atheta laticollis (Steph., 1832)

23-.188-.179-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Lübbecke: Fiestel (Renner leg. 1978, CRB) - Hartum (Jankowski leg. 1979, CJB) - Dümmer: Hüde (Renner leg. 1983, CRB) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 1998, CTM).

WTL: Oelde (Dahms leg. 1929, LMM) - Essen (Hozman leg. 1970, CHE) - Bochum (Hozman leg. 1972, CHE) - Wiedenbrück (Rehage leg., CRD, REHAGE 1972) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1977/78, CRB, REN-

- NER 1980) - Gütersloh: Barrelpäule/Brockhagen (Grundmann leg. 1980, CGL) - Herzebrock: Clarholz (Terlutter leg. 1980, CTM) - Salzkotten (Renner leg. 1982, CRB) - Senne: Stapelage (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Vreden: NSG Ellewicker Feld (Terlutter leg. 1987, CTM) - Bokel/Ems (1989, WASNER i.l.) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1989/92/93/95/97/99, CRB) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Münster: Davert (Röwekamp leg. 1992, CRE) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1993, CRB).
- UWB: Mennighüffen (BARNER 1922, PEETZ 1931) - Preuß. Oldendorf (Petz leg. 1935, LMM) - Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1975/76/77, CRB, RENNER 1981b) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Grundmann leg. 1982, CGL) - Lage: Altholzhausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983/84/87/89, CRB) - Kalletal/Lippe (Grundmann leg. 1988, CGL) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Bünde: Hücker Moor (Renner leg. 1992, CRB) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1998/99/2000, CRB) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 2000, CRB).
- OWB: Brakel: Hamburg/Riesel (Renner leg. 1982, CRB) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982, CRB, RENNER 1985) - Warburg: Hellberg/Scherfede (Renner leg. 1983, CRB) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990, CWB, SMB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).
- SBL: Arnsberg (Varendorff leg., WESTHOFF 1881) - Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, 1886, CORNELIUS 1884) - Witten (FÜGNER 1902) - Overath (Schneider leg. 1925, MKB) - Solingen (Modrow leg. 1961, MKB) - Hönnetal (REHAGE & FELDMANN 1977) - Wuppertal (Pospischil leg. 1977, POSPISCHIL 1981) - Hagen (Drees leg. 1981, CDH) - Hohenlimburg (Drees leg. 1982, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1984/85/86, WENZEL 1989) - Solingen (KOLBE 1984a, 1984c, 1992) - Hückeswagen (Wenzel leg. 1985, CWR) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Meinerzhagen: Fürwigge-Talsperre (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Ennepetal (Drees leg. 1989, CDH) - Herscheid: Voßhelle (Grundmann leg. 1990, CGL) - Wiblingwerde (Drees leg. 1990, CDH) - Finnentrop (Grundmann leg. 1991, CGL) - Neuenrade: Altenaffeln (Grundmann leg. 1991, CGL) - Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Lappann, Wenzel leg. 1998/99, CWR) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Lappann, Wenzel leg. 1998, CWR).

Atheta fimorum (Bris., 1860)

23-188-180-.

D.: nur in wenigen Gebieten.

Westf.: zwei alte Meldungen.

WTL: Oelde (DAHMS 1928).

SBL: Hückeswagen (Eigen leg., KOCH 1968).

Atheta coriaria (Kr., 1856)

23-.188-.181-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1978, CRB, RENNER 1980) - Oerlinghausen: Senne (Grundmann leg. 1982, CGL) - Salzkotten (Renner leg. 1984, CRB) - Telgte: Westbevern (Terlutter leg. 1986, CTM) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1990/94, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993/94/95/96/97/98/99, CRB) - Münster: Sprakel (Feldmann leg. 1995, CFM) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1996, CRB).

UWB: Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1976/77/78, CRB, RENNER 1981b) - Bad Salzuflen (Renner leg. 1978, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983/84/87/88/89/98/2000, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1993, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982, CRB, RENNER 1985) - Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1983, CRB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilden (Koch leg. 1957, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1958/61/63, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1964, MKB) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Lüderich/Sülz (Appel leg. 1971, MKB) - Wuppertal (Pospischil leg. 1977, POSPISCHIL 1981) - Wissen/Sieg: Roth (Stock leg. 1979, CSR) - Hagen (Drees leg. 1986/87/92/95, CDH) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1987, WENZEL 1989) - Solingen (KOLBE 1987, 1992) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Iserlohn: Hemer (Renner leg. 1988, CRB) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Lahmer Bachtal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1990, CGL) - Neheim-Hüsten: Herdringen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Radevormwald (Wenzel leg. 1994, CWR) - Schmallenberg: Altenilpe (Grundmann leg. 1994, CGL) - Menden: Hönnetal (Feldmann leg. 1995, CFM) - Wuppertal (KOLBE 1996).

Atheta intermedia (Thoms., 1852)

23-.188-.182-.

D.: nur im Süden nicht gefunden

Westf.: nicht häufig, aus DGN nicht gemeldet.

WTL: Oelde (DAHMS 1928).

UWB: Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983, CRB, RENNER et al. 1986; Renner leg. 1987, CRB).

OWB: Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1982, CRB) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982, CRB, RENNER 1985).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Erkrath (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Solingen (Gräf leg. 1975, KOCH 1992) - Attendorn-Echternhagen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid (Hellweg leg. 1988, CHF) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL).
 Burscheid (Kolbe leg. 1986, KOLBE & BRUNS 1988, KOCH 1992): Fehldetermination (KÖHLER 1997) .

Atheta ravilla (Er., 1839)

23-188-183-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Holzhausen (Peetz leg. 1936, LMM) - Lübbecke: Fiestel (Renner leg. 1978, CRB) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Feldmann leg. 1992, CFM).

WTL: Bochum (Hozman leg. 1972, CHE) - Dülmen (Hozman leg. 1974, CHE) - Gütersloh: Verl (Renner leg. 1975/79, CRB) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1976/77/78, CRB, RENNER 1980) - Dortmund (Hellweg leg. 1986, CHF) - Münster: Davert (Terlutter leg. 1990, CTM) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Münster: Nienberge (Feldmann leg. 1992, CFM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1991/92/95, CRB).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1936, LMM) - Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1975/77/78, CRB, RENNER 1981a, b) - Barkhausen (Jankowski leg. 1976, CJB) - Lage (Grundmann leg. 1981, CGL) - Leopoldshöhe (Grundmann leg. 1981/82, CGL) - Bad Salzuflen: Bexter Wald (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Brönninghausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Herford: Elverdissen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/98, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1992/93/94, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1979, CJB) - Lage: Hardisser Moor (Renner leg. 1980, CRB, RENNER 1981a) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982, CRB, RENNER 1985) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990, CWB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1956/63, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1960/63, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1961/62/64, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1961/64, KOCH i.l.) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1963, KOCH i.l., Gräf leg. 1986, MKB) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Schwerte: Geisecke (Rehage leg. 1971, CRD) - Engelskirchen (Appel leg. 1973, MKB) - Hönnetal (REHAGE & FELDMANN 1977) - Hagen (Drees leg. 1981/91, CDH) - Hohenlimburg (Drees leg. 1981, CDH) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1982, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1984/88/89, WENZEL 1989) - Wuppertal (KOLBE 1984a, 1996) - Solingen (KOLBE 1987, 1992) - Schmalleben (Grundmann leg. 1989,

CGL) - Wetter/Ruhr (Drees leg. 1989, CDH) - Herscheid: Hüinghausen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Marienheide/Gimborn (Wenzel leg. 1990, CWR) - Neuenrade: Borke (Grundmann leg. 1990, CGL) - Plettenberg (Erbeling leg. 1990, CErL) - Werdohl: Neuenrade (Erbeling leg. 1990, CErL) - Halver/Ennepe (Drees leg. 1991, CDH) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1991, CGL) - Sundern: Röhrenspring (Grundmann leg. 1991, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992/93, CWR, WENZEL 1994).

Atheta procera (Kr., 1856)

23-.188-.184-.

D.: nur aus wenigen Teilgebieten gemeldet.

Westf.: nur wenige Funde.

WTL: Oelde (Dahms leg. 1924, DAHMS 1928).

SBL: Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Hilchenbach (Grundmann leg. 1983/86, CGL) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/87/88, CGL) - Attendorn: Repetal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988/91, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992).

Atheta basicornis (Muls.Rey, 1852)

23-.188-.185-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in fast allen Teilgebieten, aber selten.

DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1956, CJB).

WTL: Ostfenelde (Dahms leg. 1929, LMM) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1986, CTM) - Ahaus: NSG Graeser Venn (Terlutter leg. 1996, CTM).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1956, CJB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1990, CRB).

SBL: Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1959/63/66, KOCH i.l.) - Hagen: Bathey (Drees leg. 1992, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992, CWR).

Atheta myrmecobia (Kr., 1856)

23-.188-.186-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, aus DGN noch nicht gemeldet.

WTL: Ahaus: Bröke (Terlutter leg. 1989, CTM) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1990, CRB) - Münster: Davert (Terlutter leg. 1990, CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993/94/98/2000, CRB) - Münster: Hiltrup (Feldmann leg. 1998, CFM).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935/36, LMM) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1987, CRB) - Detmold: Lippischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Lichtenau: Altenau-Tal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Willebadessen (Renner leg. 1989, CRB) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB).

SBL: Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Hösel (Koch leg. 1958, KOCH i.l.) - Solingen (Modrow leg. 1965, KOCH 1974, MKB) - Wuppertal (Thiele leg., KOCH 1968, MKB) - Engelskirchen (Appel leg. 1976, MKB) - Wuppertal (KOLBE 1978) - Solingen (KOLBE 1981, 1992) - Schmallenberg (Grundmann leg. 1985, CGL) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1987, CGL) - Finnentrop-Wildewiese (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Selscheid (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988/90, CGL) - Sundern-Allendorf (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Lahmer Bachtal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Attendorn-Ebbelingen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Hohenlimburg (Drees leg. 1992, CDH) - Siegen: Friesenhagen (WAGNER 1992) - Hagen (Drees leg. 1994, CDH) - Olpe: Reichshof (Gerhard leg. 1995, CGR) - Breckerfeld (Drees leg. 1996, CDH) - Hagen (Drees leg. 1999, CDH).

Atheta nidicola (Joh., 1914) 23-.188-.187-
D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: nur drei Funde aus SBL.

SBL: Solingen (Modrow leg., KOCH 1968) - Ratingen (Koch leg. 1967, KOCH 1992) - Hagen (Drees leg. 1990, CDH, DREES 1996).

Atheta oblita (Er., 1839) 23-.188-.188-
D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 1998, CTM)

WTL: Sünninghausen (Dahms leg. 1930, LMM) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1978, CRB, RENNER 1980) - Vreden (Terlutter leg. 1985, CTM) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1993, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1999, CRB).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1976, CJB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995) - Osnabrück (Klaas leg. 1992, KACHE i.l., Kache leg. 1992, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.).

OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1975, CJB) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1982, CRB) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982, CRB, RENNER 1985).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Witten (FÜGNER 1902) - Breitscheid (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986, CGL) - Finnentrop-Wildewiese (Grundmann leg. 1988, CGL) - Hagen (Drees leg. 1988/91/92, CDH) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN

& ERBELING 1992) - Neheim-Hüsten: Herdringen (Grundmann leg. 1990, CGL).

Atheta boletophila (Thoms., 1856) 23-.188-.190-.

D.: im Norden und Osten, sonst zerstreut.

Westf.: nur ein Fund aus WTL.

WTL: Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1999, CRB, RENNER 1999).

Atheta autumnalis (Er., 1839) 23-.188-.191-.

D.: im Süden und Westen, sonst zerstreut.

Westf.: sehr wenige Funde.

WTL: Ahaus: Schöppingen (Terlutter leg. 1995, CTM).

SBL: Overath (Rüschkamp leg., KOCH 1968) - Plettenberg (Erbeling leg. 1988, CErL).

Atheta strandiella Brundin, 1954 23-.188-.195-.

D.: hauptsächlich im Norden.

Westf.: nur ein Fund aus DGN.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983, RENNER et al. 1986): Fehlbestimmung.

Atheta pilicornis (Thoms., 1852) 23-.188-.196-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, aus DGN noch nicht gemeldet.

WTL: Rheda (Dahms leg. 1930/33, LMM) - Essen (Hozman leg. 1971, CHE) - Wiedenbrück (Rehage leg., CRD, REHAGE 1972) - Lünen: Cappenberger Wald (Terlutter leg. 1984, CTM) - Münster: Wolbeck (Köhler, Renner leg. 1991, CKB, CRB)

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935/36, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1975/76, CJB).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1975, CJB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Solingen (Modrow leg. 1957/60, KOCH 1968, 1974, MKB) - Breitscheid (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Hagen (Drees leg. 1981, CDH) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/87/88, CGL) - Sundern-Allendorf (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Meinerzhagen: Fürwigge-Talsperre (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Herscheid: Voßhelle (Grundmann leg. 1990, CGL) - Wuppertal (Kolbe leg. 1990, MKB, KÖHLER 1993, KOLBE 1992, 1994, 1996) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992/93, CWR, WENZEL 1994).

Atheta fungicola (Thoms., 1852)

23-188-197-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Hartum (Jankowski leg. 1975, CJB).

WTL: Lippstadt (WESTHOFF 1881) - Münster (WESTHOFF 1881) - Saerbeck/Ems (Peetz leg. 1936, PEETZ 1937, LMM).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1948/51/58/60, CJB) - Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1977, CRB, RENNER 1981b).

OWB: Marsberg: Dahlberg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Warburg: Weldaer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990, CWB).

SBL: Elberfeld (Rossi leg., LMM) - Arnsberg (WESTHOFF 1881) - Hilchenbach (WESTHOFF 1881) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Elberfeld (Cornelius leg., KOCH 1968) - Hohenlimburg (Drees leg. 1982, CDH) - Schmalleberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1991, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL).

Atheta britanniae Bernh. Scheerp., 1926

23-188-198-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

Besonders mycetophile Art (BENICK 1952).

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Grundmann leg. 1992, CGL).

WTL: Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1977/78, CRB, RENNER 1980) - Lünen: Cappenberger Wald (Terlutter leg. 1984, CTM) - Münster: Lövelingloh (Terlutter leg. 1986, CTM) - Münster: Wolbeck (Köhler, Renner leg. 1991, CKB, CRB).

UWB: Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1977, CRB, RENNER 1981a, b) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Bad Salzuflen: Bexter Wald (Grundmann leg. 1981, CGL) - Herford: Elverdissen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1985, CRB) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).

OWB: Paderborn-Wewer (Renner leg. 1981, CRB, RENNER 1985) - Beverungen (Figura leg. 1990, ASSING i.l.) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990, CWB) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Hilden (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Leuscheid/Sieg, Appel leg. 1964, KOCH 1974) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Solingen (Modrow leg., KOCH 1968) - Hagen (Drees leg. 1981/82, CDH) - Schmalleberg: Latrop-Tal (Grundmann leg. 1984, CGL) - Plettenberg (Hellweg leg. 1985, CHF) - Schmalleberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/87/88, CGL) - Alte-

na-Brachtenbeck (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Selscheid (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Altena: Lahmer Bachtal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Finnentrop: Ostentrop (Grundmann leg. 1991, CGL) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1991, CGL) - Sundern: Röhrenspring (Grundmann leg. 1991, CGL) - Witten (Drees leg. 1991, CDH) - Altenhudem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1993, CWR) - Wuppertal (KOLBE 1994) - Waldbröl (Köhler leg. 1996, CKB) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1999, CWR).

Atheta crassicornis (F., 1792) 23-.188-.199-.
 D.: in ganz Deutschland.
 Westf.: in allen allen fünf Teilgebieten, häufig.
 Besonders mycetophile Art (BENICK 1952).

Atheta paracrassicornis Brundin, 1954 23-.188-.200-.
 D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: im Bergland nicht sehr selten.
 WTL: Dortmund (Hellweg leg. 1986/87, CHF) - Dortmund: Dellwig (Platzek leg. 1990, CHE).
 OWB: Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).
 SBL: Solingen (Gräf leg. 1975, KOCH 1992) - Hagen (Drees leg. 1981/92/93, CDH; Hellweg leg. 1987, CHF) - Hilchenbach (Grundmann leg. 1984, CGL, RENNER et al. 1986) - Hilchenbach (Grundmann leg. 1984/85/86, CGL) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/87/88, CGL) - Herscheid: Oester-Talsperre (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988/91, CGL) - Sundern-Allendorf (Grundmann leg. 1988, CGL) - Langscheid/Sorpesee (Grundmann leg. 1989, CGL) - Olpe: Eckenhagen (Gerhard leg. 1989, KÖHLER i.l.) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1991, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Sundern: Röhrenspring (Grundmann leg. 1991, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1993/94, CWR, WENZEL 1994) - Waldbröl (Köhler leg. 1996, CKB) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Lappann leg. 1998, CWR).

Atheta macrocera (Thoms., 1856) 23-.188-.202-.
 D.: fast aus allen Teilgebieten gemeldet.

Westf.: nur wenige Funde.
 DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).
 SBL: Solingen (Modrow leg., KOCH 1968) - Hilden (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Allendorf (Hellweg leg. 1986, CHF) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1990, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL).

Atheta puncticollis Benick, 1938

23-.188-.203-.

D.: Norddeutschland, Bayern.

Westf.: keine Meldung.

Atheta cauta (Er., 1837)

23-.188-.204-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Oelde (Dahms leg. 1923, LMM) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1991/93, CRB) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1992, CRE) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1996, CRB).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1936, LMM) - Bad Salzuflen (Grundmann leg. 1980, CGL) - Bielefeld: Jöllenbeck (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1987/88/94/99/2000, CRB).

OWB: Klein Möllenbeck (Jankowski leg. o.J., CJB) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1968, CJB) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982, CRB, RENNER 1985) - Minden: Vennebeck (Renner leg. 1983, CRB) - Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1989, CRB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Breitscheid (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1962/64, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1963/67, KOCH i.l.) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Solingen (KOLBE 1984a, 1992) - Finnentrop-Rönkhäusen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988/91, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Sundern-Allendorf (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Neuenrade: Altenaffeln (Grundmann leg. 1990, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Lennestadt (Feldmann leg. 1991, CFM) - Sundern: Röhrensprung (Grundmann leg. 1991, CGL) - Ennepetal (Drees leg. 1992, CDH) - Hagen (Drees leg. 1993, CDH).

Atheta ischnocera (Thoms., 1870)

23-.188-.205-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) - Dümmer: Hüde (Renner leg. 1983, CRB).

WTL: Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB, RENNER et al. 1986) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1988/89/93/94/95, CRB) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1990/94, CRB) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1995, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1996/97/99/2000, CRB).

UWB: Porta Westf. (Jankowski leg. 1946, CJB) - Bad Salzuflen: Bexter Wald (Grundmann leg. 1980, CGL) - Bad Salzuflen (Grundmann leg. 1980, CGL, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982/83, CRB, RENNER et al. 1986) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983/84/87/99, CRB).

- OWB: Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1982, CRB) - Minden: Vennebeck (Renner leg. 1983, CRB).
- SBL: Wissen/Sieg: Roth (Stock leg. 1976, CSR) - Hagen (Drees leg. 1981, CDH) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1986, WENZEL 1989) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986, CGL) - Finnentrop-Wildewiese (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Solingen (KOLBE 1992).

Atheta setigera (Shp., 1869)

23-.188-.206-.

D.: fast aus allen Teilgebieten gemeldet.

Westf.: hauptsächlich im Bergland.

- WTL: Paderborn: Südsenne (Renner leg. 2000, CRB).
- UWB: Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Detmold: Berlebeck (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983/88/2000, CRB, RENNER 1991) - Detmold: Lippischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).
- SBL: Wissen/Sieg: Roth (Stock leg. 1976, CSR) - Solingen (KOLBE 1984a, 1992, KOCH 1992) - Attendorn-Windhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Oester-Talsperre (Grundmann leg. 1988, CGL) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1990, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL).

Atheta laevana (Muls.Rey, 1852)

23-.188-.207-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, aber nicht aus allen Teilgebieten gemeldet.

- WTL: Vellern (Dahms leg. 1929, LMM) - Münster: Rieselfelder Münster (Terlutter leg. 1987, CTM) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1990, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993/95/96/98, CRB) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1996, CRB).
- UWB: Detmold: Berlebeck (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983/85, CRB) - Detmold: Lippischer Wald (Renner leg. 2000, CRB) - Scherfede: Hardehausen (Grundmann leg. 1989, CGL).
- SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Solingen (Modrow leg. 1953, KOCH 1968, KÖHLER 1993, MKB; Gräf leg. 1975, KOCH 1992) - Hösel (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Finnentrop (Hellweg leg. 1987, CHF) - Radevormwald (Wenzel leg. 1987/88/89, WENZEL 1989) - Attendorn-Windhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop-Rönkhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop-Wildewiese (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-

Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Meinerzhagen: Fürwigge-Talsperre (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Schmallerberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1988, CGL) - Sundern-Allendorf (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Hagen (Drees leg. 1993, CDH).

Atheta nigripes (Thoms., 1856)

23-188-208-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Hartum (Jankowski leg. 1969, CJB) - Dümmer: Hüde (Renner leg. 1983, CRB) - Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Feldmann leg. 1998, CFM)

WTL: Herzebrock: Clarholz (Terlutter leg. 1980, CTM) - Vreden: NSG Ellewicker Feld (Terlutter leg. 1984, CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1994/97, CRB).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1946/50, CJB) - Bielefeld: Niederdornberg (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983/85/87/88/89/94/98/99, CRB) -

OWB: Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1980, CRB) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1981, CRB, RENNER 1985) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1983, CRB) - Minden: Vennebeck (Renner leg. 1983, CRB).

SBL: Erkrath (Koch leg. 1959/64/65, KOCH i.l.) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1962, KOCH i.l.) - Mettmann: Schöller (Koch leg. 1962, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1963/64, KOCH i.l.) - Gruiten (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1959/61/63, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Wissen/Sieg: Roth (Stock leg. 1976, CSR) - Hagen (Drees leg. 1981/82, CDH) - Arolsen: Landau (Renner leg. 1986, CRB) - Olpe: Reichshof (Gerhard leg. 1987, CGR) - Schmallerberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1987/88, CGL) - Solingen (KOLBE 1987, 1992) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Oester-Talsperre (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Lahmer Bachtal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1990, CGL) - Neheim-Hüsten: Herdringen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Wiblingwerde (Drees leg. 1990, CDH) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Westerwald: Altenkirchen (WAGNER 1992) - Hönnetal: Volkringhausen (Terlutter leg. 1995, CTM).

Atheta subrugosa (Kiesw., 1848)

23-188-209-.

D.: Süden und Mitte, nördlichere Meldungen fraglich.

Westf.: nur eine vermutlich unrichtige Meldung.
WTL: Oelde (DAHMS 1928): wohl Fehlbestimmung.

Atheta atramentaria (Gyll., 1810)

23-188-210-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: weit verbreitet, häufig.

DGN: Hiller Moor (Grundmann leg. 1981, CGL) - Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991).

WTL: Essen: Frintrop (Hozman leg. 1970, CHE) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1978, CRB, RENNER 1980) - Salzkotten: Sültsoid (Wasner leg. 1982, WASNER i.l.) - Vreden: NSG Ellewicker Feld (Terlutter leg. 1983, CTM) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1983, CTM) - Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Münster: Rieselfelder Münster (Terlutter leg. 1987, CTM) - Lüdinghausen: Olfen (Terlutter leg. 1992, CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1992/98/2000, CRB) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1993/94, CRB) - Ahaus: NSG Graeser Venn (Terlutter leg. 1996, CTM).

UWB: Holzhausen (Jankowski leg. 1974, CJB) - Barkhausen (Jankowski leg. 1980, CJB) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Leopoldshöhe (Grundmann leg. 1980, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983/84/85/87/88/98/99, CRB) - Kalletal/Lippe (Grundmann leg. 1988, CGL).

OWB: Lage: Hardisser Moor (Renner leg. 1980, CRB) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1982/83, CRB) - Lichtenau: Geimer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Ratingen (Koch leg. 1957/63, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1958, KOCH i.l.) - Breitscheid (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1959/64, KOCH i.l.) - Gruiten (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1962/66, KOCH i.l.) - Hagen (Drees leg. 1981/91, CDH) - Solingen (KOLBE 1981, 1984a, 1984c, 1987, 1992) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1986, WENZEL 1989) - Schmallerberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1987/88, CGL) - Altena-Brachtenbeck (Grundmann leg. 1988, CGL) - Attendorn: Repetal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Attendorn-Windhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop-Rönkhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop-Wildewiese (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Oester-Talsperre (Grundmann leg. 1988, CGL) - Meinerzhagen: Fürwigge-Talsperre (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988/90, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Plettenberg: Eiringhausen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Neheim-Hüsten: Herdringen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Plettenberg (Erbeling leg. 1991, CERL) - Sundern: Röhrensprung (Grundmann leg. 1991, CGL).

Atheta marcida (Er., 1837)

23-.188-.211-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: weit verbreitet, häufig.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Oelde (Dahms leg. 1924/34/35, LMM) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1977/78, CRB, RENNER 1980) - Münster: Wolbecker Tiergarten (Terlutter leg. 1983, CTM) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1991, CRE) - Münster: Sprakel (Feldmann leg. 1992, CFM) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1993/94, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1998, CRB)

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935, LMM) - Bielefeld (SPÄH 1980) - Halle: Jakobsberg (Rehage leg. 1980, CRD, REHAGE & RENNER 1981) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Grundmann leg. 1981, CGL) - Lage (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Brönninghausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Herford: Elverdissen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983/84/86, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1992/93/94, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).

OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Nammener Wald (Janowski leg. 1979, CJB) - Paderborn-Wewer (Renner leg. 1981/82, CRB, RENNER 1985) - Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1981/82, CRB) - Diemeltal: Lamerden (Renner leg. 1982, CRB) - Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1982, CRB) - Eggegebirge: Schwaney (Terlutter leg. 1985, CTM) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91/93, CWB, SMB) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1956, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1964, MKB) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Engelskirchen (Appel leg. 1978, MKB) - Hagen (Drees leg. 1981/88/90, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1983/84, WENZEL 1989) - Schmalleben: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/87/88, CGL) - Meinerzhagen: Fürwigge-Talsperre (Grundmann leg. 1988, CGL) - Solingen (KOLBE 1988, 1992) - Hohenlimburg (Drees leg. 1989, CDH) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Sundern: Allendorf (Grundmann leg. 1989, CGL) - Marienheide/Gimborn (Wenzel leg. 1990, CWR) - Neheim-Hüsten: Herdringen (Grundmann leg. 1991, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1991/92/93/94, CWR, WENZEL 1994) - Westerwald: Altenkirchen (WAGNER 1992) - Wissen/Sieg: Gebhardshain (WAGNER 1992) - Schmalleben: Altenilpe (Grundmann leg. 1994, CGL) - Menden: Hönnetal (Feldmann, Terlutter leg. 1995, CFM, CTM) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Lappann leg. 1997, CWR).

Atheta leonhardi Bernh., 1911

23-.188-.212-.

D.: zerstreut im Süden, Westen, Norden.

Westf.: keine Meldung.

Atheta putrida (Kr., 1856)

23-.188-.213-.

D.: im Süden und Westen, sonst zerstreut.

Westf.: weit verbreitet.

DGN: Hartum (Jankowski leg. 1974/75/78/79, CJB).

WTL: Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1995, CRB).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1954/76, CJB) - Bielefeld (Renner leg. 1977, CRB, RENNER 1981a) - Halle: Jakobsberg (Rehage leg. 1980, CRD, REHAGE & RENNER 1981) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983/84/86/89, CRB) - Osnabrück (Klaas leg. 1992, KACHE i.l., Kache leg. 1992/93/94, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).

OWB: Scherfede: Hardehausen (Grundmann leg. 1989, CGL) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Hösel (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Hagen (Drees leg. 1981/87/90, CDH) - Solingen (KOLBE 1981, 1992, KOCH 1992) - Hilchenbach (Grundmann leg. 1983/85/86, CGL) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1984, WENZEL 1989) - Hückeswagen (Wenzel leg. 1985, CWR) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/87/88, CGL) - Solingen (Gräf leg. 1986, MKB) - Hohenlimburg (Hellweg leg. 1987, CHF, Drees leg. 1994, CDH) - Westhofen (Hellweg leg. 1987, CHF, Drees leg. 1994, CDH) - Iserlohn: Hemer (Renner leg. 1988, CRB) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Plettenberg: Eiringhausen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Neheim-Hüsten: Herdringen (Grundmann leg. 1991, CGL) - Sundern: Röhrensprung (Grundmann leg. 1991, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1993, CWR, WENZEL 1994) - Wuppertal (KOLBE 1994, 1996).

Atheta europaea Lik., 1984

23-.188-.214-.

D.: im Süden und Westen, sonst zerstreut.

Westf.: hauptsächlich im Bergland.

WTL: Klarholz (Dahms leg. 1930, LMM).

OWB: Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990, CWB).

SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Schmallenberg: Härdler (Terlutter leg. 1982, CTM) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/88, CGL) - Hohenlimburg (Hellweg leg. 1987, CHF) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Schmallenberg: Altenilpe (Grundmann leg. 1994, CGL).

Atheta cinnamoptera (Thoms., 1856)

23-.188-.215-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: weit verbreitet, aus DGN nicht gemeldet.

- WTL: Münster: Davert (Terlutter leg. 1990, CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993/99, CRB, RENNER 1998).
- UWB: Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1977, CRB, RENNER 1981a, b) - Bielefeld: Niederdornberg (Grundmann leg. 1981, CGL) - Detmold: Berlebeck (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983/99, CRB) - Kalletal/Lippe (Grundmann leg. 1988, CGL).
- OWB: Lichtenau: Altenau-Tal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Scherfede: Hardehausen (Grundmann leg. 1989, CGL) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).
- SBL: Hilden (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Hückeswagen (Eigen leg., KÖHLER 1993, MKB) - Solingen (Modrow leg., KOCH 1968, MKB) - Hönnetal (REHAGE & FELDMANN 1977) - Menden (Hellweg leg. 1987, CHF) - Allendorf (Hellweg leg. 1988, CHF) - Attendorn-Windhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop-Rönkhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop-Wildewiese (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg (Erbeling leg. 1988, CErL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988/90, CGL) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Fredeburg: NSG Hunau (Terlutter leg. 1990, CTM) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Hönnetal: Völkringhausen (Terlutter leg. 1994, CTM) - Hagen (Drees leg. 1995, CDH) - Hagen, Goldberg (Drees leg. 1995, CDH).

Atheta episcopalis Bernh., 1910

23-.188-.217-.

D.: außer im Norden fast in allen Teilgebieten.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Nettelstedter Moor (Peetz leg. 1936, LMM) - Hartum (Jankowski leg. 1973/76, CJB).

WTL: Oelde (Dahms leg. 1933, LMM).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1934/35/36, LMM) - Lage (Grundmann leg. 1981, CGL).

OWB: Diemeltal: Lamerden (Terlutter leg. 1986, CTM).

SBL: Solingen (KOLBE 1984a, 1992, KOCH 1992) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/87/88, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Neheim-Hüsten: Herdringen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Finnentrop: Ostentrop (Grundmann leg. 1991, CGL) - Schmallenberg: Altenilpe (Grundmann leg. 1994, CGL).

Atheta aeneipennis Thoms., 1856

23-.188-.219-.

D.: außer im Norden fast in allen Teilgebieten.

Westf.: zerstreute Funde.

- WTL: Lette, Oelde (DAHMS 1928).
 UWB: Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995) - Osnabrück (Kache leg. 1994, KACHE 1998).
 SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Witten (FÜGNER 1902) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Werdohl: Kettling (Grundmann leg. 1990, CGL).
 Hückeswagen (Eigen leg., KOCH 1968): Fehldetermination (KÖHLER 1993).

Atheta parapicipennis Brundin, 1954 23-.188-.220-.
 D.: Bayern, Niederrhein.
 Westf.: keine Meldung.

Atheta longicornis (Grav., 1802) 23-.188-.223-.
 D.: in ganz Deutschland.
 Westf.: weit verbreitet, häufig.

- DGN: Hiller Moor (Grundmann leg. 1981, CGL) - Lübbecke: Hiller Moor (Renner leg. 1981, CRB) - Petershagen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).
 WTL: Bocholt (WESTHOFF 1881) - Lippstadt (WESTHOFF 1881) - Oelde (Dahms leg. 1932/36, LMM) - Herzebrock: Clarholz (Terlutter leg. 1980, CTM) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1986, CTM) - Vreden: NSG Ellewicker Feld (Terlutter leg. 1987, CTM) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1992, CRE) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993/94/96/98, CRB) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1996, CRB).
 UWB: Mennighüffen (BARNER 1922, PEETZ 1931) - Bielefeld: Hoberge-Uerenstrup (Renner leg. 1975/77/78, CRB, RENNER 1981b) - Bielefeld (SPÄH 1980) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Bielefeld: Niederdornberg (Grundmann leg. 1981, CGL) - Lage (Grundmann leg. 1981, CGL) - Leopoldshöhe (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983/2000, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1994, KACHE 1998) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 2000, CRB) - Detmold: Lippischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).
 OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Höxter: Ziegenberg (Grundmann leg. 1982, CGL) - Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1982, CRB) - Minden: Vennebeck (Renner leg. 1983, CRB) - Bad Lippspringe (Braun leg. 1986, CBP) - Lichtenau: Altenau-Tal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1993, SMB).
 SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Wuppertal (KOLBE 1973) - Radevormwald (Wenzel leg. 1978/83/86/87, WENZEL 1989) - Hagen (Drees leg. 1980/88/89/91, CDH) - Solingen (KOLBE 1984a, 1992) - Attendorn: Repetal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop-Rönkhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann

leg. 1988/90/91, CGL) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Sundern: Röhrensprung (Grundmann leg. 1991, CGL) - Wipperfürth (Wenzel leg. 1991, CWR) - Westerwald: Altenkirchen (WAGNER 1992) - Schmallenberg: Altenilpe (Grundmann leg. 1994, CGL) - Heiligenhaus: Vogel-sangbachtal (Lappann leg. 1998, CWR) - Heiligenhaus: NSG Hofer-mühle (Wenzel leg. 1999, CWR).

Atheta vestita (Grav., 1806)

23-188-226-

D.: an den Meeresküsten.

Westf.: alte Meldungen unrichtig.

Barmen (Stachelhausen leg., GEILENKEUSER 1896): sicher Fehlbestimmung - Hilchenbach (WESTHOFF 1881): sicher Fehlbestimmung - Siegen (Suffrian leg., WESTHOFF 1881): sicher Fehlbestimmung.

Acrotona exigua (Er., 1837)

23-1881.001-

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: aus OWB noch nicht gemeldet.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 1998, CFM) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 1998, CTM).

WTL: Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1985, CRB, RENNER 1987) - Münster: Handorf (Grundmann leg. 1989, CGL) - Ahaus: Wüllen (Grundmann leg. 1990, CGL).

UWB: Preuß. Oldendorf (BARNER 1922) - Preuß. Oldendorf (PEETZ 1931) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Klaas leg. 1992, KACHE i.l.) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.).

SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884, WESTHOFF 1886, KOCH 1968).

Acrotona silvicola (Kr., 1856)

23-1881.002-

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Feldmann leg. 1998, CFM).

WTL: Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993, CRB) - Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Warendorf (Starke leg. 1987/95, CSW) - Bokel/Ems (1989/91, WASNER i.l.).

UWB: Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1982, CRB, RENNER et al. 1986) - Detmold: Berlebeck (Grundmann leg. 1982, CGL) - Herford: Herringhausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983/87/99, CRB, CFM) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).

OWB: Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982, CRB, RENNER 1985) - Bad Lippspringe (Braun leg. 1982, CBP) - Lemgo (Grundmann leg. 1982, CGL) - Paderborn: Benhausen (Braun leg. 1983, CBP).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, 1886, CORNELIUS 1884, GELLENKEUSER 1896).

Acrotona pygmaea (Grav., 1802)

23-.1881.003-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1982, CJB) - Dümmer: Hüde (Renner leg. 1983, CRB) - Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Feldmann, Terlutter leg. 1998, CFM, CTM).

WTL: Oelde (DAHMS 1928) - Ostenfelde (Dahms leg. 1933, LMM) - Saerbeck/Ems (Peetz leg. 1936, PEETZ 1937, LMM) - Oerlinghausen: Senne (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Gronau: NSG Amtsvenn (Feldmann leg. 1989, CFM) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1989, CTM) - Münster: Gimfte (Feldmann leg. 1990, CFM) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1993/95, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1995/97/98/99/2000, CRB).

UWB: Eickum (Barner leg. 1931, LMM) - Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1962, CJB) - Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1975/76, CRB, RENNER 1981b) - Bielefeld: Schildesche (Renner leg. 1982, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/85/87/88/89, CRB) - Minden: Wesertal (Renner leg. 1984, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995) - Osnabrück (Kache leg. 1993/94, KACHE 1998) - Porta Westfalica (Feldmann leg. 1993, CFM) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1994/96/98/99/2000, CRB).

OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Scherfede: Hardehausen (Renner leg. 1996, CRB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Siegtal (Appel leg. 1947, MKB) - Hilden (Koch leg. 1957/61/64, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1957, KOCH i.l.) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1957, MKB) - Breitscheid (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1959/61/64, KOCH i.l.) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1960/62, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1961/63/64/66, KOCH i.l.) - Mettmann: Schöller (Koch leg. 1962/67, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1964/67, KOCH i.l.) - Hagen (Drees leg. 1982/88, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1984/86, WENZEL 1989) - Attendorn: Repetal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop-Rönkhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop-Wildewiese (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988/91, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Sundern-Allendorf (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Wipperfürth (Wenzel leg. 1990, CWR) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Schmalleberg: Altenilpe (Grundmann leg. 1994, CGL) - Witten (Drees leg. 2000, CDH).

Acrotona obfuscata (Grav., 1802)

23-.1881.005-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Recke: Wiechholzer Bach (Terlutter leg. 1996, CTM).

WTL: Ostenfelde (Dahms leg. 1929, LMM) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Münster: Handorf (Terlutter leg. 1986, CTM) - Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Warendorf (Starke leg. 1987/91, CSW) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1989/94/95, CRB) - Münster: Davert (Terlutter leg. 1990, CRE) - Münster: Gimfte (Feldmann leg. 1990, CFM) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1993/96, CRB) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1993/94, CRB) - Emsdetten: NSG Emsdettener Venn (Terlutter leg. 1996, CFM) - Münster: Westbevern (Köhler leg. 1997, CKB, KÖHLER 2000) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1999, CRB).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1975, CJB) - Bad Salzuflen (Grundmann leg. 1980, CGL, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Bad Salzuflen: Bexter Wald (Grundmann leg. 1981, CGL) - Herford: Herringhausen (Grundmann leg. 1980/81, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/85/87/89, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Kache leg. 1992/93/94, KACHE 1998) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1998/99/2000, CRB).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1981, CJB) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982, CRB, RENNER 1985) - Diemeltal: Lamerden (Terlutter leg. 1986, CTM) - Lichtenau: Altenau-Tal (Grundmann leg. 1989, CGL).

SBL: Iilmhausen/Sieg (Appel leg. 1947/57, MKB) - Erkrath (Koch leg. 1958/59, KOCH i.l.) - Breitscheid (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Mettmann: Schöller (Koch leg. 1962/67, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Solingen (Modrow, Gräf leg. 1964, KOCH 1974) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Leuscheid/Sieg (Apel leg., KOCH 1968) - Hagen (Drees leg. 1982/89/90, CDH) - Finnentrop-Rönkhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988/91, CGL) - Neuenrade: Altenaffeln (Grundmann leg. 1990, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Plettenberg: Eiringhausen (Grundmann leg. 1990/91, CGL) - Plettenberg (Erbeling leg. 1990, CERL) - Plettenberg: Pasel (Grundmann leg. 1990, CGL) - Werdohl: Kettling (Grundmann leg. 1990, CGL) - Attendorn: Borghausen (Grundmann leg. 1991, CGL) - Hönnetal (Grundmann leg. 1992, CGL) - Hallenberg: Hesborn (Terlutter leg. 1996, CTM).

Acrotona consanguinea (Epph., 1875)

23-.1881.006-.

D.: Funde weit zerstreut.

Westf.: nicht häufig, aus DGN und OWB nicht gemeldet.

WTL: Bochum (Hozman leg. 1972, CHE).

- UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1978/79, CJB) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).
- SBL: Hönnetal (REHAGE & FELDMANN 1977) - Iserlohn: Hemer (Renner leg. 1988, CRB, RENNER 1991) - Hönnetal (Grundmann leg. 1994, CGL) - Menden: Hönnetal (Feldmann leg. 1994/95, CFM) - Menden: NSG Hönnetal (Röwekamp, Terlutter leg. 1995, CRE, CTM) - Nachrodt/Lenne (Feldmann leg. 1997, CFM).

Acrotona pseudotenera (Cam., 1933) 23-1881.0061.

D.: nur in wenigen Gebieten.

Westf.: erst wenige Funde.

Adventivart.

WTL: Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1998/99, CRB, RENNER 1999).

UWB: Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1998, CRB, RENNER 1999).

SBL: Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel, Lappann leg. 1998, CWR, CRB).

Acrotona parens (Muls.Rey, 1852) 23-1881.008-

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: wenige Funde.

WTL: Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993/94/95/99, CRB, RENNER 1998) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1994, CRB, RENNER 1998) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1996, CRB, RENNER 1998).

UWB: Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).

SBL: Barmen (CORNELIUS 1884, WESTHOFF 1886, KOCH 1968).

Acrotona nigerrima (Aubé, 1850) 23-1881.009-

D.: bisherige Meldungen unrichtig.

Westf.: kein Beleg.

Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968): Fehlbestimmung.

Acrotona muscorum (Bris., 1860) 23-1881.010-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991).

WTL: Bielefeld-Eckardtsheim (Renner leg. 1974, CRB, RENNER 1981a) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1978, CRB, RENNER 1980, 1981a) - Lüdinghausen: Olfen (Terlutter leg. 1992, CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993/96/99, CRB).

UWB: Herford: Herringhausen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Stadt (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Höxter: Ziegenberg (Grundmann leg. 1982, CGL) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982, CRB, RENNER 1985).

SBL: Hagen (Drees leg. 1994, CDH).

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten, häufig.

DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1980, CJB) - Hiller Moor (Grundmann, Renner leg. 1981, CGL, CRB) - Petershagen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991).

WTL: Lippstadt (WESTHOFF 1881) - Münster (WESTHOFF 1881) - Oelde (Dahms leg. 1935, LMM) - Münster (Peetz leg. 1936, PEETZ 1937) - Essen (Hozman leg. 1970, CHE) - Münster: Gremmendorf (Rehage leg. 1972, CRD) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1977/90, CRB) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1978, CRB, RENNER 1980) - Gütersloh: Barrelpäule/Brockhagen (Grundmann leg. 1980, CGL) - Herzebrock: Clarholz (Terlutter leg. 1980, CTM) - Lippstadt: Geseke (Renner leg. 1981, CRB) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Münster: Westbevern (Terlutter leg. 1986, CTM) - Warendorf (Starke leg. 1986/95, CSW) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1989/92/93/94/95/96, CRB) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1992/93/95/96, CRB) - Lüdinghausen: Olfen (Terlutter leg. 1992, CTM) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1993, CTM) - Ahaus: NSG Graeser Venn (Terlutter leg. 1996, CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1998/99/2000, CRB).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935, LMM) - Holzhausen (Jankowski leg. 1956, CJB) - Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1977/78, CRB, RENNER 1981b) - Bad Salzuflen: Bexter Wald (Grundmann leg. 1980, CGL) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Leopoldshöhe (Grundmann leg. 1980, CGL) - Bielefeld: Brönninghausen (Grundmann leg. 1981/82, CGL) - Herford: Herringhausen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Lage (Grundmann leg. 1981, CGL) - Herford: Elverdissen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/87/94, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Kache leg. 1992/94, KACHE 1998) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1998/99/2000, CRB) - Detmold: Lippischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Paderborn (WESTHOFF 1881) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1966, CJB) - Lage: Hardisser Moor (Renner leg. 1980, CRB) - Diemelthal: Lamerden (Renner leg. 1981, CRB) - Paderborn-Wewer (Renner leg. 1981, CRB, RENNER 1985) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1982/83, CRB) - Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1982, CRB) - Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1982, CRB) - Minden: Vennebeck (Renner leg. 1983, CRB) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1992/93, CWB, SMB) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1994, FELDMANN & LÜCKMANN 1998) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Siegen (Suffrian leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Wissen/Sieg: Roth (Stock leg. 1976, CSR) - Hagen (Drees leg. 1981/82, CDH) - Solingen (KOLBE 1981, 1984a, 1984c, 1987, 1988, 1992) - Radevormwald (Wen-

zel leg. 1983/84/86/87/88, WENZEL 1989) - Attendorn: Repetal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop-Rönkhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop-Wildewiese (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988/91, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988/90/91, CGL) - Schmalleberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Neheim-Hüsten: Herdringen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Wiblingwerde (Drees leg. 1990, CDH) - Wipperfürth (Wenzel leg. 1990/91, CWR) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Finnentrop: Ostentrop (Grundmann leg. 1991, CGL) - Plettenberg: Almecke (Grundmann leg. 1991, CGL) - Plettenberg: Pasel (Grundmann leg. 1991, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1991/94, CWR) - Wipperfürth (Wenzel leg. 1991, CWR) - Letmathe (Drees leg. 1993, CDH) - Schmalleberg: Altenilpe (Grundmann leg. 1994, CGL).

Acrotona benicki (Allen, 1940) 23-1881.012-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: nur zwei Fundorte.

UWB: Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993, Kache leg. 1992, KACHE 1998).

SBL: Düsseldorf: Hösel (Koch leg. 1960, KOCH 1968, 1974).

Acrotona parvula (Mannh., 1831) 23-1881.013-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Rheine: Saline Gottesgabe (SCHMIDT 1913) - Oelde, Lette (DAHMS 1928) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1994/96/98, CRB) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1996, CRB).

UWB: Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.) - Detmold: Lippischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1982, CRB) - Diemeltal: Lamerden (Renner leg. 1981, CRB) - Lichtenau: Altenau-Tal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1994, CFM, FELDMANN & LÜCKMANN 1998) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB).

SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884, GEILENKEUSER 1896) - Witten (FÜGNER 1902) - Hösel (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Wissen/Sieg: Roth (Stock leg. 1976, CSR) - Finnentrop-Rönkhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988/91, CGL) - Hagen (Drees leg. 1990/95, CDH) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Sundern: Röhrensprung (Grundmann leg. 1991, CGL) - Altenhündem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL).

Aleuonota rufotestacea (Kr., 1856) 23-190-.001-

D.: fast aus allen Teilgebieten gemeldet.

Westf.: weit verbreitet, aus DGN nicht gemeldet.

WTL: Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1995, CRB).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1979, CJB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1987/88, CRB, RENNER 1991) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1998, CRB).

OWB: Körbecke (Kroker leg. 1979, KROKER & RENNER 1983) - Höxter (Gerken leg. 1989, CAH, ASSING i.l.) - Lichtenau (Grundmann leg. 1989, CGL) - Beverungen (Figura leg. 1990, CAH, ASSING i.l.) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1992/94/95, CFM, FELDMANN & LÜCKMANN 1998).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Iserlohn (Erbeling leg. 1986, ERBELING & DREES 1992) - Schmallenberg (Grundmann leg. 1986, CGL) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/87, CGL) - Plettenberg (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Letmathe (ERBELING & DREES 1992) - Menden: NSG Hönnetal (Terlutter leg. 1995, CTM).

Aleuonota gracilentata (Er., 1839)

23-.190-.002-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: wenige Funde aus dem Bergland.

UWB: Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.).

OWB: Körbecke (Kroker leg. 1979, CRB, KROKER & RENNER 1983) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1992/95, CFM, FELDMANN & LÜCKMANN 1998).

SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884, WESTHOFF 1886, KOCH 1968).

Aleuonota egregia (Rye, 1875)

23-.190-.003-.

D.: außer im Norden fast in allen Teilgebieten.

Westf.: im Bergland.

UWB: Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/85, CRB, RENNER et al. 1986) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1987/94, CRB, RENNER 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1998/99, CRB).

OWB: Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Radevormwald (Wenzel leg. 1983, WENZEL 1989, KOCH 1992) - Solingen (Kolbe leg. 1987, MKB; KOLBE 1984a, 1984c, 1987, 1988, 1992, KOCH 1992) - Herscheid (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Wuppertal (KOLBE 1996).

Alianta incana (Er., 1837)

23-.192-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, in allen fünf Teilgebieten.

An Ufern mit Rohrkolben.

- DGN: Lübbecke: Hiller Moor (Renner leg. 1980, CRB) - Hiller Moor (Jankowski leg. 1982, CJB) - Hüde/Dümmer (Feldmann leg. 1988, CFM) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 1992, CTM) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Starke leg. 1993, CSW).
- WTL: Soest (Buddeberg leg., WESTHOFF 1881) - Oelde (Dahms leg. 1935, LMM) - Dorsten (Hozman leg. 1972, CHE) - Dülmen (Hozman leg. 1975, CHE) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1985, CRB, RENNER 1987) - West-Münsterland: Wettringen (Renner leg. 1988, CRB) - Warendorf (Starke leg. 1991, CSW) - Vreden: Berkelaue (Terlutter leg. 1998, CTM).
- UWB: Leopoldshöhe (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bünde: Hücker Moor (Renner leg. 1992, CRB).
- OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Dörentrup (Renner leg. 1977, CRB) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1980/81/82, CJB) - Minden: Schaumburger Wald (Renner leg. 1983, CRB).
- SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1960/61, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Westhofen (Drees leg. 1978/83, CDH) - Witten (Drees leg. 1990, CDH) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Hohenlimburg (Drees leg. 1995, CDH) - Gevelsberg: Haspe-Stausee (Drees leg. 1997, CDH).

Pachnida nigella (Er., 1837)

23-.193-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, in allen fünf Teilgebieten.

An Ufern mit Rohrkolben.

- DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1982, CJB).
- WTL: Oelde (DAHMS 1928) - Dorsten (Hozman leg. 1975, CHE) - Halle: Tatenhausen (Renner leg. 1979, CRB) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1983, CTM) - Ahaus: NSG Graeser Venn (Feldmann leg. 1996, CFM) - Vreden: Berkelaue (Terlutter leg. 1998, CTM).
- UWB: Holzhausen (Jankowski leg. 1974, CJB).
- OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1981, CJB).
- SBL: Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Solingen (Modrow leg. 1961, MKB) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1962/64, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Ratingen: Homberg (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Hagen (Drees leg. 1978/88, CDH) - Witten (Drees leg. 1984/90, CDH) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Hohenlimburg (Drees leg. 1995, CDH) - Gevelsberg: Haspe-Stausee (Drees leg. 1997, CDH).

Trichiusa immigrata Lohse, 1984

23-.1931.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, in allen fünf Teilgebieten.

Adventivart, allgemein eingebürgert.

DGN: Oppenweher Moor (Renner leg. 1983, CRB).

WTL: Dortmund (Hellweg leg. 1986, CHF) - Rietberg (Wasner leg. 1988, CHE) - Münster (Feldmann leg. 1989, CFM) - Nottuln (Terlutter leg. 1990/93, CTM) - Münster-Handorf (Röwekamp leg. 1993, CRE) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1998/99, CRB) - Münster (Hetzl leg. 2000, CFM).

UWB: Teutoburger Wald: Werther-Isingdorf (Renner leg. 1987/89, CRB, RENNER 1991) - Bielefeld: Stadtgebiet (Renner leg. 1995, CRB) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1998/2000, CRB) - Bielefeld: Stadt (Renner leg. 2000, CRB) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1991, CWB).

SBL: Radevormwald (Wenzel leg. 1985/86/89/91, GRÄF & WENZEL 1986, WENZEL 1989) - Finnentrop (Hellweg leg. 1986, CHF) - Attendorn: Repetal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop-Wildewiese (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988/91, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988/90, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Hagen (Drees leg. 1989, CDH, DREES 1991, Drees leg. 1995, CDH) - Finnentrop: Ostentrop (Grundmann leg. 1991, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1991, CWR) - Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Schmalenberg: Altenilpe (Grundmann leg. 1994, CGL) - Heiligenhaus: Vogel-sangbachtal (Wenzel, Lappann leg. 1998/99, CWR).

Thamiaraea cinnamomea (Grav., 1802)

23-.194-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, in allen fünf Teilgebieten.

An Saftflüssen von Laubbäumen.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Münster (Kolbe leg., WESTHOFF 1881) - Oelde (Dahms leg. 1932, LMM) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1976/77/78, CRB, RENNER 1980) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Heek/Ahaus: NSG Fichte-Kallenbeck (Terlutter leg. 1986, CTM) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1991, CRE) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991/92, CKB) - Münster: Davert (Feldmann leg. 1992, CFM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1999, CRB).

UWB: Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995, Kache leg. 1992/93, KACHE 1998) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.).

OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Nammener Wald (Jan-kowski leg. 1975, CJB) - Warburg: Hellberg/Scherfede (Renner leg. 1980, CRB) - Paderborn-Wewer (Renner leg. 1981, CRB, RENNER 1985) - Eggegebirge: Schwaney (Terlutter leg. 1986, CTM) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/92/93, CWB, SMB) - Altenbeken:

Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Arnsberg (Varendorff leg., WESTHOFF 1881) - Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Witten (FÜGNER 1902) - Letmathe, Schwerte (Erbeling leg. 1983, CERL) - Hagen (Drees leg. 1988/92, CDH) - Waldbröl (Köhler leg. 1996, CKB) - Neheim: Voßwinkel (Elmer leg. 1998, CFM) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel, Lappann leg. 1999, CWR).

Thamiaraea hospita (Märk., 1844)

23-194-002-

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, in allen allen fünf Teilgebieten.

An Saftflüssen von Laubbäumen.

DGN: Häverner Marsch (Grundmann leg. 1982, CGL) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 1994, CTM) - Hopsten: NSG Trogbahn (Feldmann leg. 1998, CFM).

WTL: Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1976/77/78, CRB, RENNER 1980) - Oelde (Dahms leg. 1932, LMM) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1985, CRB, RENNER 1987) - Münster: Davert (Feldmann leg. 1992, CFM) - Warendorf (Starke leg. 1993, CSW).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1975, CJB) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Kache leg. 1992/93, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1975, CJB) - Georgsberg/Willebadesen (Renner leg. 1980, CRB) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1981, CRB) - Diemeltal: Lamerden (Renner leg. 1981, CRB) - Paderborn-Wewer (Renner leg. 1981/82, CRB, RENNER 1985) - Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1981, CRB) - Eggegebirge: Schwaney (Terlutter leg. 1986, CTM) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990, CWB) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Olpe: Reichshof (Gerhard leg. 1987, CGR) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Hagen (Drees leg. 1992, CDH) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1999, CWR).

Drusilla canaliculata (F., 1787)

23-195-001-

D.: in ganz Deutschland sehr häufig.

Westf.: überall häufig.

Sehr eurytopye, myrmecophage Art.

Zyras collaris (Payk., 1800)

23-196-001-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: meistens alte Funde, aus UWB nicht gemeldet.

- DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1958, CJB) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) - Vreden: Fürstenbusch (Terlutter leg. 1992, CFM).
- WTL: Lippstadt (Müller leg., WESTHOFF 1881) - Münster (WESTHOFF 1881) - Münster-Wilkinghege (Westhoff leg. 1885, LMM) - Münster (Reeker leg., LMM).
- OWB: Paderborn (WESTHOFF 1881) - Scherfede: Scheffelberg (Großkopf leg. 1986, CGL).
- SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Barmen (CORNELIUS 1884) - Witten (FÜGNER 1902, MKB) - Hösel (Büttner leg. 1950, MKB) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1961/62, KOCH i.l.) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1968, MKB) - Burscheid (Kolbe leg. 1986, KOLBE & BRUNS 1988, KÖHLER 1997, MKB) - Hohenlimburg (Drees leg. 1995, CDH).

Zyras fulgidus (Grav., 1806) 23-.196-.002-.
 D.: in Süden und Mitte an Wärmestellen.
 Westf.: nur in OWB gefunden.
 OWB: Eberschütz/Diemel (Lückmann leg. 1995/97, CFM).

Zyras haworthi (Steph., 1832) 23-.196-.003-.
 D.: fast in ganz Deutschland.
 Westf.: selten, aber in allen fünf Teilgebieten.
 Myrmecophil, besonders bei *Lasius fuliginosus*.
 DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1953, CJB).
 WTL: Münster (Reeker leg. 1884, REEKER 1887, LMM) - Warendorf (Starke leg. 1991, CSW).
 UWB: Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).
 SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Wuppertal (Thiele leg. 1957, KOCH 1968, MKB) - Altena: NSG Nordhelle (Rehage leg. 1973, CRD) - Plettenberg (Hellweg leg. 1985, HELLWEG 1989) - Waldbröl (Köhler leg. 1996, CKB) - Wuppertal (KOLBE 1996) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Lappann leg. 1999, CWR).

Zyras erraticus (Hagens, 1863) 23-.196-.004-.
 D.: wenige Funde aus dem nordwestlichen Deutschland, sonst südeuropäisch.
 Westf.: wenige Funde aus OWB, SBL.
 Myrmecophil, bei *Tapinoma erraticum*.
 OWB: Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1981, CRB, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1994/95, CFM, FELDMANN & LÜCKMANN 1998).
 SBL: Elberfeld (Hagens leg., WESTHOFF 1881).

Zyras limbatus (Payk., 1789)

23-196-005-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: häufig, in allen allen fünf Teilgebieten.

Myrmecophil, besonders bei *Lasius fuliginosus*.

DGN: Petershagen (BARNER 1922) - Stemmer Berge (Kerstens leg 1952/54, LMO)- Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Bocholt (WESTHOFF 1881) - Greven (Treuge leg., WESTHOFF 1881) - Lippstadt (WESTHOFF 1881) - Münster (WESTHOFF 1881, Westhoff leg. 1881, LMM) - Münster (Loens leg. 1885, LMM) - Holsen (Peetz leg. 1936, LMM) - Rheda (Rehage leg., CRD, REHAGE 1972) - Oerlinghausen: Senne (Grundmann leg. 1982, CGL) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1985, CRB, RENNER 1987) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1985, CRB, RENNER 1987) - Warendorf (Starke leg. 1989, CSW) - Lüdinghausen: Olfen (Terlutter leg. 1992, CTM) - Ahlen-Dolberg (Röwekamp leg. 1994, CRE) - Gronau: NSG Amtsvenn (Terlutter leg. 1996, CTM).

UWB: Petershagen (BARNER 1922) - Petershagen (Barner leg., PEETZ 1931) - Barkhausen (Jankowski leg. 1948/50/51/55, CJB) - Porta Westf. (Jankowski leg. 1953, CJB) - Holzhausen (Jankowski leg. 1957, CJB) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995, Klaas leg. 1992, KACHE i.l.) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Bielefeld: Lämershagen (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Körbecke (Kroker leg. 1979, KROKER & RENNER 1983) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1980/81/82, CRB) - Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1980/83, CRB) - Warburg: Hellberg/Scherfede (Renner leg. 1980, CRB) - Paderborn (Braun leg. 1981, CBP) - Paderborn-Wewer (Renner leg. 1981/82, CRB, RENNER 1985) - Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1981/82, CRB) - Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1981, CRB) - Scherfede: Scheffelberg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Warburg: Weldaer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Beverungen (Figura leg. 1990, ASSING i.l.) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1994, CFM, FELDMANN & LÜCKMANN 1998).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Overath (Rüschkamp leg. 1928, MKB) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1956, KOCH i.l.) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1958/61/62, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Solingen (Gräf leg. 1963/66, MKB) - Hilden (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1965, KOCH i.l.) - Wuppertal: Krutscheid (KOLBE 1971) - Langenberg (Wenzel leg. 1973, CWR) - Hagen (Drees leg. 1982/89, CDH) - Letmathe (Drees leg. 1984/85/86, CDH) - Iserlohn (Erbeling leg. 1986, ERBELING & DREES 1992) - Letmathe (ERBELING & DREES 1992) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1998, CWR) - Hagen: Eckesey (Drees leg. 1999, CDH).

Zyras funestus (Grav., 1806)

23-196-006-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: nicht in allen fünf Teilgebieten.

Myrmecophil, besonders bei *Lasius fuliginosus*.

WTL: Bocholt (Waldau leg., WESTHOFF 1881) - Gütersloh: Barrelpäule/Brockhagen (Grundmann leg. 1980, CGL).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1950/79, CJB) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Lage: Altholzhausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Stadtgebiet (Renner leg. 1988, CRB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Witten (Fügner leg., WESTHOFF 1881, FÜGNER 1902) - Overath (Rüschkamp, Schneider leg. 1929, MKB) - Hückeswagen (Eigen leg., MKB) - Hohenlimburg (Drees leg. 1981, CDH) - Solingen (Gräf leg. 1987, MKB) - Hagen (Drees leg. 1989/90, CDH) - Harkortsee/Ruhr (Drees leg. 1989, CDH) - Herdecke/Ruhr (Drees leg. 1990, CDH).

Zyras humeralis (Grav., 1802)

23-.196-.007-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen allen fünf Teilgebieten, meist häufig.

Myrmecophil, besonders bei *Lasius fuliginosus*.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Münster (REEKER 1887) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1977, CRB, RENNER 1980) - Gütersloh: Barrelpäule/Brockhagen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1987, CRB) - Warendorf (Starke leg. 1987, CSW) - Haltern (Starke leg. 1989, CSW) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Münster: Gimfte (Feldmann leg. 1995, CFM) - Emsdetten: NSG Emsdettener Venn (Terlutter leg. 1996, CTM).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1949, CJB) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Lage: Altholzhausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Kache leg. 1992, KACHE 1998) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1999, CRB).

OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1993, FELDMANN & LÜCKMANN 1998).

SBL: Arnsberg (Varendorff leg., WESTHOFF 1881) - Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (WESTHOFF 1881) - Witten (Fügner leg., MKB) - Overath (Rüschkamp leg. 1929, Schneider leg. 1933, MKB) - Hückeswagen (Eigen leg., MKB) - Ratingen (Koch leg. 1959/63/64, KOCH i.l.) - Solingen (Modrow leg. 1968, MKB) - Wuppertal: Krutscheid (Kolbe leg. 1970, MKB) - Wuppertal (Kolbe leg. 1972, MKB; KOLBE & HOUVER 1973, KOLBE 1972, 1978) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Hückeswagen (Wenzel leg. 1988, CWR) - Harkortsee/Ruhr (Drees leg. 1989/91, CDH) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Herdecke/Ruhr (Drees leg. 1990, CDH) - Meinerzhagen: Ebbegebirge (Rehage leg. 1992, CRD) - Hagen (Drees leg. 1993, CDH).

Zyras similis (Märk., 1842) 23-.196-.008-.

D.: aus dem Nordosten noch nicht gemeldet.

Westf.: wenige Funde aus OWB.

Myrmecophil, besonders bei *Lasius fuliginosus*.

OWB: Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1981/82, CRB, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Eberschütz/Diemel (Lückmann leg. 1995, CFM).

Zyras cognatus (Märk., 1842) 23-.196-.009-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

Myrmecophil, besonders bei *Lasius fuliginosus*.

DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1980, CJB).

WTL: Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1977/78, CRB, RENNER 1980) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1984, CTM).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1954/78/79, CJB) - Barkhausen (Borcherdig leg., BORCHERDING 1994) - Detmold: Lippischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1981, CRB) - Beverungen (Figura leg. 1990, ASSING i.l.) - Eberschütz/Diemel (Lückmann leg. 1995, CFM).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Hilchenbach (Cornelius leg., WESTHOFF 1881) - Waldeck (Langenbeck leg., WESTHOFF 1881) - Elberfeld (Rossi leg., LMM) - Witten (FÜGNER 1902, MKB) - Overath (Rüschkamp leg. 1929, MKB) - Hückeswagen (Eigen leg., MKB, KÖHLER 1993) - Imhausen/Sieg (Appel leg. 1948, MKB) - Hohenlimburg (Drees leg. 1981, CDH) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (Stumpf leg. 1987, KOCH 1992, STUMPF 1993) - Solingen (Gräf leg. 1987, KOCH 1992) - Hagen (Drees leg. 1989/90, CDH) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Harkortsee/Ruhr (Drees leg. 1991, CDH).

Zyras lugens (Grav., 1802) 23-.196-.010-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

Myrmecophil, besonders bei *Lasius fuliginosus*.

DGN: Hopsten: NSG Heiliges Meer (Feldmann leg. 1998, CFM) - Steinfurt: NSG Wiechholz (Feldmann leg. 1998, CFM).

WTL: Lippstadt (Buddeberg leg., WESTHOFF 1881) - Vreden: NSG Ellewicker Feld (Terlutter leg. 1988, CTM) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1993, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993/95/96, CRB) - Emsdetten: NSG Emsdettener Venn (Terlutter leg. 1996, CFM, CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1997/99/2000, CRB, CFM).

UWB: Porta Westf. (Jankowski leg. 1963, CJB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1987/88/89/98/99, CRB, RENNER 1991) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1979, CJB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Witten (FÜGNER 1902, MKB) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1959, KOCH 1968, MKB) - Wuppertal (KOLBE & HOUVER 1973, KOLBE 1973, 1978, KOCH 1978) - Solingen (Gräf leg. 1987, KOCH 1992, Gräf leg. 1982/89, MKB) - Schmallebenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/90, CGL).

Zyras laticollis (Märk., 1844)

23-.196-.012-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: selten, aber fast in allen Teilgebieten.

Myrmecophil, besonders bei *Lasius fuliginosus*.

WTL: Emsdetten: NSG Emsdettener Venn (Terlutter leg. 1996, CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 2000, CRB).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1950, CJB) - Bielefeld- Bethel (Renner leg. 1980, CRB).

OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Solingen (Gräf leg. 1961, KOCH 1968, Gräf leg. 1986/87, KOCH 1992, MKB) - Langenberg (Wenzel leg. 1972, CWR) - Hohenlimburg (Drees leg. 1988, CDH) - Hagen (Drees leg. 1989/90, CDH).

Myrmoecia plicata (Er., 1837)

23-.1961.001-.

D.: Funde weit zerstreut.

Westf.: wenige Funde aus OWB, SBL.

Myrmecophil, bei *Tapinoma erraticum*.

OWB: Körbecke (Kroker leg. 1979, KROKER & RENNER 1983) - Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1980, CRB, RENNER 1981a) - Warburg: Hellberg/Scherfede (Renner leg. 1980, CRB, RENNER 1981a) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1993/94, CFM, FELDMANN & LÜCKMANN 1998).

SBL: Elberfeld (Hagens leg., WESTHOFF 1881).

Myrmoecia confragrosa (Hochh., 1849)

23-.1961.002-.

D.: nur in wenigen Gebieten.

Westf.: nur aus OWB und SBL gemeldet.

Myrmecophil, bei *Tapinoma erraticum*.

OWB: Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1980, CRB, RENNER 1981a).

SBL: Wuppertal (KOLBE & HOUVER 1973, KOCH 1974, KOLBE 1978).

Lomechusoides strumosa (F., 1792)

23-.197-.001-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: wenig neuere Funde.

Myrmecophil, besonders bei *Formica sanguinea*.

WTL: NSG Deutener Moor (SIEDE 1977).

UWB: Bielefeld: Lämershagen (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Corbach (Langenbeck leg., WESTHOFF 1881).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Siegen (Suffrian leg., WESTHOFF 1881) - Nevi-
ges (ROSSI 1882) - Witten (FÜGNER 1902) - Hückeswagen (Eigen leg.,
MKB) - Overath (Schneider leg. 1933, MKB).

Lomechusa emarginata (Payk., 1789)

23-198-001-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, vielfach nur alte Funde.

Myrmecophil, Wirtswechsel zwischen *Formica*- und *Myrmica*-Arten.

DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1960, CJB).

WTL: Münster (Kolbe leg., WESTHOFF 1881) - Nienberge (Westhoff leg.,
WESTHOFF 1881).

UWB: Minden (Quapp leg., WESTHOFF 1881, BARNER 1922) - Petershagen
(Barner leg. 1899/1900, LMM) - Kreuzkrug/Senne (Barner leg. 1935,
LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1950/56/58, CJB) - Barkhausen
(Jankowski leg. 1953, CJB, RENNER 1997b) - Barkhausen (Borcherding
leg., BORCHERDING 1994).

OWB: Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchen-
bach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Overath
(Klapperich leg. 1933, MKB) - Solingen (Modrow leg. 1953, MKB) -
Overath (Malsbender leg. 1954, KÖHLER i.l.) - Hohenlimburg (Drees
leg. 1983, CDH) - Iserlohn (Erbeling leg. 1986, ERBELING & DREES
1992) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1986/87, WENZEL 1989) -
Letmathe (Drees leg. 1989, CDH, ERBELING & DREES 1992) - Hagen
(Drees leg. 1990, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1994, CWR).

Lomechusa paradoxa Grav., 1806

23-198-002-

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: aus DGN und UWB nicht gemeldet.

Myrmecophil, Wirtswechsel zwischen *Formica*- und *Myrmica*-Arten.

WTL: Soest (VERHOEFF 1890).

OWB: Marsberg: Dahlberg (Großkopf leg. 1986, CGL).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, Geilenkeuser leg., KOCH
1968) - Neviges (ROSSI 1882) - Barmen (CORNELIUS 1884, KOCH 1968)
- Witten (FÜGNER 1902).

Lomechusa pubicollis (Bris., 1860)

23-198-003-

D.: aus etlichen Teilgebieten noch nicht gemeldet.

Westf.: nur zwei sehr alte Meldungen.

Myrmecophil, Wirtswechsel zwischen *Formica*- und *Myrmica*-Arten.

WTL: Lippspringe (Wasmann leg. 1909, HORION 1967).

SBL: Bergisch Gladbach (Aerts leg. 1925, KOCH 1974).

Dinarda dentata (Grav., 1806)

23-.199-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, fast in allen Landesteilen.

Myrmecophil, besonders bei *Formica sanguinea*.

DGN: Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 2000, CTM) - Recke: NSG Recker Moor (Terlutter leg. 2000, CTM).

WTL: Coesfeld (Hozman leg. 1974, CHE) - NSG Deutener Moor (SIEDE 1977) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1985, CRB, RENNER 1987).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935, LMM) - Bielefeld: Lämershagen (Renner leg. 2000, CRB).

SBL: Elberfeld (WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Siegen (Suffrian leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Hagen (Drees leg. 1983/92, CDH) - Hückeswagen (Eigen leg., MKB, KÖHLER 1994).

Dinarda maerkelii Kiesw., 1843

23-.199-.002-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: nur wenige Meldungen.

Myrmecophil, besonders bei *Formica rufa*.

WTL: Lippstadt (Buddeberg leg., WESTHOFF 1881).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1950, CJB).

SBL: Elberfeld (WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Witten (FÜGNER 1902) - Overath (Rüschkamp leg. 1929, MKB, KÖHLER 1994).

Dinarda hagensii Wasm., 1889

23-.199-.003-.

D.: Nachweislücken im nördlichen und mittleren Deutschland.

Westf.: keine Meldung.

Myrmecophil, besonders bei *Formica exsecta*.

Dinarda pygmaea Wasm., 1894

23-.199-.004-.

D.: hauptsächlich in Süden und Westen.

Westf.: wenige Funde aus OWB.

Myrmecophil, besonders bei *Formica rufibarbis*.

OWB: Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1994/95, CFM, CRB, FELDMANN & LÜCKMANN 1998) - Eberschütz/Diemel (Lückmann leg. 1997, CFM).

Phloeopora teres (Grav., 1802)

23-.201-.001-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: zerstreut in fast allen Teilgebieten.

- WTL: Essen (Hozman leg. 1970, CHE).
 UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1951/54/56/68/76/82, CJB) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).
 OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1976/82, CJB) - Porta Westfalica (Grundmann leg. 1982, CGL).
 SBL: Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1957, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1957/60, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1957/63, KOCH i.l.) - Hagen (Drees leg. 1984/92/96, CDH) - Solingen (KOLBE 1992) - Radevormwald (Wenzel leg. 1993, CWR, WENZEL 1994) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel, Lappann leg. 1998/99, CWR) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Lappann, Wenzel leg. 1999, CWR).

Phloeopora opaca Bernh., 1902 23-.201-.002-.

D.: Funde weit zerstreut.

Westf.: nur eine alte Meldung.

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., KOCH 1968).

Phloeopora concolor (Kr., 1856) 23-.201-.003-.

D.: aus mehreren westlichen Teilgebieten noch nicht gemeldet.

Westf.: sehr wenige Meldungen.

WTL: Dortmund (RÖTTGEN 1911, HORION 1967) - Ostenfelde (Dahms leg. 1929, LMM) - Senne: Stapelage (Grundmann leg. 1981, CGL)

SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1967, KOCH 1974).

Phloeopora testacea (Mannh., 1830) 23-.201-.004-.

D.: in ganz Deutschland, häufigste Art der Gattung.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991).

WTL: Dortmund (WESTHOFF 1881) - Lippstadt (WESTHOFF 1881) - Soest (VERHOEFF 1890) - Ennigerloh (Dahms leg. 1924, DAHMS 1928) - Beelen (Dahms leg. 1929, LMM) - Oelde (Dahms leg. 1932, LMM) - Essen (Hozman leg. 1970, CHE) - Tatenhausen/Halle (Renner leg. 1979, CRB) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1990, CRE) - Münster: Davert (Terlutter leg. 1990/91, CTM).

UWB: Preuß. Oldendorf (PEETZ 1931; Peetz leg. 1932, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1950/56/75/78, CJB) - Bielefeld: Lämershagen (Renner leg. 1978, CRB).

OWB: Paderborn (WESTHOFF 1881) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1975, CJB) - Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1982, CRB) - Kreuzkrug/Kohlstädt (Braun leg. 1983, CBP) - Paderborn: Kirchborchen (Braun leg. 1989, CBP) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Witten (FÜGNER 1902) - Solingen (Gräf, Modrow leg. 1962, MKB) - Neunkir-

chen/Bröl (Appel leg. 1967, MKB) - Solingen (KOLBE 1981, 1992) - Hagen (Drees leg. 1983, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1984/86/89, WENZEL 1989) - Radevormwald (Wenzel leg. 1993, CWR, WENZEL 1994) - Neheim: Voßwinkel (Elmer leg. 1998, CFM).

Phloeopora nitidiventris Fauv., 1900

23-.201-.005-.

D.: Funde weit zerstreut.

Westf.: nur zwei Funde aus WTL.

Unter Nadelholzrinden.

WTL: Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1989/90, CRB, RENNER 1990).

Phloeopora corticalis (Grav., 1802)

23-.201-.006-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

Unter Baumrinden.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991) - Emsdetten: NSG Emsdettener Venn (Terlutter leg. 1996, CFM) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Feldmann leg. 1998, CFM).

WTL: Oelde (Dahms leg. 1932, LMM) - Essen (Hozman leg. 1970, CHE) - Münster: Davert (Rehage leg. 1971, CRD) - Bielefeld-Eckardtshiem (Renner leg. 1975, CRB) - Lünen: Cappenberger Wald (Terlutter leg. 1984, CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1988/90/91/92/94/98, CRB) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Ahlen (Röwekamp leg. 1992, CRE) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Erbeling leg. 1992, CErL).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1967/76/79, CJB) - Bielefeld-Quelle (Renner leg. 1977, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1993, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1982, CJB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Overath (Rüschkamp leg. 1929, MKB, KÖHLER 1994) - Siegtal (Appel leg. 1947, MKB) - Solingen (Modrow leg. 1956/59/62/64/71, Siede leg. 1986, KÖHLER 1994) - Ratingen (Koch leg. 1959, KÖHLER 1994) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1960/63, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1961/64, KOCH i.l.) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1962/67, MKB, KÖHLER 1994) - Hohenlimburg (Drees leg. 1978, CDH) - Sprockhövel (Hozman leg. 1981, CHE) - Hagen (Drees leg. 1982/88, CDH) - Wuppertal (Kolbe leg. 1992, KÖHLER 1994, KOLBE 1996) - Iserlohn (Erbeling leg. 1986, ERBELING & DREES 1992) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986, CGL) - Solingen (KOLBE 1988) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Letmathe (ERBELING & DREES 1992) - Radevormwald (Wenzel leg. 1993/94/96, CWR) - Waldbröl (Köhler leg. 1996, CKB).

- Phloeopora scribae* (Epph., 1884) 23-.201-.007-.
D.: Funde weit zerstreut.
Westf.: wenige Funde.
Unter Baumrinden.
 UWB: Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 2000, CRB).
 SBL: Hösel (Koch leg. 1957, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1958, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1958/59, KOCH i.l.) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Solingen (KOLBE 1992).
- Phloeopora bernhaueri* Lohse, 1984 23-.201-.008-.
D.: aus mehreren Teilgebieten noch nicht gemeldet.
Westf.: nur zwei Funde.
Unter Baumrinden.
 WTL: Dortmund (Hellweg leg. 1986, HELLWEG 1989) - Coesfeld: Baumberge (Ribbrock leg. 1998, CFM).
- Phloeopora aliena* Lohse, 1984 23-.201-.009-.
D.: Hessen, Norddeutschland.
Westf.: keine Meldung.
- Rhopalotella validiuscula* (Kr., 1856) 23-.202-.001-.
D.: nur in wenigen Gebieten.
Westf.: nur eine alte Meldung.
Der Fund aus Elberfeld (WESTHOFF 1881) ist auf *Atheta benickiella* zu beziehen, denn CORNELIUS hat *Homalota validiuscula* Erichson publiziert, nicht *H. validiuscula* Kraatz
 SBL: Overath (Schneider leg. 1928, HORION 1967, KOCH 1968).
 Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881): Meldung unrichtig.
- Ilyobates bennetti* Donisth., 1914 (= *subopacus* Palm) 23-.203-.002-.
D.: in ganz Deutschland.
Westf.: in allen fünf Teilgebieten.
 DGN: Häverner Marsch (Grundmann leg. 1982, CGL).
 WTL: Münster (Recker leg., LMM) - Dortmund (Appel leg. 1968, MKB) - Münster : Albachten (Hozman leg. 1980, CHE) - Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Warendorf: Drensteinfurt (Terlutter leg. 1986, CTM) - Bokel/Ems (1989/91, WASNER i.l.) - Ahlen (Röwekamp leg. 1990, CRE) - Münster: Gittrup (Terlutter leg. 1990, CTM) - Münster (Feldmann leg. 1991, CFM) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Ahaus: Butenfeld (Terlutter leg. 1994, CTM) - Münster: Westbevern (Köhler leg. 1997, CKB, KÖHLER 2000).
 UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1937, LMM) - Holzhausen (Jankowski leg. 1956, CJB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.).

- OWB: Körbecke (Kroker leg. 1978/79, KROKER 1981, KROKER & RENNER 1983) - Höxter (Gerken leg. 1989, ASSING i.l.) - Beverungen (Figura leg. 1990, ASSING i.l.) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91, CWB, SMB) - Godelheim/Weser (Terlutter leg. 1991, CTM).
- SBL: Hückeswagen (Eigen leg., MKB) - Wuppertal (KOLBE & HOUVER 1977, KOLBE 1978) - Hagen (Drees leg. 1980, CDH) - Burscheid (Kolbe leg. 1986, KOLBE & BRUNS 1988, KÖHLER 1997, MKB) - Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Unna: Geisecke (Flake leg. 1996, CFM) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel leg. 1997, CWR) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1998, CWR).

Ilyobates nigricollis (Payk., 1800)

23-.203-.003-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

- DGN: Hopsten: NSG Heiliges Meer (Rehage leg. 1994, CRD).
- WTL: Soest (VERHOEFF 1890) - Wiedenbrück (Rehage leg., CRD, REHAGE 1972) - Gronau: NSG Amtsvenn (Terlutter leg. 1982, CTM) - Nottuln: Darup (Terlutter leg. 1982, CTM).
- UWB: Mindener Wald (Barner leg. 1935, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1958, CJB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995, Klaas leg. 1992, KACHE i.l.) - Barkhausen (Borcharding leg., BORCHERDING 1994) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).
- OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1974, CJB) - Hardisser Moor (Renner leg. 1980, CRB) - Höxter (Gerken leg. 1989, CAH, ASSING i.l.) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1993/94, CFM, FELDMANN & LÜCKMANN 1998).
- SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Arnsberg (Varendorff leg., WESTHOFF 1881) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Siegen (Suffrian leg., WESTHOFF 1881) - Neviges (Rossi leg., LMM) - Witten (FÜGNER 1902) - Imhausen/Sieg (Appel leg. 1948, MKB) - Solingen (Thiele leg. 1951, MKB) - Ratingen (Koch leg. 1955, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Mettmann: Schöller (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Wuppertal (KOLBE 1971, 1978) - Wuppertal (Thiele leg. 1971, MKB) - Hagen (Drees leg. 1978, CDH) - Schmalenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/87, CGL) - Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Wiblingwerde: Nachrodt (Terlutter leg. 1994, CTM) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel leg. 1999, CWR).

Ilyobates propinquus (Aubé, 1850)

23-.203-.005-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: im Bergland verbreitet.

- UWB: Eickum (Barner leg., PEETZ 1931; Barner leg. 1935, LMM) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.).
- OWB: Holzminden (Jankowski leg. 1959, CJB) - Körbecke (Kroker leg. 1978/79, KROKER 1981, KROKER & RENNER 1983) - Warburg: Weldaer

Berg (Renner leg. 1981, CRB) - Lichtenau: Geimer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Neviges (ROSSI 1882, GEILENKEUSER 1896) - Wuppertal (Thiele leg. 1956, KOCH 1968, KÖHLER 1993, MKB) - Plettenberg (Hellweg leg. 1985, HELLWEG 1989) - Burscheid (Kolbe leg. 1986, MKB; KOLBE & BRUNS 1988, KOCH 1992, KÖHLER 1997).

Calodera nigrita Mannh., 1830

23-.204-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Hartum (Jankowski leg. 1977, CJB) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Lippstadt (Müller leg., WESTHOFF 1881) - Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Bokel/Ems (1989/91, WASNER i.l.).

UWB: Holzhausen (Jankowski leg. 1970, CJB) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1998, CRB).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1981, CJB).

SBL: Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Elberfeld (Neerl leg., KOCH 1968) - Witten (Drees leg. 1984, CDH) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986, CGL) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1991/92, WENZEL 1997) - Radevormwald (Wenzel leg. 1991, WENZEL 1991) - Wipperfürth (Wenzel leg. 1991, WENZEL 1991).

Calodera riparia Er., 1837

23-.204-.002-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: in fast allen Teilgebieten.

In Auwiesen.

DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1982, CJB) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) - Steinfurt: NSG Wiechholz (Feldmann leg. 1998, CFM).

WTL: Hövelhof/Senne (Renner leg. 1976, CRB, RENNER 1979) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1994/95, CRB, RENNER 1998) - Emsdetten: NSG Emsdettener Venn (Terlutter leg. 1996, CTM) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1996, CTM) - Vreden: Berkelaue (Terlutter leg. 1998, CTM).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1967, CJB).

SBL: Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1966, KOCH i.l.).

Calodera uliginosa Er., 1837

23-.204-.003-.

D.: aus mehreren westlichen Teilgebieten noch nicht gemeldet.

Westf.: bisher nicht in UWB, OWB.

An sumpfigen Stellen.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Oelde (Dahms leg. 1923, DAHMS 1928, LMM) - Münster (Hozman leg. 1986, CHE) - Rietberg (Hozman leg. 1989, CHE) - Emsdetten: NSG Emsdettener Venn (Terlutter leg. 1996, CTM).

SBL: Elberfeld (Kraatz leg., KOCH 1968).

Calodera rufescens Kr., 1856

23-.204-.004-.

D.: Süden, Westen, Norden.

Westf.: keine Meldung.

Düsseldorf (KOCH 1974) - Hannover: Stadt (Assing leg. 1986/87, CAH, ASSING 1988).

Calodera aethiops (Grav., 1802)

23-.204-.005-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: häufigste Art der Gattung.

An schlammigen Ufern.

DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1957, CJB) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) - Steinfurt: NSG Wiechholz (Feldmann leg. 1998, CFM).

WTL: Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1977, CRB, RENNER 1980) - Halle: Tatenhausen (Renner leg. 1979, CRB) - Münster: Bösensell (Hozman leg. 1984, CHE) - Ahaus: Bröke (Terlutter leg. 1989, CTM) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Vreden: NSG Ellewicker Feld (Terlutter leg. 1991, CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1995, CRB) - Ahaus: Schöppingen (Terlutter leg. 1995, CTM) - Ahaus: NSG Graeser Venn (Feldmann, Terlutter leg. 1996, CFM, CTM) - Emsdetten: NSG Emsdettener Venn (Terlutter leg. 1996, CTM) - Vreden: Zwillbrocker Venn (Feldmann leg. 1996, CFM).

UWB: Holzhausen (Jankowski leg. 1975, CJB) - Bielefeld-Jöllennebeck (Renner leg. 1977, CRB) - Lage: Altholzhausen (Grundmann leg. 1983, CGL) - Porta Westfalica (Renner leg. 1983, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1988, CRB).

OWB: Godelheim/Weser (Terlutter leg. 1991, CTM).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Witten (Drees leg. 1983, CDH) - Hückeswagen (Wenzel leg. 1988/90, CWR) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1991/92, WENZEL 1997) - Westhofen (Drees leg. 1991, CDH) - Witten (Drees leg. 1993, CDH) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1998, CWR).

Calodera protensa Mannh., 1830

23-.204-.006-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: nur WTL, UWB.

An schlammigen Ufern.

WTL: Münster (Kolbe leg., WESTHOFF 1881).

UWB: Holzhausen (Jankowski leg. 1958, CJB) - Barkhausen (Jankowski leg. 1967, CJB) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.) - Minden: Wesertal (Renner leg. 1995, CRB).

- Calodera stiliformis* Assing, 1996 23-204-008-
D.: nur in wenigen Gebieten.
Westf.: bisher in zwei Mooregebieten gefunden.
In der Sammlung Jankowski ist diese Art unter den Moortieren des *aethiops*-Komplexes nicht vertreten.
WTL: Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1984, CAH, ASSING 1996) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1984, CTM) - Emsdetten: NSG Emsdettener Venn (Terlutter leg. 1996, CTM).
- Chilomorpha longitarsis* (Thoms., 1867) 23-205-001-
D.: im Süden, Norden, Osten.
Westf.: keine Meldung.
An warmen Trockenstellen.
- Parocyusa rubicunda* (Er., 1837) 23-206-001-
D.: in ganz Deutschland.
Westf.: verbreitet, aus DGN nicht gemeldet.
WTL: Münster: Handorf (Renner leg. 1985, CRB) - Ahaus: Wüllen (Terlutter leg. 1990, CTM) - Stadtlohn: Bockwinkel (Terlutter leg. 1994, CTM).
UWB: Preuß. Oldendorf (PEETZ 1931) - Leopoldshöhe (Grundmann leg. 1979, CGL) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).
OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1974, CJB) - Brakel: Aa/Riesel (Renner leg. 1985, CRB) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990, CWB).
SBL: Elberfeld (Hagens leg., WESTHOFF 1882, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Hückeswagen (Eigen leg., MKB) - Erkrath (Koch leg. 1958, KOCH i.l.) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Ahaus: Wüllen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Lap-pann leg. 1998, CWR).
- Parocyusa longitarsis* (Er., 1837) 23-206-003-
D.: Nachweislücken im östlichen Deutschland, sonst meistens häufig.
Westf.: in allen fünf Teilgebieten häufig.
Ripicole Art.
- Ityocara rubens* (Er., 1837) 23-207-001-
D.: zerstreut im Süden, Norden, Osten; sehr selten.
Westf.: keine Meldung.
- Amarochara umbrosa* (Er., 1837) 23-208-001-
D.: fast in ganz Deutschland.
Westf.: wenige zerstreute Funde.
DGN: Stemmer Berge (Kerstens leg 1954, LMO).
WTL: Dorsten (Hozman leg. 1975, CHE).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1950/58, CJB).

SBL: Siegen (Suffrian leg., WESTHOFF 1881) - Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Benrath (Eigen leg., MKB) - Solingen (Modrow leg. 1955/57, KOCH 1968, MKB) - Hückeswagen (Eigen leg., KOCH 1968).

Amarochara bonnairei (Fauv., 1865) 23-208-.002-.

D.: sehr selten und in vielen Teilgebieten noch nicht gefunden.

Westf.: nur vier Funde.

UWB: Osnabrück (Kache leg. 1993, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).

OWB: Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1999, CWR).

Amarochara forticornis (Boisd.Lac., 1835) 23-208-.003-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: wenige Funde.

WTL: Münster (Hozman leg. 1986, CHE) - Unna (Terlutter leg. 1996, CTM) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1998, CRE) - Coesfeld: Baumberge (Ribbrock leg. 1998, CFM).

UWB: Eickum (Barner leg., LMM) - Osnabrück (Kache leg. 1992/93/94, KACHE 1998).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Waldeck (Langenbeck leg., WESTHOFF 1881) - Unna: Geisecke (Flake leg. 1996, CFM).

Ocalea badia Er., 1837 23-210-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Hartum (Jankowski leg. 1976/77/80, CJB) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Münster-Baumberge (Beyer leg. 1926, LMM) - Essen (Hozman leg. 1970, CHE) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1976/77, CRB, RENNER 1980) - Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Bokel/Ems (1989/91, WASNER i.l.) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1997, CRE).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peez leg. 1929, LMM, PEETZ 1931) - Barkhausen (Jankowski leg. 1956/59/65/75/76/79, CJB) - Bielefeld: Amshausen (Renner leg. 1975, CRB) - Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1975/76/77, CRB, RENNER 1981b) - Lengerich (Rehage leg. 1977, CRD) - Bielefeld (SPÄH 1980) - Halle: Jakobsberg (Rehage, Renner leg. 1980, CRD, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Osnabrück (Klaas leg. 1992, KACHE i.l., Kache leg. 1992/93, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1973/75/78/81, CJB) - Körbecke (Kroker leg. 1979, KROKER & RENNER 1983) - Georgsberg/Willebades-

sen (Renner leg. 1980/81/82, CRB) - Lage: Hardisser Moor (Renner leg. 1980, CRB) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1981/82, CRB) - Diemeltal: Lamerden (Renner leg. 1981/82, CRB) - Paderborn-Wewer (Renner leg. 1981/82/83, CRB, RENNER 1985) - Schlangen (Braun leg. 1981, CBP) - Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1981/82, CRB) - Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1981/82, CRB) - Neuenbeken (Braun leg. 1982, CBP) - Paderborn (Braun leg. 1982, CBP) - Warburg: Hellberg/Scherfede (Renner leg. 1982/83, CRB) - Lichtenau: Geimer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Marsberg: Dahlberg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Scherfede: Scheffelberg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Warburg: Weldaer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91, CWB) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1992/93/94, CFM, FELDMANN & LÜCKMANN 1998) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Witten (FÜGNER 1902) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1958, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1962, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Wuppertal: Krutscheid (KOLBE 1971) - Wuppertal (KOLBE & HOUVER 1973, KOLBE 1973, 1978) - Wuppertal (Pospischil leg. 1977, POSPISCHIL 1981) - Hagen (Drees leg. 1982/88, CDH) - Iserlohn (Erbeling leg. 1986, ERBELING & DREES 1992) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1986, WENZEL 1989) - Letmathe (Drees leg. 1987, CDH, ERBELING & DREES 1992) - Plettenberg (Erbeling leg. 1987, CERL) - Plettenberg: Eiringhausen (Grundmann leg. 1989, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1991/92/93, CWR) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1992, WENZEL 1997) - Meinerzhagen: Ebbegebirge (Rehage leg. 1992, CRD) - Schmallenberg: Altenilpe (Grundmann leg. 1994, CGL) - Menden: NSG Hönnetal (Terlutter leg. 1995, CTM) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Lappann, Wenzel leg. 1999, CWR) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Lappann leg. 1998/99, CWR).

Ocalea picata (Steph., 1832)

23-.210-.002-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Hopsten: NSG Heiliges Meer (Feldmann, Terlutter leg. 1992, CFM, CTM).

WTL: Oelde (Dahms leg. 1923, DAHMS 1928; Dahms leg. 1932, LMM) - Rheda (Rehage leg., CRD, REHAGE 1972) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1977, CRB, RENNER 1980) - Herzebrock: Clarholz (Terlutter leg. 1980, CTM) - Gütersloh: Barrelpäule/Brockhagen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Münster: Gimbe (Terlutter leg. 1982, CTM) - Sassenberg (Renner leg. 1983, CRB) - Vreden (Terlutter leg. 1983, CTM) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1988, CRB) - Lüdinghausen: Olfen (Terlutter leg. 1992, CTM) - Münster: Nienberge (Feldmann leg. 1992, CFM) - Münster: Sprakel (Feldmann leg. 1992, CFM) - Gronau: Goorbach (Terlutter leg. 1993, CTM) - Ahlen-Dolberg (Röwekamp leg. 1994, CRE) - Ahaus: Butenfeld (Terlutter leg. 1994, CTM) - Ahaus: Schöppingen (Terlutter leg. 1995, CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1995/99, CRB) - Münster: Westbevern (Köhler leg. 1997, CKB, KÖHLER 2000).

- UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1929, PEETZ 1931, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1954, CJB) - Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1977, CRB, RENNER 1981b) - Bielefeld (SPÄH 1980) - Leopoldshöhe (Grundmann leg. 1980, CGL) - Bad Salzuflen: Bexter Wald (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Brönninghausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Jöllenbeck (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Detmold: Heidenthal (Renner leg. 2000, CRB).
- OWB: Paderborn (WESTHOFF 1881) - Klein Möllenbeck (Jankowski leg. 1967/82, CJB) - Brakel: Riesel (Renner leg. 1983, CRB) - Schwane/Egge (Grundmann leg. 1983/84/85/86, CGL) - Bad Lippspringe (Braun leg. 1985, CBP) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91/92, CWB) - Kohlstädt (Braun leg. 1992, CBP) - Warburg: Scherfede (Terlutter leg. 1996, CTM).
- SBL: Arnsberg (Varendorff leg., WESTHOFF 1881) - Iberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Overath (Schneider leg. 1928, MKB) - Imhausen/Sieg (Appel leg. 1954, MKB) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1958/63, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1958/60/61/63, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1958/61, KOCH i.l.) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1958/66, MKB) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1961/66, KOCH i.l.) - Solingen (Modrow leg. 1961/62, MKB) - Mettmann: Schöller (Koch leg. 1962/64, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1962/63, KOCH i.l.) - Gruiten (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Engelskirchen (Appel leg. 1973, MKB) - Gevelsberg (Drees leg. 1976, CDH) - Wuppertal (KOLBE & HOUVER 1977, KOLBE 1978) - Schmallenberg: Härdler (Terlutter leg. 1981, CTM) - Hagen (Drees leg. 1982, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1984/85/87/91, WENZEL 1989) - Finnentrop-Wildewiese (Grundmann leg. 1988, CGL) - Glörtalsperre (Drees leg. 1988, CDH) - Iserlohn: Hemer (Renner leg. 1988, CRB) - Plettenberg (Renner leg. 1988, CRB, Erbeling leg. 1990, CERL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Schwelm (Starke leg. 1989, CSW) - Herscheid: Elsen (Grundmann leg. 1990/91, CGL) - Iserlohn: Grüne (Grundmann leg. 1990, CGL) - Neuenrade: Altenaffeln (Grundmann leg. 1990, CGL) - Plettenberg: Eiringhausen (Grundmann leg. 1990/91, CGL) - Plettenberg: Heveschotten (Grundmann leg. 1990, CGL) - Plettenberg: Pasel (Grundmann leg. 1990, CGL) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1990/92, CGL) - Werdohl: Kettling (Grundmann leg. 1990, CGL) - Finnentrop: Kuckuck (Grundmann leg. 1991, CGL) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1991/92, WENZEL 1997) - Radevormwald (Wenzel leg. 1991/92/93, CWR) - Hönnetal (Grundmann leg. 1992, CGL) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Schmallenberg: Altenilpe (Grundmann leg. 1994, CGL) - Wiblingwerde: Nachrodt (Terlutter leg. 1994, CTM) - Wiblingwerde: Nachrodt (Terlutter leg. 1994, CTM) - Hönnetal: Völkringhausen (Terlutter leg. 1995, CTM) - Menden: NSG Hönnetal (Röwekamp, Terlutter leg. 1995, CRE, CTM) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1998/99, CWR) - Heiligenhaus: Vogel-sangbachtal (Lappann leg. 1998, CWR).

Ocalea concolor Kiesw., 1847

23-.210-.003-.

D.: im Süden und Westen.

Westf.: nur aus WTL und SBL gemeldet.

WTL: West-Münsterland: Gronau (Grundmann leg. 1992, CGL) - Gronau: Goorbach (Terlutter leg. 1993, CTM).

SBL: Berleburg (Folwaczny leg. 1939, HORION 1967) - Leuscheid/Siegel (Appel leg. 1968, MKB) - Overath (Rüschkamp, Schneider leg. 1928, KOCH 1968, MKB) - Hagen (Drees leg. 1979, CDH) - Plettenberg (Erbeling leg. 1990/91, CErL) - Plettenberg: Pasel (Grundmann leg. 1990/91, CGL) - Attendorn: Borghausen (Grundmann leg. 1991, CGL) - Winterberg (Feldmann leg. 1991, CFM) - Altenkirchen (WAGNER 1992) - Werdohl: Kettling (Grundmann leg. 1992, CGL) - Iserlohn (Drees leg. 1994, CDH) - Witten (Drees leg. 1994, CDH).

Ocalea rivularis Mill., 1851

23-.210-.004-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: in SBL häufig.

WTL: Bochum (Hozman leg. 1974, CHE) - Gütersloh: Barrelpäule/Brockhagen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Unna: Sölder Bruch (Hozman leg. 1989, CHE) - Münster: Handorf (Starke leg. 1990, CSW) - Münster: Gimble (Feldmann leg. 1991, CFM) - Gronau: Goorbach (Terlutter leg. 1993, CTM) - Ahlen-Dolberg (Röwekamp leg. 1995, CRE).

UWB: Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).

OWB: Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91, CWB, SMB).

SBL: Witten (FÜGNER 1902) - Hösel (Koch leg. 1958, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Neandertal (Koch leg. 1959, KOCH 1968) - Erkrath (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Overath (Schneider leg., KOCH 1968) - Solingen (Modrow leg., KOCH 1968) - Hagen (Drees leg. 1980, CDH) - Dahlebrück/Volme (Drees leg. 1989, CDH) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Sundern: Allendorf (Grundmann leg. 1989, CGL) - Plettenberg: Eiringhausen (Grundmann leg. 1990/91, CGL) - Plettenberg (Erbeling leg. 1990/91, CErL) - Plettenberg: Pasel (Grundmann leg. 1990, CGL) - Plettenberg: Almecke (Grundmann leg. 1991, CGL) - Werdohl: Kettling (Grundmann leg. 1990/91, CGL) - Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Altenkirchen (WAGNER 1992) - Hönnetal (Grundmann leg. 1992, CGL) - Wissen/Sieg: Gebhardshain (WAGNER 1992) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Radevormwald (Wenzel leg. 1993, CWR) - Wetter/Ruhr (Drees leg. 1993, CDH) - Menden: Hönnetal (Feldmann leg. 1995, CFM) - Glör-Talsperre (Drees leg. 1999, CDH).

Ocalea latipennis Shp., 1870

23-.210-.005-.

D.: bisher nur im Nordwesten, sonst in West- und Nordeuropa.

Westf.: in fast allen Teilgebieten, selten.

WTL: Oelde (Dahms leg. 1932, LMM) - Münster: Davert (Terlutter leg. 1990, CTM) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1992, CRE).

- UWB: Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).
 OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1978/80, CJB) - Langeland/Altenbe-
 ken (Braun leg. 1982, CBP) - Warburg: Daseburg (Renner leg. 1994,
 CRB, RENNER 1998).
 SBL: Hagen (Drees leg. 1987, CDH, DREES 1996) - Schmallenberg (Renner
 leg. 1988, CRB) - Ennepetal (Drees leg. 1990, CDH, DREES 1996).

Apimela mulsanti (Ganglb., 1895) 23-.212-.001-.
 D.: Bayern, Rheinland.
 Westf.: keine Meldung.

Apimela macella (Er., 1839) 23-.212-.002-.
 D.: zerstreut im Bergland, sonst nur bei Bremen.
 Westf.: wenige Funde aus SBL.
 Im Kies von Bergbächen.
 SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH
 1968) - Lennestadt (Hellweg leg. 1987, HELLWEG 1989) - Hagen (Drees
 leg. 1994, DREES 1996) - Westhofen (Drees leg. 1997, CDH).

Meotica pallens (Redt., 1849) 23-.213-.003-.
 D.: weit verbreitet, Nachweise sehr lückenhaft.
 Westf.: zerstreute Funde.
 Besonders in Sandgebieten.
 DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1984, CGL).
 WTL: Geseke (Buddeberg leg, WESTHOFF 1881) - Münster-Baumberge (Beyer
 leg. 1926, LMM) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1990/93, CRB) -
 Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1993/95, CRB) - Paderborn: Süd-
 senne (Renner leg. 1994/95/97/99/2000, CRB) - Münster: Westbevern
 (Köhler leg. 1997, CKB, KÖHLER 2000).
 UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1950/56, CJB) - Osnabrück (Kache leg.
 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1998,
 CRB).
 SBL: Hagen (Drees leg. 1994, CDH).

Meotica marchica Benick, 1954 23-.213-.006-.
 D.: Funde weit zerstreut.
 Westf.: ein einziger Fund.
 SBL: Wetter/Ruhr (Drees leg. 1997, CDH, DREES 1999).

Meotica exilis (Er., 1837) 23-.213-.019-.
 D.: in ganz Deutschland.
 Westf.: nur aus OWB keine Meldungen.
 An Feuchtstellen.
 DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

- WTL: Lippstadt (WESTHOFF 1881) - Münster (Kolbe leg., WESTHOFF 1881) - Münster (Peetz leg. 1936, PEETZ 1937, LMM) - Saerbeck/Ems (Peetz leg. 1936, PEETZ 1937, LMM) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1979, CRB, RENNER 1980) - Oerlinghausen: Senne (Grundmann leg. 1982, CGL).
- UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1963, CJB) - Holzhausen (Jankowski leg. 1975, CJB) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).
- SBL: Elberfeld (WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (WESTHOFF 1881) - Siegtal (Appel leg. 1947, MKB) - Erkrath (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Solingen (Modrow leg. 1961/64, MKB) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1962/63, KOCH i.l.) - Neandertal (Koch leg. 1964, KÖHLER 1993) - Hagen (Drees leg. 1979/87/93, CDH) - Solingen (KOLBE 1988, 1992) - Attendorn: Borghausen (Grundmann leg. 1991, CGL) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1992, WENZEL 1997) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1998, CWR).

Meotica exillima Shp., 1915

23-.213-.020-.

D.: im Norden und Westen, sonst zerstreut.

Westf.: nur in DGN und WTL.

Auf Feuchtwiesen, in Mooren.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, RENNER et al. 1986, GRUNDMANN 1991).

WTL: Gronau: Goorbach (Terlutter leg. 1993, CTM).

Meotica capitalis (Muls.Rey, 1873)

23-.213-.026-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: in fast allen Teilgebieten.

An Feuchtstellen.

WTL: Oelde (Dahms leg. 1933/35, LMM) - Klarholz (Dahms leg. 1934, LMM) - Dülmen (Hozman leg. 1977, CHE) - Münster (Terlutter leg. 1981, CTM) - Münster: Westbevern (Terlutter leg. 1986, CTM) - Münster: Davert (Feldmann leg. 1992, CFM) - Emsdetten: NSG Emsdettener Venn (Terlutter leg. 1996, CFM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1999, CRB).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. o.J., CJB) - Bad Salzufflen: Bexter Wald (Grundmann leg. 1980/81/82, CGL) - Bielefeld: Stedefreund (Grundmann leg. 1980, CGL) - Bielefeld: Brönninghausen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bielefeld: Teutobg. Wald (Pohl-Apel leg. 1985, POHL-APEL & RENNER 1987) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1987/98, CRB).

OWB: Lemgo (Grundmann leg. 1982, CGL).

SBL: Erkrath (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Neandertal (Koch leg. 1964, KÖHLER 1993, MKB) - Hilden (Koch leg. 1974, KOCH i.l.) - Breckerfeld (Drees leg. 1982, CDH) - Hagen (Drees leg. 1982/90, CDH) - Rade-

vormwald (Wenzel leg. 1986/87/88, WENZEL 1989) - Fredeburg: NSG Hunau (Terlutter leg. 1989, CTM) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1992, WENZEL 1997) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1992, CGL) - Wetter/Ruhr (Drees leg. 1993, CDH) - Witten/Ruhr (Drees leg. 1993, CDH).

Deubelia picina (Aubé, 1850)

23-.215-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

An Gewässerufern.

DGN: Hiller Moor (Renner, Grundmann leg. 1981, CRB, CGL) - Hiller Moor (Jankowski leg. 1982, CJB) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 1993, CTM).

WTL: Halle: Tatenhausen (Renner leg. 1979, CRB) - Münster-Handorf (Renner leg. 1983, CRB) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1983, CTM) - Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Gronau: NSG Amtsvenn (Terlutter leg. 1988, CTM) - Bokel/Ems (1989/91, WASNER i.l.) - Dortmund: Dellwig (Platzek leg. 1990, CHE).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1959, CJB, HORION 1967) - Barkhausen (Jankowski leg. 1969/70, CJB) - Holzhausen (Jankowski leg. 1974, CJB) - Bielefeld-Jöllennebeck (Renner leg. 1976/77, CRB) - Bad Salzufflen (Renner leg. 1978, CRB) - Herford: Herringhausen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bünde: Hücker Moor (Renner leg. 1992, CRB) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.).

OWB: Dörentrup (Renner leg. 1980, CRB) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1982, CJB) - Minden: Schaumburger Wald (Renner leg. 1983, CRB).

SBL: Hückeswagen (Eigen leg., MKB) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1957/59/60/62/63/64, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1958/63, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1958, KOCH i.l.) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1958/59/63, KOCH i.l.) - Breitscheid (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1959/60/64/65, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1959/63, KOCH i.l.) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1960/61/63, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1960/61/63, KOCH i.l.) - Mettmann: Schöller (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Gruiten (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1968/71, MKB) - Engelskirchen (Appel leg. 1971, MKB) - Westhofen (Drees leg. 1980/83/85/87, CDH) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1986, WENZEL 1989) - Hagen (Drees leg. 1987, CDH) - Herscheid (Grundmann leg. 1990/91, CGL) - Attendorf: Borghausen (Grundmann leg. 1991, CGL) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1991/92, WENZEL 1997) - Neuenrade: Altenaffeln (Grundmann leg. 1991, CGL) - Plettenberg (Grundmann leg. 1991, CFM) - Plettenberg (Erbeling leg. 1992, CErL) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1992, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1993, CWR).

Ocyusa maura (Er., 1837)

23-.216-.001-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

An Gewässerufern, in Mooren.

DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1980/82, CJB) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Feldmann leg. 1998, CFM) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 1998, CTM).

WTL: Lippstadt (Buddeberg leg., WESTHOFF 1881) - Oelde (DAHMS 1928) - Deuten (Hozman leg. 1980, CHE) - Rietberg (Hozman leg. 1980, CHE) - Gütersloh: Barrelpäule/Brockhagen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Gronau: Luchtbült (Terlutter leg. 1983, CTM) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1983, CTM) - Ahaus: Poiksbrook (Terlutter leg. 1990, CTM) - Ahaus: NSG Graeser Venn (Feldmann, Terlutter leg. 1996, CFM, CTM) - Münster: Westbevern (Köhler leg. 1997, CKB, KÖHLER 2000).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1952, CJB) - Holzhausen (Jankowski leg. 1960/75, CJB) - Bad Salzuflen (Renner leg. 1976/78, CRB).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1966/80/81/82, CJB).

SBL: Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1958/63, KOCH i.l.) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Hohenlimburg (Drees leg. 1995, CDH) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1998, CWR).

Ocyusa nitidiventris Fagel, 1958

23-.216-.003-.

D.: nur aus wenigen Gebieten gemeldet.

Westf.: nur zwei Meldungen.

UWB: Osnabrück (Klaas leg. 1992, KACHE i.l.).

SBL: Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993).

Zoosetha inconspicua (Er., 1839)

23-.218-.002-.

D.: Baden und Ostdeutschland, sehr alte Funde aus dem Nordwesten.

Westf.: nur ein sehr alter Fund.

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968).

Mniusa incrassata (Muls.Rey, 1852)

23-.219-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

In der Bodenstreu von Wäldern.

DGN: Hartum (Jankowski leg. 1974, CJB) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Dortmund (WESTHOFF 1881) - Coesfeld (Hozman leg. 1975, CHE) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1979, CRB, RENNER 1980) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1985, CTM) - Münster: Gimfte (Feldmann leg. 1988, CFM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1990, CRB) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1993, CRE).

- UWB: Mennighüffen (Barner leg. 1911, LMM, BARNER 1922, PEETZ 1931) - Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935, LMM) - Porta Westf. (Jankowski leg. 1954, CJB) - Barkhausen (Jankowski leg. 1966, CJB) - Bielefeld: Lämershagen (Renner leg. 1978, CRB) - Bad Salzufflen: Bexter Wald (Grundmann leg. 1982, CGL) - Detmold: Donoper Teiche (Grundmann leg. 1982, CGL).
- OWB: Klein Möllenbeck (Jankowski leg. 1960/61/67/77 Nammener Wald (Jankowski leg. 1974/79/80, CJB) - Schwaney/Egge (Grundmann leg. 1985/86, CGL) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).
- SBL: Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Hückeswagen (Eigen leg., MKB) - Ratingen (Koch leg. 1956/59/61/63, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1958/60, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Engelskirchen (Appel leg. 1973, MKB) - Hagen (Drees leg. 1979/88/93/95, CDH) - Solingen (KOLBE 1981, 1984a, 1984b, 1984c, 1987, 1988, 1992) - Breckerfeld (Drees leg. 1982, CDH) - Hilchenbach (Grundmann leg. 1983/84/85/86, CGL) - Schmallenberg: Härdler (Terlutter leg. 1983, CTM) - Schmallenberg: Aberg (Grundmann leg. 1985/86, CGL) - Schmallenberg: Hunau (Grundmann leg. 1985/86/87/88, CGL) - Hückeswagen (Wenzel leg. 1986, CWR) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/87/88, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1987/90/91, WENZEL 1989) - Gummersbach: Wiehl (Gerhard leg. 1988, CGR) - Olpe: Reichshof (Gerhard leg. 1988, CGR) - Fredeburg: NSG Hunau (Terlutter leg. 1989, CTM) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1989, CGL) - Marienheide/Gimborn (Wenzel leg. 1990, CWR) - Wipperfürth (Wenzel leg. 1990, CWR) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Much: Herrensee (Wenzel leg. 1991, CWR) - Much (Wenzel leg. 1991, CWR) - Radevormwald (Wenzel leg. 1991/92/93, CWR) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Wuppertal (KOLBE 1994, 1996) - Waldbröl (Köhler leg. 1996, CKB).

Hygropora cunctans (Er., 1837) 23-221-.002-.

D.: hauptsächlich im Norden und Osten.

Westf.: keine Meldung.

Oxypoda lugubris Kr., 1856 23-223-.001-.

D.: Süden, Osten und Westfalen.

Westf.: nur ein Fund.

SBL: Winterberg: Negertal (Giers leg. 1997, CTM).

Oxypoda elongatula Aubé, 1850 23-223-.002-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

In Sümpfen und Mooren.

DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1955/57/82, CJB) - Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991).

- WTL: Oelde (Dahms leg. 1926, LMM) - Dortmund (Appel leg. 1969, MKB) - Senne: Stukenbrock (Renner leg. 1976, CRB) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1977, CRB) - Deuten (Hozman leg. 1978, CHE) - Tatenhausen/Halle (Renner leg. 1979, CRB) - Haltern (Hozman leg. 1980, CHE) - Gütersloh: Barrelpäule/Brockhagen (Grundmann leg. 1981, CGL) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1983, CTM) - Münster: Rieselfelder Münster (Terlutter leg. 1987, CTM) - Gronau: NSG Amtsvenn (Feldmann leg. 1989, CFM) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1990, CRB) - Ahlen-Dolberg (Röwekamp leg. 1994, CRE) - Ahaus: NSG Graeser Venn (Feldmann leg. 1996, CFM) - Vreden: Zwillbrocker Venn (Feldmann leg. 1996, CFM) - Münster: Westbevern (Köhler leg. 1997, CKB, KÖHLER 2000).
- UWB: Preuß. Oldendorf (PEETZ 1931) - Porta Westf. (Jankowski leg. 1965, CJB) - Holzhausen (Jankowski leg. 1970, CJB) - Bielefeld-Jöllenebeck (Renner leg. 1976, CRB) - Herford: Herringhausen (Grundmann leg. 1981/82, CGL) - Leopoldshöhe (Grundmann leg. 1981, CGL) - Bad Salzuffen: Bexter Wald (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 2000, CRB).
- OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1962/74/80/81/82, CJB) - Lemgo: Lattberg (Grundmann leg. 1981, CGL) - Lichtenau (Braun leg. 1982/92, CBP).
- SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Düsseldorf: zahlreich (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1968, MKB) - Hagen (Drees leg. 1979/82, CDH) - Witten: Herdecke (Drees leg. 1983, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1985/86/87, WENZEL 1989) - Olpe: Reichshof (Gerhard leg. 1987/88, CGR) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Herscheid (Grundmann leg. 1990/91, CGL) - Neuenrade: Altenaffeln (Grundmann leg. 1990/91, CGL) - Plettenberg: Eiringhausen (Grundmann leg. 1990/91, CGL) - Plettenberg (Erbeling leg. 1990, CErL) - Plettenberg: Pasel (Grundmann leg. 1990, CGL) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1990/92, CGL) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1991/92, WENZEL 1997) - Much: Herrensee (Wenzel leg. 1991, CWR) - Much (Wenzel leg. 1991, CWR) - Plettenberg: Almecke (Grundmann leg. 1991, CGL) - Altenkirchen (WAGNER 1992) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992/93, CWR) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1998, CWR).

Oxypoda procerula Mannh., 1830

23-.223-.003-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen allen Teilgebieten außer UWB.

In Sümpfen und Mooren.

- DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1980, CJB) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 1992, CTM).

- WTL: Oelde (Dahms leg. 1926, DAHMS 1928) - Schloß Holte-Stukenbrock (Renner leg. 1975, CRB) - Saerbeck/Ems: NSG Hanfteich (Rehage leg. 1977, CRD) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1983, CTM) - Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Bokel/Ems (1989/91, WASNER i.l.).
- OWB: Körbecke (Kroker leg. 1978/79, KROKER 1981, KROKER & RENNER 1983) - Lichtenau (Braun leg. 1982, CBP).
- SBL: Solingen (Modrow leg. 1964, KOCH 1968, MKB) - Westhofen (Drees leg. 1981, CDH) - Hagen (Drees leg. 1982, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1983/86/91, WENZEL 1991) - Hückeswagen (Wenzel leg. 1986, WENZEL 1991) - Much: Herrensee (Wenzel leg. 1991, WENZEL 1991) - Radevormwald (Wenzel leg. 1991/93, CWR) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1992, WENZEL 1997) - Herscheid (Feldmann leg. 1998, CFM).

Oxypoda opaca (Grav., 1802)

23-223-.004-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

- DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1954, CJB) - Hartum (Jankowski leg. 1972/76/77/79/81, CJB).
- WTL: Lette, Oelde, Wadersloh (DAHMS 1928) - Wiedenbrück: Langenberg (Rehage leg., CRD, REHAGE 1972) - Salzkotten: Sültsoid (Wasner leg. 1982, WASNER i.l.) - Münster: Handorf (Terlutter leg. 1986, CTM) - Münster (Feldmann leg. 1988, CFM) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Lüdinghausen: Olfen (Terlutter leg. 1992, CTM) - Münster: Sprakel (Feldmann leg. 1992, CFM) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1993, CRB) - Ahlen-Dolberg (Röwekamp leg. 1995, CRE) - Münster: Nienberge (Feldmann leg. 1995, CFM) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1996, CRB) - Beckum (Renner leg. 1999, CRB).
- UWB: Mennighüffen (Barner leg., BARNER 1922, PEETZ 1931) - Preuß. Oldendorf (PEETZ 1931; Peetz leg. 1934/35/36, LMM) - Porta (Peetz leg. 1935/37, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1954/64/70/75/78, CJB) - Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1975/76/77, CRB, RENNER 1981b) - Bielefeld (SPÄH 1980) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/86/98/99/2000, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995) - Osnabrück (Klaas leg. 1992, KACHE i.l., Kache leg. 1992/93/94, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 2000, CRB).
- OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1956/63/65/75/76/80/81, CJB) - Körbecke (Kroker leg. 1978/79, KROKER & RENNER 1983) - Lage: Hardisser Moor (Renner leg. 1980, CRB) - Paderborn: Benhausen (Braun leg. 1982, CBP) - Büren (Terlutter leg. 1986, CTM) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91/92, CWB) - Paderborn: Kirchborchen (Braun leg. 1992, CBP) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).
- SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884) - Witten (FÜGNER 1902) - Overath (Schneider leg. 1929, MKB) - Benrath (Eigen leg., MKB) - Hückeswagen (Eigen leg., MKB) - Düsseldorf: zahlreich (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) -

Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1968, MKB) - Lüderich/Sülz (Appel leg. 1971, MKB) - Wuppertal: Krutscheid (KOLBE 1971) - Hagen (Drees leg. 1976/82, CDH) - Werl: Siddinghausen (Terlutter leg. 1981, CTM) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1984, WENZEL 1989) - Solingen (KOLBE 1987, 1992) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Schwerte (Drees leg. 1991, CDH) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel, Lappann leg. 1998, CWR).

Oxypoda longipes Muls.Rey, 1861

23-.223-.006-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1955/81, CJB) - Hartum (Jankowski leg. 1971/75/76/77/79/81, CJB) - Häverner Marsch (Grundmann leg. 1982, CGL).

WTL: Bochum (Hozman leg. 1971, CHE) - Dorsten (Hozman leg. 1973, CHE) - Gütersloh: Verl (Renner leg. 1975, CRB) - Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Warendorf (Starke leg. 1988, CSW) - Münster: Davert (Feldmann leg. 1989, CFM) - Münster: Gimfte (Feldmann leg. 1989, CFM) - Bokel/Ems (1991, WASNER i.l.) - Ahlen (Röwekamp leg. 1992, CRE) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1998, CRB).

UWB: Eickum (Barner leg. 1934, LMM) - Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1936, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1967/75, CJB) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Bad Salzuflen: Bexter Wald (Grundmann leg. 1982, CGL) - Leopoldshöhe (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/85/89/99, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1992, KACHE 1998).

OWB: Körbecke (Kroker leg. 1978/79, KROKER 1981, KROKER & RENNER 1983) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1979/80, CJB) - Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1982, CRB) - Schlangen (Braun leg. 1983, CBP) - Lichtenau: Geimer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Warburg: Weldaer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91, CWB) - Kohlstädt (Braun leg. 1992, CBP).

SBL: Hückeswagen (Eigen leg., MKB) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1957/67, MKB) - Erkrath (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Mettmann: Schöller (Koch leg. 1967, KOCH i.l.) - Engelskirchen (Appel leg. 1972, MKB) - Hönnetal (REHAGE & FELDMANN 1977) - Hagen (Drees leg. 1979/82/90, CDH) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1986/87, WENZEL 1989) - Neuenrade: Borke (Grundmann leg. 1990, CGL) - Plettenberg: Pasel (Grundmann leg. 1990, CGL) - Schmallenberg (Grundmann leg. 1990, CGL) - Werdohl: Neuenrade (Erbeling leg. 1990, CERL) - Hagen: Garenfeld (Drees leg. 1993, CDH) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Lappann leg. 1999, CWR).

Oxypoda vittata Märk., 1842

23-.223-.007-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Hartum (Jankowski leg. 1982, CJB).

WTL: Dortmund (WESTHOFF 1881) - Lipstadt (WESTHOFF 1881) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1977/78, CRB, RENNER 1980) - Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1991/93/94/97, CRE) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993, CRB) - Ahaus: Butenfeld (Terlutter leg. 1994, CTM) - Ahaus: Schöppingen (Terlutter leg. 1994, CFM) - Beckum (Renner leg. 1999, CRB).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1968/76/78/79, CJB) - Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1975, CRB, RENNER 1981b) - Barkhausen (BORCHERDING leg., BORCHERDING 1994) - Minden: Weserufer (Renner leg. 1995, CRB).

OWB: Klein Möllenbeck (Jankowski leg. 1967, CJB) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1975/76/77/78, CJB) - Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1981, CRB) - Neuenbeken (Braun leg. 1981, CBP) - Warburg: Hellberg/Scherfede (Renner leg. 1981/82, CRB) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1982, CRB) - Diemeltal: Lamerden (Renner leg. 1982, CRB) - Schwaney/Egge (Grundmann leg. 1985, CGL) - Eggegebirge: Schwaney (Terlutter leg. 1986, CTM) - Lichtenau: Geimer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Scherfede: Scheffelberg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Warburg: Weldaer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91/92, CWB) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1993/94, CFM, FELDMANN & LÜCKMANN 1998).

SBL: Hilchenbach (WESTHOFF 1881) - Siegen (WESTHOFF 1881) - Elberfeld (CORNELIUS 1884) - Witten (FÜGNER 1902) - Overath (Rüschkamp leg. 1929, MKB) - Imhausen/Sieg (Appel leg. 1948, MKB) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Wuppertal (KOLBE & HOUVER 1973, KOLBE 1973, 1978, 1994, 1996) - Engelskirchen (Appel leg. 1978, MKB) - Schmallenberg: Härdler (Terlutter leg. 1982, CTM) - Hagen (Drees leg. 1983, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1983, WENZEL 1989) - Wuppertal (KOLBE 1984c) - Schmallenberg: Hunau (Grundmann leg. 1985, CGL) - Iserlohn (Erbeling leg. 1986, ERBELING & DREES 1992) - Letmathe (Erbeling leg. 1986, CERL) - Plettenberg (Erbeling leg. 1987, CERL) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1987, CGL) - Glör-Talsperre (Drees leg. 1988, CDH) - Hohenlimburg (Drees leg. 1988, CDH) - Hückeswagen (Wenzel leg. 1988, CWR) - Solingen (KOLBE 1988, 1992) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Wiblingwerde (Drees leg. 1990, CDH) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Plettenberg: Pasel (Grundmann leg. 1991, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1991/92, CWR, WENZEL 1994) - Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Letmathe (ERBELING & DREES 1992) - Westerwald: Altenkirchen (WAGNER 1992) - Wissen/Sieg: Gebhardshain (WAGNER 1992) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Lappann leg. 1997, CWR).

Oxypoda acuminata (Steph., 1832)

23-223-009-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen allen fünf Teilgebieten, sehr häufig.

Oxypoda spectabilis Märk., 1844

23-.223-.010-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Hartum (Jankowski leg. 1980, CJB) - Eldagsen (BARNER 1922) - Petershagen (Barner leg. 1930, LMM).

WTL: Soest (VERHOEFF 1890) - Ahlen (Röwekamp leg. 1991, CRE).

UWB: Preuß. Oldendorf (PEETZ 1931) - Porta Westf. (Jankowski leg. 1954, CJB) - Barkhausen (Jankowski leg. 1959/61/75/77, CJB) - Bielefeld (SPÄH 1980) - Halle: Jakobsberg (Rehage, Renner leg. 1980, CRD, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).

OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Eldagsen (Barner leg., PEETZ 1931) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1979, CJB) - Schlangen (Braun leg. 1983, CBP) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91/92, CWB) - Godelheim/Weser (Terlutter leg. 1991, CTM).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Solingen (Gräf leg. 1961, KOCH 1968) - Hückeswagen (Eigen leg., KOCH 1968, MKB) - Altena: NSG Nordhelle (Rehage leg. 1973, CRD) - Hönnetal (REHAGE & FELDMANN 1977) - Wuppertal (Thiele leg., MKB, KÖHLER 1993; Pospischil leg. 1977, POSPISCHIL 1981, KOCH 1992) - Rothaargebirge: Hårdler (Terlutter leg. 1982, CFM) - Schmalleberg: Hårdler (Terlutter leg. 1982, CTM) - Radevormwald (Wenzel leg. 1985/87/89, WENZEL 1989, 1991, KOCH 1992) - Iserlohn (Erbeling leg. 1986, ERBELING & DREES 1992) - Hagen (Drees leg. 1987, CDH) - Schmalleberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1987, CGL) - Burscheid (Kolbe leg. 1986, KOLBE & BRUNS 1988, KOCH 1992, KÖHLER 1997a) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Hückeswagen (Wenzel leg. 1990, WENZEL 1991) - Sundern: Amecke (Grundmann leg. 1990, CGL) - Letmathe (ERBELING & DREES 1992) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992, CWR, WENZEL 1994) - Borchen: Südlohn (Terlutter leg. 1993, CFM) - Brenscheid (Drees leg. 1994, CDH) - Menden: Hönnetal (Feldmann leg. 1994, CFM) - Wuppertal (KOLBE 1996) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel, Lappann leg. 1998, CWR).

Oxypoda funebris Kr., 1856

23-.223-.012-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: nur aus SBL gemeldet.

SBL: Halver/Ennepe (Drees leg. 1990/91, CDH, DREES 1996) - Herscheid: Becke (Grundmann leg. 1988, CGL) - Meinerzhagen: Valbert/Ebbegebirge (Grundmann leg. 1988, CGL) - Olpe: Reichshof (Gerhard leg. 1988/94/95, CGR) - Fredeburg: NSG Hunau (Terlutter leg. 1989, CTM) - Neuenrade: Altenaffeln (Grundmann leg. 1990/91, CGL) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1990/92, CGL) - Werdohl: Neuenrade (Erbeling leg. 1991, CErL) - Olpe: Drolshagen (Gerhard leg. 1995, GERHARD 1997).

Oxypoda lentula Er., 1837

23-.223-.013-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: nur WTL und SBL.

WTL: Oelde (Dahms leg. 1935, LMM) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1985, CTM) - Emsdetten: NSG Emsdettener Venn (Terlutter leg. 1996, CFM).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Hagen (Drees leg. 1988, CDH) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1992, WENZEL 1997).

Oxypoda induta Muls.Rey, 1861

23-.223-.014-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Hartum (Jankowski leg. 1970, CJB).

WTL: Münster (Feldmann leg. 1990, CFM).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1936, LMM) - Holzhausen/Porta Westf. (Jankowski leg. 1961, CJB, HORION 1967) - Barkhausen (Jankowski leg. 1971/75/76/77, CJB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Kache leg. 1992/93, KACHE 1998).

OWB: Minden: Lahde (Jankowski leg. 1984, CJB) - Lage (Grundmann leg. 1982, CGL, RENNER & GRUNDMANN 1984).

SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Solingen (Modrow leg. 1950, KOCH 1968, MKB) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1957, KOCH 1968) - Hückeswagen (Eigen leg., KOCH 1968, MKB) - Radevormwald (Wenzel leg. 1984/85/86, WENZEL 1989, KOCH 1992) - Hagen: Hengsteysee (Drees leg. 1990, CDH) - Attendorn: Borghausen (Grundmann leg. 1991, CGL) - Finnentrop: Ostentrop (Grundmann leg. 1991, CGL) - Plettenberg: Pasel (Grundmann leg. 1991, CGL) - Plettenberg: Thereck (Grundmann leg. 1991, CGL).

Oxypoda skalitzkyi Bernh., 1902

23-.223-.015-.

D.: im Süden und Westen.

Westf.: nur UWB und SBL.

UWB: Bielefeld (Grundmann leg. 1981, CGL, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Grundmann leg. 1981, CGL).

SBL: Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1987, CGL) - Finnentrop-Wildewiese (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg-Selscheid (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Sundern: Röhrenspring (Grundmann leg. 1991, CGL).

Oxypoda brevicornis (Steph., 1832)

23-.223-.018-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: überall sehr häufig.

- Oxypoda doderoi* Bernh., 1902 23-.223-.021-
D.: zerstreut im Süden und Westen.
Westf.: nur ein Fund.
UWB: Barkhausen (Jankowski leg., CJB, RENNER 1997a).
- Oxypoda carbonaria* (Heer, 1841) 23-.223-.022-
D.: im Norden und Osten fehlend.
Westf.: verbreitet, aus WTL nicht gemeldet.
DGN: Hartum (Jankowski leg. 1981, CJB).
UWB: Bünde: Doberg (PEETZ 1931) - Preuß. Oldendorf (PEETZ 1931; Peetz leg. 1934, LMM) - Holzhausen (Jankowski leg. 1975, CJB) - Barkhausen (Jankowski leg. 1976, CJB).
OWB: Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1992, CRB).
SBL: Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1958, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1967, KOCH i.l.) - Solingen (KOLBE 1981, 1984a, 1988, 1992) - Hagen (Drees leg. 1983/96, CDH) - Neheim-Hüsten: Herdringen (Grundmann leg. 1991, CGL) - Wuppertal (KOLBE 1996).
- Oxypoda vicina* Kr., 1856 23-.223-.023-
D.: fast in ganz Deutschland.
Westf.: nur wenige Funde.
WTL: Warendorf (Dahms leg. 1933, HORION 1967).
SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Radevormwald (Wenzel leg. 1981/83, WENZEL 1989).
- Oxypoda abdominalis* (Mannh., 1830) 23-.223-.024-
D.: fast in ganz Deutschland.
Westf.: nur zwei Funde.
WTL: Harsewinkel (Dahms leg. 1933, LMM).
SBL: Düsseldorf-Eller (Koch leg. 1964, KOCH i.l.)
Porta Westf. (Jankowski leg., HORION 1967): Fehlbestimmung.
- Oxypoda rufa* Kr., 1856 23-.223-.025-
D.: fast in ganz Deutschland.
Westf.: wenige Funde.
UWB: Bielefeld (Pohl-Apel leg. 1985, CRB, POHL-APEL & RENNER 1987, RENNER 1991).
SBL: Winterberg: Siedlinghausen (Rehage leg. 1974, CRB) - Schmallebenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1987, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL).

Oxypoda togata Er., 1837

23-.223-.029-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: nur eine alte Meldung.

SBL: Witten (FÜGNER 1902).

Oxypoda exoleta Er., 1839

23-.223-.030-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Häverner Marsch (Grundmann leg. 1982, CGL).

WTL: Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1978, CRB, RENNER 1980) - Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Warendorf (Starke leg. 1988/90/92, CSW) - Münster: Handorf (Terlutter leg. 1989, CTM) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1993/95/96/99, CRB).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg., LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1975, CJB; Renner leg. 1983, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1987, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Klaas leg. 1992, KACHE i.l., Kache leg. 1992/93/94, KACHE 1998) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1967, CJB) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1980/81/83, CRB) - Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1982, CRB, RENNER 1985) - Brakel: Nethe-Tal (Renner leg. 1983, CRB) - Lichtenau: Geimer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Marsberg: Dahlberg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Höxter (Gerken leg. 1989, ASSING i.l.) - Lichtenau: Altenau-Tal (Grundmann leg. 1989, CGL) - Scherfede: Hardehausen (Grundmann leg. 1989, CGL) - Beverungen (Figura leg. 1990, ASSING i.l.).

SBL: Dornap: Schöller (Koch leg. 1967, KOCH 1968) - Hagen (Drees leg. 1982/92, CDH) - Arolsen (Renner leg. 1986, CRB) - Attendorn: Repe-tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop-Wildewiese (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Dahlerbrück/Volme (Drees leg. 1989, CDH) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Neheim-Hüsten: Herdringen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1990, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Wetter/Ruhr (Drees leg. 1993, CDH) - Unna: Geisecke (Flake leg. 1996, CFM) - Wuppertal (KOLBE 1996).

Burscheid (Kolbe leg. 1986, KOLBE & BRUNS 1988): Fehldetermination (KÖHLER 1997).

Oxypoda formosa Kr., 1856

23-.223-.032-.

D.: im Norden und Osten fehlend

Westf.: nur ein sehr alter Fund.

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., MKB; CORNELIUS 1884, WESTHOFF 1886, KOCH 1968).

- Oxypoda arborea* Zerche, 1994 (= *Lucens* FHL) 23-.223-.0331.
 D.: Rheinland, Niedersachsen, Thüringen.
 Westf.: kein Fund.
 Preuß. Oldendorf (PEETZ 1931): Fehlbestimmung (HORION 1967).
- Oxypoda alternans* (Grav., 1802) 23-.223-.034-.
 D.: in ganz Deutschland.
 Westf.: in allen allen fünf Teilgebieten, sehr häufig.
- Oxypoda lurida* Woll., 1857 23-.223-.035-.
 D.: westliches Deutschland.
 Westf.: nur drei Funde.
 UWB: Osnabrück (Klaas leg. 1992, LMM, Kache leg. 1993, CFM, KACHE 1998).
 SBL: Hagen (Drees leg. 2000, CDH).
- Oxypoda praecox* Er., 1839 23-.223-.036-.
 D.: fast in ganz Deutschland.
 Westf.: wenige Meldungen aus fast allen Teilgebieten.
 DGN: Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).
 WTL: Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.).
 UWB: Osnabrück (Klaas leg. 1992, KACHE i.l.) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).
 SBL: Mettmann: Schöller (Koch leg. 1967, KOCH i.l.) - Wetter/Ruhr (Drees leg. 1993, CDH).
- Oxypoda rugulosa* Kr., 1856 23-.223-.038-.
 D.: mittleres Deutschland, nach Osten seltener.
 Westf.: keine Meldung.
- Oxypoda mutata* Sharp, 1871 23-.223-.041-.
 D.: im Süden, sonst zerstreute Funde.
 Westf.: aus DGN, OWB nicht gemeldet.
 WTL: Senne: Stapelage (Grundmann leg. 1982, CGL) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1993, CRB).
 UWB: Halle (Grundmann leg. 1981, CGL, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Bielefeld (Grundmann leg. 1982, CGL, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Lengerich (Feldmann leg. 1997, CFM) - Detmold: Lippischer Wald (Renner leg. 2000, CRB).
 SBL: Hilden (Koch leg. 1961, KOCH i.l.).
- Oxypoda testacea* Er., 1837 23-.223-.043-.
 D.: im Osten, sonst zerstreute Funde.
 Westf.: keine Meldung.

Oxypoda miranda Roub., 1929

23-.223-.044-.

D.: Hessen, im Norden, Osten; sehr zerstreut.

Westf.: keine Meldung.

Oxypoda brachyptera (Steph., 1832)

23-.223-.046-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Hartum (Jankowski leg. 1968/79, CJB) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 1998, CTM).

WTL: Dülmen: Groß Reken (Hozman leg. 1974, CHE) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1978, CRB, RENNER 1980) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1985, CRB, RENNER 1987) - Haltern (Ahrens leg. 1991, KÖHLER i.l.) - Lüdinghausen: Olfen (Terlutter leg. 1992, CTM).

UWB: Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1988, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995) - Osnabrück (Klaas leg. 1992, KACHE i.l., Kache leg. 1992/93/94, KACHE 1998) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1998, CRB).

OWB: Paderborn: Ziegenberg (Renner leg. 1983, CRB, RENNER 1985) - Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1980, CRB) - Diemeltal: Lamerden (Renner leg. 1981, CRB) - Willebadessen: Georgsberg (Renner leg. 1983, CRB) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1992/93/94, CFM, FELDMANN & LÜCKMANN 1998).

SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884, WESTHOFF 1886, GEILENKEUSER 1896, KOCH 1968) - Elberfeld (Cornelius leg., MKB) - Witten (FÜGNER 1902) - Breitscheid (Koch leg. 1958, KOCH i.l.) - Unna: Geisecke (Flake leg. 1996, CFM).

Oxypoda tarda Shp., 1871

23-.223-.047-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: verbreitet, aber selten.

DGN: Häverner Marsch (Grundmann leg. 1982, CGL) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.).

UWB: Osnabrück (Kache leg. 1994, KACHE 1998) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.).

OWB: Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1981, CRB) - Lichtenau: Geimer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Höxter (Gerken leg. 1989, ASSING i.l.) - Beverungen (Figura leg. 1990, CAH, ASSING i.l.) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990, CWB) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1992, CFM, FELDMANN & LÜCKMANN 1998).

SBL: Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Burscheid (Kolbe leg. 1986, KOLBE & BRUNS 1988, KOCH 1992, KÖHLER 1997) - Wetter/Ruhr (Drees leg. 1992, CDH).

- Oxypoda annularis* Mannh., 1830 23-.223-.049-
D.: in ganz Deutschland.
Westf.: sehr zahlreiche Meldungen, häufig.
Ubiquist in faulenden Substraten.
- Oxypoda flavicornis* Kr., 1856 23-.223-.050-
D.: fast in ganz Deutschland.
Westf.: in allen fünf Teilgebieten.
DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1955, CJB) - Hartum (Jankowski leg. 1981, CJB).
WTL: Oelde (Dahms leg. 1924, DAHMS 1928; Dahms leg. 1935, LMM) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB).
UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1976/77, CJB) - Bielefeld: Jöllenbeck (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1994, CRB).
OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1979, CJB).
SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Witten (FÜGNER 1902) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1984, WENZEL 1989) - Plettenberg (Hellweg leg. 1985, CHF) - Meinerzhagen: Fürwigge-Talsperre (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Eiringhausen (Grundmann leg. 1989, CGL) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel, Lappann leg. 1997/98/99, CWR) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1999, CWR).
- Oxypoda filiformis* Redt., 1849 23-.223-.052-
D.: hauptsächlich im Süden und Osten.
Westf.: kein Nachweis.
UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg., PEETZ 1931, HORION 1967, LMM): Fehlbestimmung, Belege gehören zu *O. exoleta*.
- Oxypoda ferruginea* Er., 1839 23-.223-.053-
D.: im Süden, sonst zerstreute Funde.
Westf.: nur alte Meldungen.
OWB: Karlshafen (Folwaczny leg., HORION 1967).
SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Barmen (KOCH 1968).
- Oxypoda nigrocincta* Muls.Rey, 1875 23-.223-.054-
D.: im Süden und Westen, sonst zerstreute Funde.
Westf.: wenige Funde.
UWB: Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).
OWB: Beverungen (Figura leg. 1990, CAH, ASSING i.l.).
SBL: Attendorn: Borghausen (Grundmann leg. 1991, CGL) - Neuenrade: Affeln (Grundmann leg. 1991, CGL) - Altenhundem: Lenne (Grund-

mann leg. 1992, CGL) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1992, WENZEL 1997).

Oxypoda soror Thoms., 1855 23-.223-.055-.

D.: im Süden und Osten, sonst zerstreute Funde.

Westf.: wenige Funde aus OWB.

OWB: Körbecke (Kroker leg. 1978, KROKER & RENNER 1983) - Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1981, CRB, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Marsberg: Dahlberg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Warburg: Weldaer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1993, FELDMANN & LÜCKMANN 1998).

Oxypoda formiceticola Märk., 1841 23-.223-.057-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: bisher nur UWB, SBL.

Myrmecophil, bei *Formica*.

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935, LMM) - Melle (PEETZ 1936) - Barkhausen (Jankowski leg. 1959/65, CJB, RENNER 1997b).

SBL: Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Elberfeld (GEILENKEUSER 1896) - Witten (FÜGNER 1902) - Overath (Rüschkamp leg. 1929, MKB) - Hagen (Drees leg. 1977/87, CDH) - Engelskirchen (Appel leg. 1979, MKB) - Hückeswagen (Wenzel leg. 1989, CWR) - Plettenberg: Leinschede (Grundmann leg. 1990, CGL) - Ennepetal (Drees leg. 1993, CDH) - Hohenlimburg (Drees leg. 1996, CDH) - Remscheid (Wenzel leg. 1996, CWR) - Westhofen (Drees leg. 1999, CDH).

Oxypoda pratensisicola Lohse, 1967 23-.223-.0571.

D.: zerstreut im Süden, Norden, Osten.

Westf.: keine Meldung.

Bei *Formica pratensis*.

Oxypoda recondita Kr., 1856 23-.223-.058-.

D.: vom Niederrhein über Holstein bis Sachsen, sonst zerstreute Funde.

Westf.: nur wenige Meldungen.

DGN: Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 1998, CTM).

WTL: Dülmen (Hozman leg. 1975, CHE).

UWB: Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995).

SBL: Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1957, KOCH 1968).

Oxypoda bicolor Muls.Rey, 1853 23-.223-.059-.

D.: bis auf den Norden weit verbreitet.

Westf.: wenige Funde aus SBL.

SBL: Meinerzhagen: Valbert/Ebbegebirge (Rehage leg. 1974, CRD) - Ramsbeck/Meschede: NSG Plästerlegge (Rehage leg. 1974, CRD) - Herscheid: Becke (Grundmann leg. 1988, CGL) - Winterberg: Hallenberg

(Hellweg leg. 1988, CHD, CTM) - Hallenberg (Feldmann leg. 1990, CFM).

Oxypoda haemorrhoea (Mannh., 1830)

23-.223-.060-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

DGN: Hartum (Jankowski leg. 1973/77/78, CJB) - Hiller Moor (Jankowski leg. 1979/80, CJB) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Dortmund (Appel leg. 1968, MKB) - Vreden: NSG Ellewicker Feld (Terlutter leg. 1982, CTM) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Gronau: NSG Amtsvenn (Feldmann leg. 1989, CFM) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1989, CTM) - Hövelhof/Senne (Renner leg. 1990, CRB) - Haltern (Ahrens leg. 1991, KÖHLER i.l.) - Ahaus: Schöppingen (Terlutter leg. 1994, CFM) - Münster: Nienberge (Feldmann leg. 1995, CFM).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935, LMM) - Melle (PEETZ 1936) - Barkhausen (Jankowski leg. 1974/76, CJB) - Bielefeld: Hoberge-Uerentrup (Renner leg. 1978, CRB, RENNER 1981b) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Oerlinghausen: Teutoburger Wald (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Oerlinghausen (Renner leg. 1983, CRB) - Bielefeld: Stadtgebiet (Renner leg. 1985, CRB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1989, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Kache leg. 1992/93/94, KACHE 1998).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1979, CJB) - Warburg: Hellberg/Scherfede (Renner leg. 1983, CRB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Elberfeld (GEILENKEUSER 1896) - Witten (FÜGNER 1902) - Hückeswagen (Kirch leg. 1919, MKB) - Overath (Rüschkamp leg. 1929, MKB) - Benrath (Eigen leg., MKB) - Hilden (Koch leg. 1957/64, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Mettmann: Schöller (Koch leg. 1962/67, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1966/67, KOCH i.l.) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1968, MKB) - Hagen (Drees leg. 1983/92/93, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1983, CWR) - Finnentrop-Wildewiese (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Plettenberg: Leinschede (Grundmann leg. 1990, CGL) - Attendorn: Borghausen (Grundmann leg. 1991, CGL) - Finnentrop: Ostentrop (Grundmann leg. 1991, CGL) - Waldbröl (Köhler leg. 1996, CKB) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Wenzel, Lappann leg. 1998, CWR).

Devia prospera (Er., 1839)

23-.225-.001-.

D.: zerstreut im Osten und Süden.

Westf.: nur drei alte, unbelegte und wohl unrichtige Meldungen.

UWB: Eickum (Barner leg., PEETZ 1931).

OWB: Paderborn: Wewer (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881, HORION 1967).

SBL: Witten (FÜGNER 1902).

Stichoglossa semirufa (Er., 1839) 23-.227-.001-.
D.: fast in ganz Deutschland.
Westf.: wenige, zerstreute Funde.
WTL: Coesfeld: Baumberge (Ribbrock leg. 1998, CFM).
UWB: Osnabrück (Kache leg. 1993, KACHE 1998).
OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1975/78, CJB, RENNER 1997a).
SBL: Hagen (Drees leg. 1998, CDH).

Ischnoglossa prolixa (Grav., 1802) 23-.228-.001-.
D.: in ganz Deutschland.
Westf.: in allen fünf Teilgebieten.
Unter morschen Rinden.
DGN: Hartum (Jankowski leg. 1977, CJB) - Hiller Moor (Jankowski leg. 1980, CJB) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 1994, CTM).
WTL: Münster (Kolbe leg., WESTHOFF 1881) - Münster-Havighorst (Schmidt leg. 1918, LMM) - Sünninghausen (Dahms leg. 1923, DAHMS 1928) - Essen: Frintrop (Hozman leg. 1970, CHE) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1975, CRB) - Vreden (Terlutter leg. 1983, CTM) - Münster: Davert (Terlutter leg. 1990, CTM) - Telgte (Starke leg. 1990, CSW) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1991/97/99, CRB).
UWB: Mennighüffen (Barner leg. 1911, BARNER 1922, PEETZ 1931, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1950/65/67/76/78/79, CJB) - Holzhausen (Jankowski leg. 1968, CJB) - Bad Salzuflen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1988/98, CRB) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995) - Barkhausen (Borcharding leg., BORCHARDING 1994) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 2000, CRB).
OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1956/75, CJB) - Klein Möllenbeck (Jankowski leg. 1960/77, CJB) - Paderborn: Benhausen (Braun leg. 1982, CBP) - Porta Westfalica (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bad Lippspringe (Braun leg. 1983, CBP).
SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1956, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Solingen: Ohligs (Koch leg. 1962, KOCH i.l.) - Langenberg (Wenzel leg. 1975, CWR) - Hagen (Drees leg. 1976/77/87/88, CDH) - Herdecke/Ruhr (Drees leg. 1982, CDH) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1987, CGL) - Wuppertal (KOLBE 1988) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Plettenberg: Pasel (Grundmann leg. 1990, CGL) - Hohenlimburg (Drees leg. 1993, CDH).

Ischnoglossa obscura Wunderle, 1990 23-.228-.003-.
D.: zerstreute Funde aus Süden, Mitte, Osten.
Westf.: nur zwei Funde.
SBL: Solingen (KOLBE 1992) - Herscheid (Feldmann leg. 1998, CFM).

Dexiogyia corticina (Er., 1837)

23-.229-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

Unter morschen Rinden.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 1989, CTM).

WTL: Lippstadt (Buddeberg leg., WESTHOFF 1881) - Oelde (Dahms leg. 1935, LMM) - Essen (Hozman leg. 1970, CHE) - Bochum (Hozman leg. 1971, CHE) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Vreden: Berkelaue (Terlutter leg. 1983, CTM) - Coesfeld: Dülmen (Terlutter leg. 1989, CTM) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1989, CRB) - Münster: Davert (Starke leg. 1990, CSW) - Warendorf (Starke leg. 1990, CSW) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1993, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993/94/95/99, CRB).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935/36, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1954/61/63/64/74, CJB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1987/98, CRB) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).

OWB: Loccum (Jankowski leg. 1960/77, CJB) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1977, CJB) - Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1983, CRB) - Willebadessen: Georgsberg (Renner leg. 1983, CRB).

SBL: Arnsberg (Varendorff leg., WESTHOFF 1881) - Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Witten (FÜGNER 1902, MKB) - Solingen (Modrow leg. 1953, MKB) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1956, KOCH i.l.) - Hösel (Koch leg. 1958, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1962, KOCH i.l.) - Hagen (Drees leg. 1981, CDH) - Hagen: Eckesey (Drees leg. 1999, CDH).

Dexiogyia forticornis (Strand, 1939)

23-.229-.002-.

D.: aus Norddeutschland und vom Niederrhein gemeldet.

Westf.: keine Meldung.

Homoeusa acuminata (Märk., 1842)

23-.230-.001-.

D.: Süden, Mitte, Westen, nach Nordosten seltener.

Westf.: bis auf DGN in allen Teilgebieten.

Myrmecophil, bei *Lasius*.

WTL: Geseke (Buddeberg leg., WESTHOFF 1881) - Sünninghausen (Dahms leg. 1935, LMM).

UWB: Bückeberg (BARNER 1922) - Barkhausen (Jankowski leg. 1959/69, CJB) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).

OWB: Bückeberg (Burchard leg., WESTHOFF 1881) - Paderborn (WESTHOFF 1881) - Warburg: Hellberg/Scherfede (Renner leg. 1980, CRB) - Paderborn-Wewer (Renner leg. 1981, CRB, RENNER 1985) - Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1981, CRB) - Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1982, CRB) - Willebadessen (Braun leg. 1982, CBP) - Lichtenau: Geimer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Marsberg: Dahlberg

(Großkopf leg. 1986, CGL) - Warburg: Weldaer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Beverungen (Figura leg. 1990, ASSING i.l.) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1992/93/94, CFM, FELDMANN & LÜCKMANN 1998).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902, MKB) - Hückeswagen (Eigen leg., MKB) - Solingen (Modrow leg. 1958, MKB) - Meschede (Hozman leg. 1972, CHE) - Hagen (Drees leg. 1978, CDH).

Thiasophila angulata (Er., 1837)

23-.231-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

Myrmecophil, bei *Formica*.

DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1968, CJB).

WTL: Lippstadt (Buddeberg leg., WESTHOFF 1881) - Oerlinghausen: Senne (Grundmann leg. 1982, CGL) - Salzkotten: Thüle (Braun leg. 1983, CBP) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1986, CTM) - Warendorf (Starke leg. 1987/89/91/92, CSW) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Gronau: NSG Amtsvenn (Terlutter leg. 1996, CTM) - Münster: Hiltrup (Feldmann leg. 1998, CFM).

UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935/36/37, LMM) - Melle (PEETZ 1936) - Barkhausen (Jankowski leg. 1958/59/61, CJB) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Klein Möllenbeck (Jankowski leg. 1984, CJB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Elberfeld (Hagens leg., WESTHOFF 1881) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902) - Overath (Schneider leg. 1928, Rüschkamp leg. 1929, MKB) - Hagen (Drees leg. 1977/87, CDH) - Hückeswagen (Wenzel leg. 1986, CWR) - Westhofen (Hellweg leg. 1987, CHF) - Hohenlimburg (Drees leg. 1989, CDH) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989/90, CGL Radevormwald (Wenzel leg. 1989, CWR) - Plettenberg: Leinschede (Grundmann leg. 1990, CGL) - Hagen: Haspe (Drees leg. 1993, CDH) - Remscheid (Wenzel leg. 1996, CWR) - Westhofen (Drees leg. 1999, CDH).

Thiasophila canaliculata Muls.Rey, 1874

23-.231-.002-.

D.: zerstreut im Süden, Westen und Osten.

Westf.: nur ein sehr alter Fund.

Myrmecophil, bei *Formica exsecta*.

SBL: Elberfeld (Hagens leg. 1870, DEI, KOCH 1968).

Thiasophila inquilina (Märk., 1842)

23-.231-.005-.

D.: in Mitte und Norden, sonst zerstreute Funde.

Westf.: wenige Funde.

Myrmecophil, bei *Lasius fuliginosus*.

WTL: Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1988, CRB).

UWB: Bielefeld: Stadtgebiet (Renner leg. 1988, CRB).

SBL: Elberfeld (Hagens leg., WESTHOFF 1882) - Elberfeld (CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Herdecke/Ruhr (Drees leg. 1990, DREES 1996).

Crataraea suturalis (Mannh., 1830)

23-.233-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

Meist synanthrop, in Strohabfällen.

DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1955/80, CJB) - Hartum (Jankowski leg. 1972/73/78, CJB) - Petershagen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Petershagen (Renner leg. 1982, CRB) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Senne: Stapelage (Grundmann leg. 1982, CGL) - Gronau: NSG Amtsvenn (Feldmann leg. 1991, CFM) - Ahlen (Röwekamp, Starke leg. 1993, CRE, CSW, CRD) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1995, CRE).

UWB: Eickum (Barner leg. 1935, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1965/75/76, CJB) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 1977, CRB) - Leopoldshöhe (Grundmann leg. 1982, CGL).

OWB: Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1982, CRB) - Paderborn (Braun leg. 1985, CBP) - Paderborn: Kirchborchen (Braun leg. 1992, CBP) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1993, SMB).

SBL: Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Elberfeld (CORNELIUS 1884) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1966, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1966/67, KOCH i.l.) - Hagen (Drees leg. 1982/89/92, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1985/87/88, WENZEL 1989) - Letmathe (Drees leg. 1993, CDH).

Haploglossa gentilis (Märk., 1844)

23-.234-.001-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: bis auf DGN in allen Teilgebieten.

Nidicol, in Vogel-, Mäusenestern etc.

WTL: Bochum (Hozman leg. 1976, CHE) - Dortmund (Hellweg leg. 1986, HELLWEG 1989) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991/92, CKB).

UWB: Osnabrück (Kache leg. 1993, KACHE 1998).

OWB: Paderborn (Braun leg. 1983, CRB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Witten (Fügner leg., MKB) - Solingen (Modrow leg. 1957, MKB).

Haploglossa villosula (Steph., 1832)

23-.234-.002-.

D.: in ganz Deutschland, häufigste Art der Gattung.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

Nidicol, in Vogel-, Mäusenestern etc.

- DGN: Hartum (Jankowski leg. 1969/75/80, CJB) - Heiliges Meer (1937, LMM) - Heiliges Meer (Peetz leg. 1937, LMM) - Steinfurt: NSG Wiechholz (Feldmann leg. 1998, CFM)
- WTL: Essen (Hozman leg. 1972, CHE) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Münster: Handorf (Grundmann leg. 1989, CGL) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Warendorf (Starke leg. 1992, CSW) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1993, CRB) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993/94/95/97/2000, CRB) - Emsdetten: NSG Emsdettener Venn (Terlutter leg. 1996, CTM).
- UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1929, LMM) - Wellingholzhausen (Peetz leg. 1929, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1965/70/74/76/77/78/79, CJB) - Leopoldshöhe (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/85/88/89/94/98/2000, CRB) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).
- OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Klein Möllenbeck (Jankowski leg. 1960/67, CJB) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1966/73/76/78/79/80, CJB) - Kohlstädt (Braun leg. 1992, CBP) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).
- SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Hilden (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1962, KOCH i.l.) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1962, MKB) - Ratingen (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Hagen (Drees leg. 1976/81/83, CDH) - Arolsen (Renner leg. 1986, CRB) - Radevormwald (Wenzel leg. 1986/87/90, WENZEL 1989) - Balve: Langenholthausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop-Rönkhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Hönnetal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Sundern-Allendorf (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Attendorn-Ebbelingen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Harkortsee/Ruhr (Drees leg. 1991, CDH) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Letmathe (Erbeling leg. 1991, CERL) - Solingen (KOLBE 1992) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Radevormwald (Wenzel leg. 1994, CWR) - Wuppertal (KOLBE 1994, 1996) - Siegen: Burbach (Hozman leg. 1996, CHE).

Haploglossa nidicola (Fairm., 1852)

23-234-003-

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: bis auf OWB in allen Teilgebieten.

In Nestern von Uferschwalben

DGN: Hopsten: NSG Trogbahn (Feldmann leg. 1998, CFM).

WTL: Essen (Pohl leg., MKB, KOCH 1968).

UWB: Lage: Altholzhausen (Grundmann leg. 1982, CGL).

SBL: Düsseldorf: Gerresheim (CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Hagen (Drees leg. 1988, CDH).

Haploglossa marginalis (Grav., 1806) 23-.234-.004-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: bis auf DGN in allen Teilgebieten.

In Vogelnestern.

WTL: Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1996/97, CRE).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1962/76, CJB).

OWB: Klein Möllenbeck (Jankowski leg. 1960/67, CJB) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1968/81/82, CJB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Siegen (Suffrian leg., WESTHOFF 1881) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1962, MKB) - Solingen (Gräf leg. 1983, MKB) - Hagen (Drees leg. 1987/90, CDH).

Haploglossa picipennis (Gyll., 1827) 23-.234-.005-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: zerstreute Funde im Bergland.

In Nestern von Greif- und Rabenvögeln.

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1962, CJB).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1976/78, CJB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Hückeswagen (Eigen leg., KOCH 1968) - Sprockhövel (Hozman leg. 1981, CHE) - Marienheide/Gimborn (Wenzel leg. 1990, WENZEL 1991) - Hagen (Drees leg. 1993, CDH, DREES 1996) - Radevormwald (Wenzel leg. 1994, CWR).

Tinotus morion (Grav., 1802) 23-.235-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen allen fünf Teilgebieten, häufig.

Ubiquist in faulenden Substraten.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, GRUNDMANN 1991) - Häverner Marsch (Renner leg. 1985, CRB) - Steinfurt: NSG Wiechholz (Feldmann leg. 1998, CFM).

WTL: Oelde (Dahms leg. 1930, LMM) - Dortmund (Appel leg. 1969, MKB) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1977, CRB, RENNER 1980) - Münster: Davert (Rehage leg. 1977, CRD) - Münster (Hozman leg. 1980, CHE) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB) - Warendorf (Starke leg. 1992, CSW) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1997, CRB).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1970/74/78, CJB) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1983/84/89/2000, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1993, KACHE 1998) - Bielefeld: Lämershagen (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Klein Möllenbeck (Jankowski leg. 1960, CJB) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1968/78, CJB) - Georgsberg/Willebadessen (Renner leg.

1983, CRB) - Minden: Vennebeck (Renner leg. 1983, CRB) - Willebaldessen: Georgsberg (Renner leg. 1983, CRB) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990, CWB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Heiligenhaus: Bellscheidt (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Mettmann: Schöller (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1962/63, KOCH i.l.) - Engelskirchen (Appel leg. 1976, MKB) - Hagen (Drees leg. 1977/90, CDH, DREES 1991, Drees leg. 1991/92, CDH) - Solingen (KOLBE 1984a, 1992) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Schmalleberg: Aberg (Grundmann leg. 1988, CGL) - Altena: Wiblingwerde (Grundmann leg. 1989, CGL) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1990, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1992, WENZEL 1997) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992, CWR, WENZEL 1994; Wenzl leg. 1995, CWR) - Wuppertal (KOLBE 1994).

Euryalea decumana (Er., 1839)

23-.236-.002-.

D.: Nordrhein, sehr alte Funde aus Hessen, Pfalz.

Westf.: Die Meldungen für Westfalen (DAHMS 1928, PEETZ 1931) wurden später von den Autoren korrigiert (HORION 1967).

Oelde (DAHMS 1928): Fehlbestimmung. Bünde (PEETZ 1931): Fehlbestimmung.

Aleochara curtula (Goeze, 1777)

23-.237-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen allen fünf Teilgebieten, häufig.

An Aas und Exkrementen.

DGN: Petershagen (BARNER 1922) - Hopsten: NSG Halverder Moor (Terlutter leg. 1998, CTM).

WTL: Oelde (Dahms leg. 1924, DAHMS 1928, LMM) - Münster (Landois leg. 1881, LMM) - Essen (Hozman leg. 1972, CHE) - Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Ahlen (Röwekamp leg. 1990, CRE) - Bokel/Ems (1991, WASNER i.l.) - Warendorf (Starke leg. 1991 CSW)

UWB: Eickum (BARNER 1922) - Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 1974, CRB) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995) - Osnabrück (Klaas leg. 1992, KACHE i.l., Kache leg. 1992/93, KACHE 1998) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.).

OWB: Körbecke (Kroker leg. 1978/79, KROKER & RENNER 1983) - Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1980/81, CRB) - Warburg: Hellberg/Scherfede (Renner leg. 1980/82/87, CRB) - Scherfede: Hardehausen (Erbeling leg. 1982, ERBELING & ERBELING 1986) Paderborn (Braun leg. 1983, CBP) - Lichtenau: Geimer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Scherfede: Scheffelberg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Warburg: Weldaer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1991, CWB) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1992/93/94, FELDMANN & LÜCKMANN 1998) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Witten (FÜGNER 1902) - Heiligenhaus (Gräf leg. 1962, MKB) - Düsseldorf: zahlreich (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Schwerte: Geisecke (Rehage leg. 1970, CRD) - Wuppertal (KOLBE 1971, 1973, 1978, 1996) - Hagen (Drees leg. 1975/81/91, CDH) - Letmathe (Erbeling leg. 1977, CErL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1978/79/82, WENZEL 1989) - Iserlohn (Erbeling leg. 1986, ERBELING & DREES 1992) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Altenhudem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Letmathe (Drees leg. 1996, CDH) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Lappann, Wenzel leg. 1998/99, CWR) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Lappann leg. 1998, CWR).

Aleochara lata Grav., 1802

23-.237-.002-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: wenige Meldungen.

An Aas und Exkrementen.

WTL: Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1990, CRE).

SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Neviges (ROSSI 1882) - Witten (FÜGNER 1902) - Bergisch Gladbach (Rüschkamp leg. 1926, KOCH 1968) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1964, KOCH 1968, MKB) - Hagen (Drees leg. 1976/89/92, CDH).

Aleochara laticornis Kr., 1856

23-.237-.003-.

D.: sehr zerstreute, meist ältere Funde; sonst Südeuropa.

Westf.: HORION (1967) nennt drei Funde von Jankowski aus Barkhausen. Die drei Belegexemplare sind Weibchen von *A. curtula*.

Barkhausen (Jankowski leg., CJB, HORION 1967): Fehlbestimmung

Aleochara haematoptera Kraatz, 1858

23-.237-.0041.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: bis auf DGN in allen Teilgebieten.

An sandigen Ufern unter Aas und Exkrementen.

WTL: Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1977/78, CRB, RENNER 1980).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1950, CJB) - Porta Westf. (Jankowski leg., CJB, HORION 1967) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).

OWB: Bückeberg (Burchard leg., WESTHOFF 1881) - Bückeberg (BARNER 1922).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, 1886, CORNELIUS 1884) - Neviges (Rossi leg. 1899, LMM) - Witten (FÜGNER 1902) - Düsseldorf-Ost (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Hagen (Drees leg. 1995, CDH).

Aleochara spissicornis Er., 1839

23-.237-.005-.

D.: nur in wenigen Gebieten.

Westf.: nur ein Fund aus OWB.

OWB: Warburg: Hainberg/Ossendorf, (Renner leg. 1981, CRB, RENNER & GRUNDMANN 1984).

Aleochara brevipennis Grav., 1806

23-.237-.008-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

An sumpfigen Stellen.

DGN: Hartum (Jankowski leg. 1974, CJB, RENNER 1997b).

WTL: Dortmund (Suffrian leg., WESTHOFF 1881) - Vohren (Dahms leg. 1935, LMM) - Münster (Peetz leg. 1936, PEETZ 1937, LMM) - Ahlen: Enninger (Röwekamp leg. 1991, CRE) - Münster: Emmerbach (Ahrens leg. 1991, KÖHLER i.l.).

UWB: Detmold-Hiddesen (Peetz leg. 1929, PEETZ 1931, LMM) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995) - Osnabrück (Kache leg. 1993, KACHE 1998) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998).

OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881).

SBL: Arnsberg (Varendorff leg., WESTHOFF 1881) - Siegen (Suffrian leg., WESTHOFF 1881) - Elberfeld (GEILENKEUSER 1896) - Hückeswagen (Eigen leg., Kirch leg. 1919, MKB) - Marienheide (Eigen leg., MKB) - Opladen (Horion leg. 1931, MKB) - Hilden (Koch leg. 1962, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Radevormwald (Wenzel leg. 1990, CWR) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1991/92, WENZEL 1997).

Aleochara puberula Klug, 1833

23-.237-.009-.

D.: Adventivart, nur sehr zerstreute Funde.

Westf.: bisher nur in DGN gefunden.

Synanthrope Art.

DGN: Oppenweher Moor (Grundmann, Renner leg. 1983, CGL, CRB, RENNER et al. 1986, GRUNDMANN 1991).

Aleochara intricata Mannh., 1830

23-.237-.010-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

Koprophile Art.

DGN: Hopsten: NSG Halverder Moor (Terlutter leg. 1998, CTM)

WTL: Münster (Kolbe leg. 1876, LMM) - Münster-Körheide (Peetz leg. , LMM) - Oelde (Dahms leg. 1935, LMM) - Sünninghausen (Dahms leg. 1936, LMM) - Bochum (Hozman leg. 1973, CHE) - Ahlen (Röwekamp leg. 1991, CRE) - Münster: Davert (Feldmann leg. 1999, CFM).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1956/77/78, CJB).

OWB: Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1992/93, CFM, FELDMANN & LÜCKMANN 1998).

SBL: Imhausen/Sieg (Appel leg. 1948, MKB) - Hilden (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1968, MKB) - Hagen (Drees leg. 1984/90/95, CDH) - Altenkirchen/Sieg (Terlutter leg. 1989, CFM) - Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Lappann leg. 1998, CWR).

Aleochara tristis Grav., 1806

23-.237-.012-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: bis auf DGN und OWB in allen Teilgebieten.

Koprophile Art.

WTL: Bocholt (WESTHOFF 1881) - Dortmund (WESTHOFF 1881) - Lippstadt (WESTHOFF 1881) - Oelde (Dahms leg. 1921, LMM) - Oelde (DAHMS 1928) - Vreden: NSG Ellewicker Feld (Terlutter leg. 1983, CTM) - Münster: Davert (Terlutter leg. 1990, CTM) - Münster: Davert (Röwekamp leg. 1993, CRE).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1950, CJB) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Hilchenbach (WESTHOFF 1881) - Witten (WESTHOFF 1881, FÜGNER 1902) - Overath (Rüschkamp leg. 1930, KOCH 1968) - Solingen (Modrow leg. 1962, KOCH 1968) - Remscheid (KOCH 1968) - Wuppertal: Krutscheid (KOLBE 1971) - Radevormwald: Ülfetal (Wenzel leg. 1984, WENZEL 1989) - Hagen (Drees leg. 1992, CDH) - Medebach: Berge/Orketal (Terlutter leg. 1996, CTM).

Aleochara moesta Grav., 1802

23-.237-.013-.

D.: im Süden und Mitte, sonst zerstreute Funde.

Westf.: nur alte Meldungen aus OWB und SBL.

An faulenden Substraten.

OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881).

SBL: Arnsberg (Varendorff leg., WESTHOFF 1881) - Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Witten (FÜGNER 1902).

Aleochara inconspicua Aubé, 1850

23-.237-.014-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: nur wenige Meldungen.

Eurytop an faulenden Substraten.

WTL: Dortmund: Bövinghausen (Hozman leg. 1990, CHE).

UWB: Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993, LMM) - Osnabrück (Klaas leg. 1992, KACHE i.l., Kache leg. 1992/93/94, KACHE 1998, LMM).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Hösel (Koch leg. 1957, KOCH i.l.).

Bröhlthal (Gräf leg. 1971, KOCH 1974): Fehldetermination (KÖHLER 1993).

Aleochara sparsa Heer, 1839

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen allen fünf Teilgebieten, sehr häufig.

An Saftflußstellen, in Vogel- und Kleinsäugernestern.

- DGN: Häverner Marsch (Grundmann leg. 1982, CGL) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991) - Hopsten: NSG Heiliges Meer (Terlutter leg. 1994/95, CTM).
- WTL: Ennigerloh (Dahms leg. 1927, LMM, DAHMS 1928) - Dülmen (Hozman leg. 1975, CHE) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1976/77/78, CRB, RENNER 1980) - Paderborn-Schloß Neuhaus (Braun leg. 1982, CBP) - Vreden: NSG Zwillbrocker Venn (Terlutter leg. 1983, CTM) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1985/87, CRB, RENNER 1987) - Ahlen-Dolberg (Röwekamp leg. 1991, CRE) - Haltern (Ahrens leg. 1991, KÖHLER i.l.) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991/92, CKB) - Warendorf (Starke leg. 1992, CSW) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1993, CRB).
- UWB: Bielefeld: Teutoburger Wald (Renner leg. 1974/80, CRB) - Bielefeld (SPÄH 1980) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Bad Salzuflen: Bexter Wald (Grundmann leg. 1982, CGL) - Leopoldshöhe (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1984/85/88, CRB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.).
- OWB: Brakel: Hamberg/Riesel (Renner leg. 1980/81/82, CRB) - Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1980/81/82/83, CRB) - Lage, Hardisser Moor (Renner leg. 1980, CRB) - Warburg: Hellberg/Scherfede (Renner leg. 1980/81/82, CRB) - Diemeltal: Lamerden (Renner leg. 1981/82, CRB) - Paderborn-Wewer (Renner leg. 1981, CRB, RENNER 1985) - Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1981/82, CRB) - Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1981/82, CRB) - Neuenbeken (Braun leg. 1982, CBP) - Scherfede: Hardehausen (Erbeling leg. 1982, ERBELING & ERBELING 1986) Paderborn: Dahl (Braun leg. 1985, CBP) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1993, FELDMANN & LÜCKMANN 1998) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).
- SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884, WESTHOFF 1886) - Hösel (Koch leg. 1957, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1959, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Leuscheid/Sieg (Appel leg. 1964/65, MKB) - Wuppertal (Wenzel leg. 1972, CWR) - Wissen/Sieg: Roth (Stock leg. 1976/79, CSR) - Engelskirchen (Appel leg. 1978, MKB) - Hohenlimburg (Drees leg. 1978, CDH) - Hagen (Drees leg. 1981/87/90, CDH) - Radevormwald (Wenzel leg. 1981/85/86/87/89, WENZEL 1989) - Iserlohn (Erbeling leg. 1986, ERBELING & DREES 1992) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1986/87/88, CGL) - Plettenberg (Erbeling leg. 1987, CERL) - Attendorn: Repetal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Herscheid: Hüinghausen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Marienheide/Gimborn (Wenzel leg. 1990, CWR) - Plettenberg-Sonneborn (Grundmann leg. 1990, CGL) - Plettenberg: Eiringhausen

(Grundmann leg. 1991, CGL) - Plettenberg: Pasel (Grundmann leg. 1991, CGL) - Altenhundem: Lenne (Grundmann leg. 1992, CGL) - Letmathe (ERBELING & DREES 1992) - Radevormwald (Wenzel leg. 1992/93, CWR, WENZEL 1994) - Solingen (KOLBE 1992) - Wuppertal (KOLBE 1994, 1996) - Waldbröl (Köhler leg. 1996, CKB).

Aleochara stichai Likovsky, 1965 23-.237-.016-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: in allen allen fünf Teilgebieten, nicht häufig.

An Saftflußstellen, kleinen Kadavern.

DGN: Hartum (Jankowski leg. 1977/80, CJB).

WTL: Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1954/59/75/77/78/79, CJB) - Porta Westf. (Jankowski leg. 1969, CJB) - Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 2000, CRB).

OWB: Nammener Wald (Jankowski leg. 1975/79/80, CJB) - Karlshafen (Folwaczny leg 1932, FOLWACZNY 1980) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91/92, CWB) - Altenbeken: Ochsenberg (Köhler leg. 1998, CKB) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Elberfeld (Rossi leg., LMM) - Hückeswagen (Eigen leg. 1934, MKB, KÖHLER 1993) - Finnentrop (Hellweg leg. 1985, HELLWEG 1989) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Hagen (Drees leg. 1990, CDH) - Plettenberg: Pasel (Grundmann leg. 1990, CGL) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Waldbröl (Köhler leg. 1996, CKB) - Neheim: Höllinghofen (Elmer leg. 1998, CFM).

Aleochara kamila Lik., 1984 23-.237-.017-.

D.: hauptsächlich im Norden.

Westf.: nur eine Meldung.

Synanthrope Art.

SBL: Dornap (Koch leg. 1967, KOCH 1968).

Rodewald/Hann. (HAHLBOHM 1998).

Aleochara funebris Woll., 1864 23-.237-.018-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: bis auf OWB in allen Teilgebieten.

Synanthrope Art.

DGN: Hartum (Jankowski leg. 1975, CJB).

WTL: Ahlen (Röwekamp leg. 1992/95, CRE) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1992, CKB) - Ahlen (Starke leg. 1993, CSW).

- UWB: Eickum (Barner leg. 1935, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1959, CJB) - Holzhausen (Jankowski leg. 1977, CJB) - Osnabrück (Kache leg. 1993, KACHE 1998).
- SBL: Solingen: Ohligs (Eigen leg., MKB) - Mettmann: Schöller (Koch leg. 1967, KOCH i.l.) - Solingen (Modrow leg. 1968, KOCH 1974, MKB) - Wissen/Sieg: Roth (Stock leg. 1976, CSR) - Hagen (Drees leg. 1982/93, CDH) - Burscheid (Kolbe leg. 1986, KOLBE & BRUNS 1988, KÖHLER 1997, MKB) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1991, CWR) - Westhofen (Drees leg. 1993, CDH).

Aleochara lanuginosa Grav., 1802

23-.237-.021-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten, sehr häufig.

Eine der häufigsten Arten an faulenden Substraten.

- DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1950, CJB) - Nettelstedter Moor (Peetz leg. 1935, LMM) - Heiliges Meer (1937, LMM) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).
- WTL: Bocholt (WESTHOFF 1881) - Dortmund (WESTHOFF 1881) - Lippstadt (WESTHOFF 1881) - Lette (Dahms leg. 1926, DAHMS 1928) - Sünninghausen (Dahms leg. 1926, LMM) - Münster (Peetz leg. 1936, LMM) - Saerbeck/Ems (Peetz leg. 1936, LMM) - Dortmund (Appel leg. 1968, MKB) - Bochum (Hozman leg. 1973, CHE) - Dorsten (Hozman leg. 1975, CHE) - Coesfeld: Darfeld (Hozman leg. 1983, CHE) - Vreden (Terlutter leg. 1984, CTM) - Ahlen (Röwekamp leg. 1991, CRE).
- UWB: Mennighüffen (Barner leg. 1911, LMM) - Eickum (Barner leg. 1932, LMM) - Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1936, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1950/53/60/63/68/70/76/78, CJB) - Holzhausen (Jankowski leg. 1961, CJB) - Teutoburger Wald (Pohl-Apel leg. 1985, CRB, POHL-APEL & RENNER 1987) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1989/98/99, CRB).
- OWB: Paderborn (WESTHOFF 1881) - Nammener Wald (Jankowski leg. 1977/80, CJB) - Altenbeken (Braun leg. 1982, CBP) - Minden: Vennebeck (Renner leg. 1983, CRB) - Lichtenau (Braun leg. 1985, CBP) - Scherfede: Hardehausen (Grundmann leg. 1989, CGL).
- SBL: Arnsberg (Varendorff leg., WESTHOFF 1881) - Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Witten (WESTHOFF 1881) - Elberfeld (Müller leg. 1929, MKB) - Hückeswagen (Eigen leg., MKB) - Düsseldorf: Eller (Koch leg. 1960, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Düsseldorf: zahlreich (Koch leg. 1963, KOCH i.l.) - Aprath (Wenzel leg. 1973/83, CWR) - Wuppertal (Wenzel leg. 1973, CWR) - Engelskirchen (Appel leg. 1976, MKB) - Wissen/Sieg: Roth (Stock leg. 1976, CSR) - Radevormwald (Wenzel leg. 1978/85/91, WENZEL 1989) - Hagen (Drees leg. 1979/82/92, CDH) - Solingen (KOLBE 1984a, 1988, 1992) - Attendorn: Repetal (Grundmann leg. 1988, CGL) - Finnentrop-Rönkhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1988/91, CGL) - Schmallenberg: Wilzenberg (Grundmann leg. 1988, CGL) - Sundern-Allendorf (Grundmann leg. 1988, CGL) - Plettenberg:

Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Attendorn-Ebbelingen (Grundmann leg. 1990, CGL) - Finnentrop: Fretter-Tal (Grundmann leg. 1991, CGL) - Plettenberg: Sonneborn (Grundmann leg. 1991, CGL) - Radevormwald (Wenzel leg. 1991, CWR) - Bergisch Gladbach: Immekeppel (STUMPF 1993) - Heiligenhaus: Vogelsangbachtal (Lappann leg. 1998, CWR).

Aleochara lygaea Kr., 1862 23-.237-.022-.

D.: im Süden und Mitte, sonst zerstreute Funde.

Westf.: nur zwei Funde.

An faulenden Substraten.

WTL: Oelde (Dahms leg. 1923, DAHMS 1928).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1970, CJB).

Aleochara heeri Likovsky, 1982 23-.237-.023-.

D.: in Süden und Mitte.

Westf.: nur alte, vermutlich unrichtige Meldungen.

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968): wohl Fehlbestimmung. Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881, HORION 1967): wohl Fehlbestimmung.

Aleochara villosa Mannh., 1830 23-.237-.024-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: zerstreute Funde.

Synanthrope Art.

WTL: Münster (Kolbe leg. 1874, LMM) - Bochum (Hozman leg. 1976, CHE) - Münster: St. Moritz (Hozman leg. 1981, CHE) - Münster: Albachten (Hozman leg. 1984, CHE).

UWB: Enger (Grundmann leg. 1982, CGL).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Neviges (ROSSI 1882).

Aleochara vagepunctata Kr., 1856 23-.237-.025-.

D.: nur in wenigen Gebieten.

Westf.: Meldung aus Elberfeld von Roettgen abgelehnt (HORION 1967).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884): wohl Fehlbestimmung.

Aleochara sanguinea (L., 1758) 23-.237-.026-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: zerstreute Funde, aus DGN nicht gemeldet.

Synanthrope Art.

WTL: Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1986, CRB) - Münster: Wolbeck (Köhler leg. 1991, CKB).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1976, CJB, RENNER 1997b).

OWB: Klein Möllenbeck (Jankowski leg. 1960, CJB).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Neviges (ROSSI 1882) - Wetter/Ruhr (Drees leg. 1983, CDH) - Hagen (Drees leg. 1994/98, CDH) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1999, CWR).

Aleochara fumata Grav., 1802 23-.237-.027-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: nur in WTL, SBL.

Mycetophile Art, selten an Faulstoffen.

WTL: Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1976/77/78, CRB, RENNER 1980).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Witten (FÜGNER 1902) - Hückeswagen (Eigen leg., MKB).

Aleochara moerens Gyll., 1827 23-.237-.028-.

D.: Funde weit zerstreut.

Westf.: nur in WTL, SBL.

Mycetophile Art, selten an Faulstoffen.

WTL: Bocholt (Waldau leg., WESTHOFF 1881) - Lippstadt (Buddeberg leg., WESTHOFF 1881) - Münster (Treuge leg., WESTHOFF 1881) - Soest (VERHOEFF 1890).

SBL: Arnsberg (Varendorff leg., WESTHOFF 1881) - Elberfeld (CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Witten (Fügner leg., MKB) - Solingen (Modrow leg. 1954/58, KOCH 1968, MKB) - Remscheid (KOCH 1968).

Aleochara maculata Bris., 1863 23-.237-.030-.

D.: nur in wenigen Gebieten.

Westf.: nur ein Fund.

SBL: Burscheid (Kolbe leg. 1986, KOLBE & BRUNS 1988, KOCH 1992).

Aleochara laevigata Gyll., 1810 23-.237-.031-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: nur in WTL, UWB, SBL.

Koprofile Art.

WTL: Münster-Toppheide (LMM).

UWB: Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995).

SBL: Arnsberg (Varendorff leg., WESTHOFF 1881) - Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Witten (Fügner leg., WESTHOFF 1881, FÜGNER 1902).

Porta Westfalica (Jankowski leg., HORION 1967): kein Beleg.

Aleochara haemoptera Kr., 1856 23-.237-.032-.

D.: Funde weit zerstreut.

Westf.: nur eine alte Meldung.

In Säugetierbauen.

SBL: Elberfeld (CORNELIUS 1884, KOCH 1968).

Aleochara cuniculorum Kr., 1858

23-.237-.033-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: nur aus OWB nicht gemeldet.

In Dachs- und Fuchsbauen.

DGN: Hiller Moor (Jankowski leg. 1955, CJB) - Hartum (Jankowski leg. 1976, CJB).

WTL: Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Bokel/Ems (1991, WASNER i.l.).

UWB: Eickum (Barner leg. 1935, LMM) - Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1936, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1950/60/62/76/79/80, CJB) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).

SBL: Hückeswagen (Eigen leg., KOCH 1968) - Düsseldorf (Koch leg. 1976, MKB) - Hagen (Drees leg. 1991, CDH, DREES 1996).

Aleochara ruficornis Grav., 1802

23-.237-.038-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: nur aus DGN nicht gemeldet.

WTL: Oelde (Dahms leg. 1935, LMM) - Ahlen (Röwekamp leg. 1974, CRE) - Münster : Albachten (Hozman leg. 1980, CHE) - Warendorf (Starke leg. 1986, CSW) - Nottuln (Terlutter leg. 1990, CRB) - Münster: Gittrup (Terlutter leg. 1990, CTM) - Münster: Gimfte (Feldmann leg. 1991, CFM) - Senden: Venner Moor (Terlutter leg. 1995, CTM).

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1950/51/54/56/76, CJB) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995) - Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.) - Lengerich (Feldmann leg. 1997, CFM).

OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Paderborn-Wewer (Renner leg. 1981, CRB, RENNER 1985) - Warburg: Heinberg/Ossendorf (Renner leg. 1981, CRB) - Willebadessen (Braun leg. 1987, CBP) - Höxter (Gerken leg. 1989, ASSING i.l.) - Beverungen (Figura leg. 1990, ASSING i.l.) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990/91/92/93, CWB, SMB) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1992/93/94, CFM, FELDMANN & LÜCKMANN 1998) - Scherfede: Hellberg (Köhler leg. 1999, CKB).

SBL: Arnsberg (Varendorff leg., WESTHOFF 1881) - Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Waldeck (Langenbeck leg., WESTHOFF 1881) - Hönnetal (REHAGE & FELDMANN 1977) - Lenne- stadt (Hellweg leg. 1985/87, HELLWEG 1989) - Iserlohn (Erbeling leg. 1986, ERBELING & DREES 1992) - Letmathe (Erbeling leg. 1986, CErL) - Letmathe (Erbeling leg. 1986, CErL) - Allendorf (Hellweg leg. 1988, CHF) - Plettenberg: Bommecketal (Grundmann leg. 1989, CGL, GRUNDMANN & ERBELING 1992) - Witten: Gedern (Drees leg. 1991, CDH) - Letmathe (ERBELING & DREES 1992) - Menden: NSG Hönnetal

(Terlutter leg. 1995, CTM) - Waldbröl (Köhler leg. 1996, CKB) - Heiligenhaus: NSG Hofermühle (Wenzel leg. 1999, CWR).

Aleochara major Fairm., 1857 23-237-0381.

D.: vom Rheinland bis nach Thüringen.

Westf.: nur aus UWB, OWB gemeldet.

Auf Wärmehängen, Wintertier.

UWB: Barkhausen (Borcherding leg., BORCHERDING 1994).

OWB: Körbecke (Kroker leg. 1978/79, KROKER & RENNER 1983, CJB, LMM) - Brakel: Hamburg/Riesel (Renner leg. 1981/82/83, CRB, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Diemeltal: Lamerden (Renner leg. 1981, CRB) - Warburg: Hellberg/Scherfede (Renner leg. 1981/82, CRB, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Warburg: Weldaer Berg (Renner leg. 1981, CRB, RENNER & GRUNDMANN 1984) - Marsberg: Dahlberg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Warburg: Weldaer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1992/93, CFM, FELDMANN & LÜCKMANN 1998).

Aleochara melichari (Rtt., 1889) 23-237-039-

D.: nicht einheimisch.

Westf.: frühere Meldungen sind auf *A. major* zu beziehen.

Aleochara erythroptera Grav., 1806 23-237-042-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: nur in WTL, SBL gefunden.

WTL: Vreden: Ammeloe (Wasner leg. 1989, CHE) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1995, CRB, RENNER 1998).

SBL: Lennestadt (Hellweg leg. 1987, CHF).

Aleochara bilineata Gyll., 1810 23-237-043-

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

Unter faulenden Substraten.

DGN: Häverner Marsch (Grundmann leg. 1982, CGL) - Oppenweher Moor (Grundmann leg. 1983, CGL, GRUNDMANN 1991).

WTL: Dortmund (Suffrian leg., WESTHOFF 1881) - Oelde (Dahms leg. 1923/24, LMM) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1983, CRB) - Augustdorf: Nordsenne (Renner leg. 1987, CRB) - Ahlen: Enniger (Röwekamp leg. 1992, CRE) - Paderborn: Südsenne (Renner leg. 1996, CRB).

UWB: Osnabrück (Kache leg. 1989, KACHE & ZUCCHI 1993) - Osnabrück (Wahlbrink leg. 1991, WAHLBRINK & ZUCCHI 1995) - Osnabrück (Klaas leg. 1992, KACHE i.l., Kache leg. 1992/93, KACHE 1998) - Bramsche (Kunze leg. 1995, KUNZE & KACHE 1998) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 2000, CRB).

- OWB: Paderborn (Frankenberg leg., WESTHOFF 1881) - Warburg: Hellberg/Scherfede (Renner leg. 1980, CRB) - Georgsberg/Willebadessen (Renner leg. 1983, CRB) - Willebadessen: Georgsberg (Renner leg. 1983, CRB).
- SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884, KOCH 1968) - Hilchenbach (Eichhoff leg., WESTHOFF 1881) - Finnentrop-Rönkhausen (Grundmann leg. 1988, CGL) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1992, WENZEL 1997) - Unna: Geisecke (Flake leg. 1996, CFM).

Aleochara binotata Kr., 1856 23-.237-.044-.

D.: fast in ganz Deutschland.

Westf.: aus DGN, OWB nicht gemeldet.

WTL: Saerbeck/Ems (Peetz leg. 1936, LMM) - Bielefeld-Sennestadt (Renner leg. 1977, CRB, RENNER 1980).

UWB: Porta Westf. (Jankowski leg. 1946, CJB) - Bielefeld: Isingdorf (Renner leg. 1987/2000, CRB) - Ibbenbüren (Feldmann leg. 1990, CFM) - Melle (Wacker leg. 1995, KACHE i.l.).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., WESTHOFF 1881, CORNELIUS 1884) - Westhofen (Drees leg. 1989, CDH) - Wuppertal (KOLBE 1992).

Aleochara bipustulata (L., 1761) 23-.237-.046-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen allen fünf Teilgebieten, häufig.

Unter faulenden Substraten, Ubiquist.

Aleochara verna Say, 1836 23-.237-.0461.

D.: aus mehreren Teilgebieten noch nicht gemeldet.

Westf.: im Bergland.

Unter faulenden Substraten auf Sandböden.

UWB: Barkhausen (Jankowski leg. 1975, CJB, RENNER 1997a).

OWB: Lichtenau: Geimer Berg (Großkopf leg. 1986, CGL) - Marsberg: Dahlberg (Großkopf leg. 1986, CGL).

SBL: Elberfeld (Cornelius leg., KOCH 1968) - Wuppertal (KOLBE 1981, KOCH 1992) - Hückeswagen: Bever (Wenzel leg. 1992, WENZEL 1997).

Rheochara spadicea (Er., 1837) 23-.238-.001-.

D.: in ganz Deutschland.

Westf.: in allen fünf Teilgebieten.

In Maulwurfneuern.

DGN: Dümmer: Hunteburg (PEETZ 1931) Holzhausen (Peetz leg. 1936, LMM) - Hartum (Jankowski leg. 1976/77/79/80/82, CJB) - Häverner Marsch (Grundmann leg. 1982, CGL).

- WTL: Oelde (Dahms leg. 1935, LMM) - Bochum (Hozman leg. 1973, CHE) - Gütersloh: Verl (Renner leg. 1975/79, CRB) - Münster (Hozman leg. 1980, CHE) - Niederntudorf/Alme (Braun leg. 1984, CBP) - Rietberg/Ems (1986-87, WASNER i.l.) - Warendorf (Starke leg. 1988, CSW) - Gronau (Feldmann leg. 1989, CFM) - Harsewinkel (Grundmann leg. 1991, CGL) - Münster (Feldmann leg. 1991, CFM) - Salzkotten: Thüle (Braun leg. 1991, CBP) - Ahlen (Röwekamp leg. 1992, CRE) - Bielefeld: Steinhagen (Renner leg. 1992, CRB).
- UWB: Preuß. Oldendorf (Peetz leg. 1935/36, LMM) - Barkhausen (Jankowski leg. 1950/65/67, CJB) - Halle: Jakobsberg (Renner leg. 1980, CRB, REHAGE & RENNER 1981) - Bad Salzuflen: Bexter Wald (Grundmann leg. 1982, CGL) - Bielefeld: Bröninghausen (Grundmann leg. 1982, CGL) - Leopoldshöhe (Grundmann leg. 1982, CGL) - Herford: Schweicheln-Bermbeck (Grundmann leg. 1983, CGL).
- OWB: Körbecke (Kroker leg. 1978/79, KROKER 1981, KROKER & RENNER 1983) - Schieder-Schwalenberg (Wagner leg. 1990, CWB) - Marsberg/Diemel (Lückmann leg. 1993, FELDMANN & LÜCKMANN 1998).
- SBL: Overath (Rüschkamp leg. 1929, MKB) - Hückeswagen (Eigen leg., MKB) - Düsseldorf: Gerresheim (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Erkrath (Koch leg. 1961, KOCH i.l.) - Hilden (Koch leg. 1961/64/74, KOCH i.l.) - Düsseldorf: Grafenberg (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Ratingen (Koch leg. 1964, KOCH i.l.) - Hagen (Drees leg. 1979/81/82/88/89, CDH) - Plettenberg: Ohle (Grundmann leg. 1989, CGL) - Balve: Husenberg (Grundmann leg. 1990, CGL) - Herscheid: Ahe-Tal (Grundmann leg. 1990, CGL) - Neuenrade: Borke (Grundmann leg. 1990, CGL) - Plettenberg: Pasel (Grundmann leg. 1990, CGL) - Schmallenberg (Grundmann leg. 1990, CGL) - Sundern: Amecke (Grundmann leg. 1990, CGL) - Werdohl: Neuenrade (Erbeling leg. 1990, CErL) - Plettenberg: Siesel (Grundmann leg. 1992, CGL) - Hagen: Garenfeld (Drees leg. 1994, CDH).

Rheochara irmgardis (Vogt, 1954)

23-.238-.002-.

D.: in Süden und Mitte.

Westf.: im äußersten Osten.

In Maulwurfnestern.

OWB: Karlshafen (Folwaczny leg., 1934, FOLWACZNY 1960, HORION 1967).

Hofgeismar (Folwaczny leg. 1934, FOLWACZNY 1960, HORION 1967).

IV. Diskussion

Obwohl die Aleocharinen nicht gerade zu den faunistisch gut erforschten Käfergruppen gehören, konnten im Verlauf etlicher Jahre über 25.000 Einzeldaten angesammelt werden. Durch Kombination der Funddaten mehrerer Jahre in einem neuen Datensatz wurde die Datenmenge etwa halbiert und damit übersichtlicher.

Besonders im letzten halben Jahrhundert hat der Erforschungsgrad und dementsprechend auch die Zahl der aus Westfalen gemeldeten Arten erheblich zugenommen. In die vorliegende faunistische Bearbeitung wurden auch rund 50 bisher nicht aus Westfalen gemeldete Arten aufgenommen, deren Verbreitungsgebiet aber Westfalen nicht ganz aussparen dürfte. Es ist anzunehmen, daß im Faunengebiet insgesamt 500 Arten der Unterfamilie Aleocharinae vorkommen.

Für die einzelnen Landesteile Westfalens wurden bezogen auf das Jahr 1900 beziehungsweise auf die Gegenwart folgende Artenzahlen ermittelt:

	im Jahr 1900	im Jahr 2000
DGN:	0	213
WTL:	88	330
UWB:	1	333
OWB:	75	282
SBL:	262	409
ganz Westf.:	275	449

Zu Westhoff's Zeiten war das Weserbergland koleopterologisch weitgehend unbearbeitet; er meldete nur 76 Arten aus diesem Gebiet gegenüber 262 aus SBL. An dieser ungleichen Verteilung hat sich bis heute allerdings nicht viel geändert: Rund 45% (!) aller Datensätze beziehen sich auf das Süderbergland, und so ergibt sich für dieses Gebiet auch weiterhin eine beachtlich höhere Artenzahl.

Daß für über 50 Arten, die sowohl in WTL, UWB als auch SBL gefunden wurden, Meldungen aus OWB jedoch fehlen, ist in den meisten Fällen mit natürlichen Gegebenheiten nicht zu erklären. Angesichts der faunistischen Daten sind bei den meist recht flugaktiven Aleocharinen echte Verbreitungslücken selten auszumachen, Nachweislücken dagegen viel häufiger.

V. Literatur

- ANT, H. (1971): Coleoptera Westfalica. - Abh. Landesmus. Naturkde. Münster (Münster) **33**(2):1-64.
- ASSING, V. (1986): Kleine Mitteilungen Nr. 2056: Zwei bemerkenswerte Staphylinidienfunde aus dem Weserbergland. - Entomol. Blätter (Krefeld) **82**: 122.
- ASSING, V. (1988): Die Kurzflügelkäferfauna ausgewählter Grün-, Ruderal- und Kleingartenflächen im Stadtgebiet Hannovers: Ein Beitrag zur Faunistik und Ökologie einer Großstadt. - Ber. Naturhist. Gesellsch. Hannover **130**: 111-131.
- ASSING, V. (1989): Kleine Mitteilungen Nr. 2086: Aleocharinen auf Äckern im Weserbergland. - Entomol. Blätter (Krefeld) **85**: 117-118.
- ASSING, V. (1992): Die Kurzflügelkäfer eines urbanen Inselbiotopkomplexes in Hannover. 3. Beitrag zur Faunistik und Ökologie der Staphyliniden in Hannover. - Ber. Naturh. Gesellsch. Hannover **134**: 173-187.
- ASSING, V. (1992a): Kleine Mitteilungen Nr. 2112: Zur Staphylinidenfauna von Taubenschlägen. - Entomol. Blätter (Krefeld) **88**: 151-152.
- ASSING, V. (1994): *Pseudomicrodota jelineki* und weitere faunistisch bemerkenswerte Aleocharinen von der Porta Westfalica im Weserbergland (Staphyl.). - Entomol. Blätter (Krefeld) **90**: 123-124.

- ASSING, V. (1995): Erstnachweis von *Oligota inexpectata* Williams für Deutschland, mit Bemerkungen zur Unterscheidung von *O. pusillima* (Gravenhorst) und *O. pumilio* Kiesenwetter (Col., Staphylinidae). - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) **39**: 224-226.
- ASSING, V. (1996): A revision of the European species of *Calodera* Mannerheim (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). - Beitr. Ent. (Berlin) **46**: 3-24.
- ASSING, V. (1998): *Gyrophaena transversalis* Strand im südlichen Niedersachsen (Staphylinidae). - Entomol. Blätter (Jena) **94**: 142.
- ASSING, V. (1999): Zur Synonymie einiger Arten der Gattung *Atheta* Thomson, Untergattung *Ceritaxa* Mulsant & Rey (Coleoptera, Staphylinidae). - Entomol. Blätter (Jena) **95**: 47-51.
- ASSING, V. & M. SCHÜLKE (1999): Supplemente zur mitteleuropäischen Staphylinidenfauna (Coleoptera, Staphylinidae). - Entomol. Blätter (Jena) **95**: 1-31.
- BARNER, K. (1922): Beiträge zur Käferfauna des westfälisch-lippischen Berglandes. - Ber. Naturwiss. Ver. Bielefeld **4**: 266-283.
- BATHON, H. (1991): Käferfunde der Jahre 1987 bis 1989 aus Hessen. 4. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen. - Hess. Faun. Briefe (Darmstadt) **11**: 1-18.
- BENICK, L. (1952): Pilzkäfer und Käferpilze. - Act. zool. Fenn. (Helsingforsiae) **70**, 250 S.
- BENICK, G. (1975): Neue Atheten (Col., Staphyl.) aus Deutschland und den zunächst gelegenen Ländern. - Stuttgarter Beitr. Naturk., Ser. A, Nr. **273**: 1-23.
- BORCHERDING, R. (1994): Die Käferfauna zweier wärmebegünstigter Buchenwälder Norddeutschlands. - Dipl. Arb. Univ. Göttingen, 147 S.
- CORNELIUS, C. (1884): Verzeichnis der Käfer von Elberfeld und dessen Nachbarschaft. - Jber. naturwiss. Ver. Elberfeld **6**: 1-61.
- DAHMS, W. (1928): Vorläufiges Verzeichnis der bei Oelde i.W. bis zum Jahre 1927 aufgefundenen Käfer. - Ber. naturwiss. Ver. Bielefeld **5**: 179-234.
- DREES, M. (1992): Adventive Käferarten im Hagener Raum. - Natur und Heimat (Münster) **51**: 65-74.
- DREES, M. (1996): Kleine Mitteilungen. 2157: Zur Staphylinidenfauna von Südwestfalen (Staph.). - Entomol. Blätter (Krefeld) **92**: 101-102.
- DREES, M. (1998): Das Ennepetal als Lebensraum ripicoler Käfer. - Natur und Heimat (Münster) **58**: 97-105.
- DREES, M. (1999): *Meotica pallens* (Redt.) und *M. marchica* G. Ben. in Südwestfalen (Staphylinidae). - Entomol. Blätter (Dresden) **95**: 174.
- ERBELING, L. & M. DREES (1992): Die Käferfauna des Kalkhalbtrockenrasens auf dem Kupferberg in Iserlohn-Letmathe (Märkischer Kreis). - Decheniana (Bonn) **145**: 93-107.
- ERBELING, L. & M. ERBELING (1986): Faunistische und ökologische Untersuchungen zur Sukzession aasbesuchender Coleopteren im südlichen Eggegebirge. - Decheniana (Bonn) **139**: 231-240.
- FELDMANN, B. & J. LÜCKMANN (1998): Zur Staphylinidenfauna (Coleoptera) der Kalkmagerrasen im Raum Marsberg. - Mitt. Arb.Gem. Rhein. Koleopt. (Bonn) **8**: 73-100.
- FLECHTNER, G. (1990): Der Kurzflügelkäfer *Leptusa simoni* (Coleoptera: Staphylinidae). Ein Glazialrelikt an der mittleren Nahe. - Mitt. Pollichia (Bad Dürkheim) **77**: 323-328.
- FOLWACZNY, B. (1960): Faunistische Diversa. - Entomol. Blätter (Krefeld) **56**: 187 (Kl. Mitt. Nr. 1698).
- FOLWACZNY, B. (1963): Faunistische Diversa. - Entomol. Blätter (Krefeld) **59**: 52-55 (Kl. Mitt. Nr. 1723-1741).
- FOLWACZNY, B. (1972): Faunistische Diversa (Kl. Mitt. Nr. 1902-1906). - Entomol. Blätter (Krefeld) **68**: 187.
- FOLWACZNY, B. (1976): Faunistische Diversa (Carabidae, Staphylinidae, Cantharidae, Chrysomelidae, Curculionidae) (Kl. Mitt. Nr. 1937). - Entomol. Blätter (Krefeld) **72**: 183-184.
- FOLWACZNY, B. (1980): Bemerkenswerte Funde aus Deutschland, vorwiegend aus Hessen. - Entomol. Blätter (Krefeld) **75**: 173-175.
- FRISCH, J. (1995): Die Käferfauna des Roten Moores (Insecta: Coleoptera). Eine ökologisch-faunistische Studie zur Käferfauna der Rhönmoore. - Beitr. Naturkde. Osthessen (Fulda) **30**: 3-180.
- FÜGNER (1902): Verzeichnis der in der Umgebung von Witten-Ruhr aufgefundenen Käfer. - Witten.
- GEILENKEUSER, W. (1896): Nachtrag zu dem „Verzeichnis der Käfer von Elberfeld und dessen Nachbarschaft“ von Oberlehrer C. Cornelius. - Jber. naturwiss. Ver. Elberfeld (Elberfeld) **8**: 25-48.
- GEILENKEUSER, W. (1925): 2. Nachtrag zum Cornelius'schen Verzeichnis der Käfer von Elberfeld und dessen Nachbarschaft. - Jber. naturwiss. Ver. Elberfeld **15**: 105-110.

- GERHARD, M. (1997): *Oxygaster funebris* Kr., 1856 - Neu für die Rheinprovinz (Col., Staphylinidae). - Mitt. Arb.gem. Rhein. Koleopterologen (Bonn) 7: 26-28.
- GOLLKOWSKI, V. (1995): Die Staphyliniden einer Kaninchenstallung (Col., Staphylinidae). - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) 39: 147-148.
- GRÄF, H. & E. WENZEL (1986): *Trichiusa immigrata* Lohse 1984 auch in der Rheinprovinz (Staph.). - Entomol. Blätter (Krefeld) 82: 123.
- GRUNDMANN, B. (1991): Die Coleopterenfauna des Oppenweher Moores. - Ber. Naturwiss. Verein Bielefeld u. Umgegend 32: 77-123.
- GRUNDMANN, B. & L. ERBELING (1992): Zur Käferfauna des Naturschutzgebietes Bommecketal in Plettenberg (Märkischer Kreis, Sauerland). - Abh. Westf. Mus. Naturkde. Münster (Münster) 54(2): 1-30.
- HAHLBOHM, H. (1998): *Aleochara kamila* Lik. und *Omalium allardi* FAirm. Bris., zwei seltene Staphyliniden im Hühnerstall (Staph.). - Entomol. Blätter (Jena) 94: 64.
- HARTMANN, P. (1979): Biologisch-ökologische Untersuchungen an Staphylinidenpopulationen verschiedener Ökosysteme des Solling. - Dissertation Univ. Göttingen.
- HELLWEG, K. (1989): Kleine Mitteilungen 2088: Bemerkenswerte Staphyliniden-Funde aus Westfalen (Staph.). - Entomol. Blätter (Krefeld) 85: 118-119.
- HENNICKE, S. & G. MÜLLER-MOTZFELD (1998): Die Besiedlung innerstädtischer Grünflächen Greifswalds durch Kurzflügeldecken-Käfer (Coleoptera: Staphylinidae). - Entomol. Gener. (Stuttgart) 23: 107-127.
- HOLLNAICHER, M. & P. WUNDERLE (1987): Erstnachweis von *Myllaena masoni* Matthews. - Entomol. Blätter (Krefeld) 83: 132-134.
- HORION, A. (1967): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer., Bd.XI: Staphylinidae, 3. Teil Habrocerinae bis Aleocharinae (ohne Subtribus Athetae). Überlingen/Bodensee.
- KACHE, P. (1998): Die Besiedlung urbaner Lebensräume durch Kurzflügelkäfer (Coleoptera, Staphylinidae) unter besonderer Berücksichtigung des Dispersionsvermögens und des Reproduktionserfolgs der Arten. - Dissertation Univ. Osnabrück.
- KACHE, P. & H. ZUCCHI (1993): Besiedlung innerstädtischer Kleinstgrünflächen durch Doppelfüßer, Hundertfüßer und Kurzflügelkäfer (Diplopoda, Chilopoda et Staphylinidae). - Z. Ökol. Naturschutz 2 (Jena): 223-243.
- KOCH, K. (1968): Käferfauna der Rheinprovinz. - Decheniana-Beih. (Bonn) 13: I-VIII, 1-382.
- KOCH, K. (1974): Erster Nachtrag zur Käferfauna der Rheinprovinz. - Decheniana (Bonn) 126(1/2): 191-265.
- KOCH, K. (1978): Zweiter Nachtrag zur Käferfauna der Rheinprovinz. - Decheniana (Bonn) 131: 228-261.
- KOCH, K. (1992): Dritter Nachtrag zur Käferfauna der Rheinprovinz. Teil II: Staphylinidae bis Byrrhidae - Decheniana (Bonn) 144: 32-92.
- KÖHLER, F. (1992): Anmerkungen zur Käferfauna der Rheinprovinz IV - Bemerkenswerte Neu- und Wiederfunde. - Mitt. Arb.gem. Rhein. Koleopterologen (Bonn) 2: 65-76.
- KÖHLER, F. (1993): Bisher unbekanntes Belege seltener Käferarten aus der Rheinland-Sammlung des Fuhlrott-Museums Wuppertal (Ins. Col.), Teil 1: Carabidae bis Pselaphidae. - Jber. Naturwiss. Ver. Wuppertal (Wuppertal) 47: 133-147.
- KÖHLER, F. (1994): Revision rheinischer Käfer nach dem ersten Supplementband zu den Käfern Mitteleuropas. Teil II: Staphylinidae, Pselaphidae (Col.). - Mitt. Arb.gem. Rhein. Koleopterologen (Bonn) 3: 69-107.
- KÖHLER, F. (1997): Anmerkungen zur lokalfaunistischen Käfersammlung der landwirtschaftlichen Versuchsgüter Burscheid-Höfchen und Monheim-Laacherhof im Fuhlrott-Museum Wuppertal (Ins., Col.) - Jber. Naturwiss. Ver. Wuppertal (Wuppertal) 50: 59-80.
- KÖHLER, F. (1997a): Anmerkungen zur Käferfauna der Rheinprovinz XI. - Mitt. Arb.gem. Rhein. Koleopterologen (Bonn) 7: 29-51.
- KÖHLER, F. (2000): Untersuchungen zur Käferfauna (Coleoptera) vegetationsarmer, dynamischer Flußufer der Ems nordwestlich Münster mit einer allgemeinen Analyse der deutschen Uferkäferfauna. - Abh. Westf. Mus. Naturkde. Münster (Münster) 62(1): 3-44.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.) 1998: Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Ent. Nachr. Ber. (Dresden), Beih. 4.
- KOLBE, W. (1971): Vergleichende Untersuchungen über die Zusammensetzung der Coleopterenfauna in der Bodenstreu des Naturschutzgebietes Dolingelände Krutscheidt. - Jber. Naturwiss. Ver. Wuppertal (Wuppertal) 24: 64-72.

- KOLBE, W. (1972): Aktivitätsverteilung bodenbewohnender Coleopteren in einem Laubwald und drei von diesem eingeschlossenen Wertmehrhörhorsten mit exotischen Coniferen. - Decheniana (Bonn) **125**: 155-164.
- KOLBE, W. (1973): Die Zusammensetzung der Coleopterenfauna im engeren Aktionsradius der Roten Waldameise (*Formica polyctena*). - Jber. Naturwiss. Ver. Wuppertal (Wuppertal) **26**: 55-60.
- KOLBE, W. (1978): Die Käferfauna des Staatswaldes Burgholz in Wuppertal (MB4708). - Jber. Naturwiss. Ver. Wuppertal (Wuppertal) **31**: 107-130.
- KOLBE, W. (1981): Coleopterologische Ergebnisse aus Fängen mit Boden-Photoektoren im Staatswald Burgholz in Solingen (MB4708), Beitrag für ein Minimalprogramm zur Ökosystemanalyse. - Entomol. Blätter (Krefeld) **76**: 171-177.
- KOLBE, W. (1981a): Die Auswirkungen eines Waldbrandes auf die Coleopteren-Fauna in Kiefernforsten im Raum Brüggel. - Jber. Naturwiss. Ver. Wuppertal (Wuppertal) **34**: 23-36.
- KOLBE, W. (1982): Die Käfer der Bodenstreu ausgewählter Waldbiotope im Gebiet der Gelpe in Wuppertal (MB 4709). - Jber. Naturwiss. Ver. Wuppertal (Wuppertal) **35**: 32-37.
- KOLBE, W. (1984a): Die Coleopteren-Faunen aus zwei Forstbiotopen des Staatswaldes Burgholz, ermittelt mit Boden- und Baum-Photoektoren (Minimalprogramm zur Ökosystemanalyse): das 2. Fangjahr. - Decheniana (Bonn) **137**: 66-78.
- KOLBE, W. (1984b): Coleopterenfänge mit Hilfe von Baum-Photoektoren im Staatswald Burgholz. - Jber. Naturwiss. Ver. Wuppertal (Wuppertal) **37**: 24-34.
- KOLBE, W. (1984c): Arthropodenfänge im Staatswald Burgholz mit Hilfe von Boden-Photoektoren unter besonderer Berücksichtigung der Coleopteren. - Jber. Naturwiss. Ver. Wuppertal (Wuppertal) **37**: 14-23.
- KOLBE, W. (1987): Die Staphyliniden (Coleoptera) der Bodenstreu im Rotbuchen- und Fichtenforst - ökotoxikologische Aspekte - Jber. Naturwiss. Ver. Wuppertal (Wuppertal) **40**: 69-76.
- KOLBE, W. (1988): Die Staphyliniden (Coleoptera) der Waldböden und ihre Beeinflussung durch Na-PCP. - Jber. Naturwiss. Ver. Wuppertal (Wuppertal) **41**: 64-69.
- KOLBE, W. (1992): Das Artenspektrum der Kurzflügler (Coleoptera, Staphylinidae) aus 2 ausgewählten Forstbiotopen. Ergebnisse aus dem Burgholz-Projekt 1978 bis 1990. - Jber. naturwiss. Ver. Wuppertal (Wuppertal) **45**: 17-23.
- KOLBE, W. (1994): Fremdländeranbau und Käfervorkommen. Ergebnisse zweijähriger Untersuchungen aus dem Staatsforst Burgholz in Wuppertal. - Jber. naturwiss. Ver. Wuppertal (Wuppertal) **47**: 40-51.
- KOLBE, W. (1996): Die Coleopteren-Fauna in Forsten mit Fremdländeranbau und heimischen Baumarten (1990-1994). - Jber. Naturwiss. Ver. Wuppertal (Wuppertal) **49**: 128-144.
- KOLBE, W. & A. BRUNS (1988): Insekten und Spinnen in Land- und Gartenbau. Ergebnisse der faunistischen Artenbestandsuntersuchungen in Höfchen (Burscheid) und Laacherhof (Monheim). - Pflanzenbau - Pflanzenschutz (Bonn) **25**.
- KOLBE, W. & G. HOUVER (1973): Der Einfluß großflächiger Bestände von exotischen Coniferenarten auf die Zusammensetzung der Coleopterenfauna der Bodenstreu im Revierförsterbezirk Burgholz. - Jber. Naturwiss. Ver. Wuppertal (Wuppertal) **26**: 31-60.
- KOLBE, W. & G. HOUVER (1977): Standortansprüche bodenbewohnender Coleopteren in ausgewählten Biotopen des Staatswaldes Burgholz. - Jber. Naturwiss. Ver. Wuppertal (Wuppertal) **30**: 55-69.
- KROKER, H. (1978): Die Bodenkäferfauna des Venner Moores (Krs. Lüdinghausen). - Abh. Landesmus. Naturk. Münster **40**(2): 3-11.
- KROKER, H. (1981): Die Bodenkäferfauna im Körbecker Bruch (Kreis Höxter) - Egge-Weser 1981/02: 67-76. Höxter.
- KROKER, H. & K. RENNER (1983): Beitrag zur Kenntnis der Staphylinidenfauna unbewaldeter Habitate der Warburger Börde. - Abh. Westf. Mus. Naturkde. Münster (Münster) **45**(2): 16-23.
- KUNZE, M. & P. KACHE (1998): Zonationszönosen von Kurzflügelkäfern (Coleoptera, Staphylinidae) an Flußufer Nordwestdeutschlands. - Z. Ökol. Natursch. **7**: 29-43.
- LOHSE, G. A. (1962): Über die Käfer eines Müllplatzes in Hamburg-Langenhorn. - Ent. Mitt. Zool. Staatsindust. Zool. Mus. Hamburg **2**: 205 - 211.
- LOHSE, G. A. (1987): Neue Käferarten des Niederelbegebietes und Schleswig-Holsteins. - Bombus (Hamburg) **2**: 305-306.
- LOHSE, G.A. & W. LUCHT (Hrsg.) (1989): Die Käfer Mitteleuropas. Erster Supplementband mit Katalogteil (Bd.12), Krefeld.

- MEISSNER, A. (1998): Die Bedeutung der Raumstruktur für die Habitatwahl von Lauf- und Kurzflügelkäfern (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) - Dissertation TU-Berlin 1998, 184 S.
- MOLENDA, R. (1989): Käfer in kaltluftzeugenden Blockhalden - ökologische Untersuchungen an einem stark bewerteten Spaltenökosystem. - Rdschr. Arb.gem. Rhein. Koleopterologen (Bonn), 1989: 103-111.
- MÜLLER, R. (1973): Bemerkenswerte Käferarten aus Bodenpilzen. - Ent. Ztsch. **83**: 265-274.
- PEETZ, F. (1931): Beiträge zur Käferfauna des westfälisch-lippischen Weserberglandes (Adephaga: II Teil; Polyphaga: Staphylinoidea). - Abh. Westf. Prov. Mus. Naturk. (Münster) **2**: 129-144.
- PEETZ, F. (1936): Käfer bei Ameisen. - Mitt. entomol. Ges. Halle **10**: 20-29.
- PEETZ, F. (1937): Käfer im Hochwassergebiet. - Decheniana (Bonn) **95**: 71-82.
- PEUS, F. (1928): Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt nordwestdeutscher Hochmoore. - Z. Morph. Ökol. Tiere **12**: 533-683.
- POHL-APEL, G. & K. RENNER (1987): Coleopterologische Analyse des Inhaltes von Borkenkäfer-Pheromonfallen im Raum Bielefeld. - Decheniana (Bonn) **140**: 79-86.
- POSPISCHIL, R. (1981): Die Entwicklung der Käferfauna des Naturschutzgebietes „Im Hölken“ von 1958 bis 1977 und die Bedeutung einiger Käferarten als Bioindikatoren. - Jber. Naturwiss. Ver. Wuppertal (Wuppertal) **34**: 78-91.
- PUTHZ, V. (1967): Zur Faunistik deutscher und österreichischer Staphyliniden. - Entomol. Blätter (Krefeld) **63**: 59-60.
- REEKER, A. (1887): Beiträge zur Käferfauna Westfalens. - Jber.zool. Sekt. westf. Prov.Ver. Wiss. Kunst **15**(1886/87): 65-69.
- REHAGE, H.O. (1972): Insekten: Käfer, Libellen, Schmetterlinge. in: Boden, Landschaft, Flora, Fauna. Monographie des Kreises Wiedenbrück: 161-301. Wiedenbrück.
- REHAGE, H.O. & R. FELDMANN (1977): Die Bodenkäferfauna des Eschen-Ahorn-Schluchtwaldes im Hönnetal (Sauerland). - Abh. Landesmus. Naturk. Münster **39**: 58-69.
- REHAGE, H.O. & K. RENNER (1981): Zur Käferfauna des Naturschutzgebietes Jakobsberg. - Natur und Heimat (Münster) **41**: 124-137.
- RENNER, K. (1979): Neuheiten und Seltenheiten der westfälischen Käferfauna I. - Entomol. Blätter (Krefeld) **75**: 79-82.
- RENNER, K. (1980): Faunistisch-ökologische Untersuchungen der Käferfauna pflanzensoziologischer Biotope im Evesell-Bruch bei Bielefeld-Sennestadt. - Ber. naturwiss. Ver. Bielefeld. Sonderheft **2**: 145-176.
- RENNER, K. (1981a): Neuheiten und Seltenheiten der westfälischen Käferfauna II. - Entomol. Blätter (Krefeld) **77**: 101-108.
- RENNER, K. (1981b): Die Käferfauna eines artenreichen Kleinbiotopes im Teutoburger Wald bei Bielefeld. - Ber. Naturwiss. Ver. Bielefeld **25**: 163-175.
- RENNER, K. (1982): Funddaten der neuen *Taxicera* (*Taxicera renneri* Benick) aus dem südöstlichen Westfalen und nordwestlichen Hessen (Col., Staphylinidae). - Entomol. Blätter (Krefeld) **78**: 131-133.
- RENNER, K. (1985): Am Ziegenberg bei Paderborn nachgewiesene Käferarten und ihre Einstufung in die Gefährdungskategorien der Roten Listen. - Decheniana (Bonn) **138**: 92-103.
- RENNER, K. (1987): Zur Käferfauna des Ölbachtales in der Senne bei Bielefeld. - Mitt. Arb.Gem. ostwestf.-lipp. Ent. (Bielefeld) **4**: 17-24.
- RENNER, K. (1991): Neuheiten und Seltenheiten der westfälischen Käferfauna (V). - Entomol. Blätter (Krefeld) **87**: 129-137.
- RENNER, K. (1997a): Die Käfersammlung von Gerhard Jankowski: Eine einzigartige Datenquelle und ihre Auswertung. 1. Teil. - Mitt. Arb.Gem. ostwestf.-lipp. Ent. (Bielefeld) **13**: 1-9.
- RENNER, K. (1997b): Die Käfersammlung von Gerhard Jankowski: Eine einzigartige Datenquelle und ihre Auswertung. 2. Teil. - Mitt. Arb.Gem. ostwestf.-lipp. Ent. (Bielefeld) **13**: 25-33.
- RENNER, K. (1998): Neuheiten und Seltenheiten der westfälischen Käferfauna VI. - Entomol. Blätter (Jena) **94**: 91-97.
- RENNER, K. (1999): Einige Käferfunde aus der Senne und dem Teutoburger Wald als Erst- oder Zweitnachweise für Westfalen (Coleoptera) - Mitt. Arb.Gem. ostwestf.-lipp. Ent. (Bielefeld) **15**: 34-37.
- RENNER, K. & B. GRUNDMANN (1984): Neuheiten und Seltenheiten der westfälischen Käferfauna III. - Entomol. Blätter (Krefeld) **80**: 71-84.
- RENNER, K., B. GRUNDMANN & R. BORCHERDING (1986): Neuheiten und Seltenheiten der westfälischen Käferfauna (IV). - Entomol. Blätter (Krefeld) **82**: 44-54.

- ROSSI, G. DE (1882): Die Käfer der Umgebung von Neviges. - Verh. naturhist. Ver. preuß. Rheinl. Westf. **39**: 196-215.
- ROSSI, G. DE (1898): Bemerkungen und Nachträge zur Käferfauna Westfalens. - Jber. zool. Sekt. westf. Prov. Ver. Wiss. Kunst **27**(1898/99): 53-69.
- RUSCH, J. (1990): Untersuchungsergebnisse zum Vorkommen mitteleuropäischer Arten der Gattung *Gyrophana* Mannh. in verschiedenen Pilzen (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) **34**: 263-268.
- SCHMIDT, R. (1913): Die Salzwasserfauna Westfalens. - Jber. westf. Prov. Ver. Wiss. Kunst **41**: 29 - 94.
- SCHOLZE, P. & M. JUNG (1994): Beiträge zur Faunistik der Kurzflügler (Col., Staphylinidae) im Nordharz und Vorland. II. Unterfamilie Aleocharinae. - Ent. Nachr. Ber. (Dresden) **38**: 7-12.
- SIEDE, D. (1977): Die Käferfauna des Naturschutzgebietes Deutener Moor und Witte Berge (Westfalen). - Decheniana Beih. (Bonn) **20**: 85-95.
- SPÄH, H. (1980): Faunistisch-ökologische Untersuchungen der Carabiden- und Staphylinidenfauna verschiedener Standorte Westfalens (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae). - Decheniana (Bonn) **133**: 33-56.
- STRZELCZYK, P. (1988): Staphylinidae (Col.) aus großstädtischen Habitaten I. - Ent. Nachr. Ber. **32**: 227-231.
- STUMPF, Th. (1993): Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna des südlichen Bergischen Landes. - Mitt. Arb.gem. Rhein. Koleopterologen (Bonn) **3**: 13-40.
- TERLUTTER, H. (1995): Coleoptera Westfalica: Familia Staphylinidae. Subfamiliae Oxytelinae, Oxyporinae, Steninae, Euaestethinae, Paederinae. - Abh. Westf. Mus. Naturkde. Münster (Münster) **57**(1): 3-83.
- TOPP, W. (1971): Zur Ökologie der Müllhalden. - Anm. Zool. Fenn. **8**: 194 - 222.
- VERHOEFF, C. (1890): Die Coleopterenfauna von Soest. - Verh. naturhist. Ver. preuß. Rheinl. Westf. (Münster) **47**: 1-17.
- VOGEL, J. (1983): Zur Köderwirkung von Äthanol auf *Megaloscapa punctipennis* (Kr.) und andere Staphylinidae (Coleoptera). - Entom. Nachr. Ber. (Leipzig) **27**: 33-35.
- VOGEL, J. (1986): Faunistisch-ökologische Untersuchungen auf dem Neuen Müllberg Leipzig-Möckern. - Entom. Nachr. Ber. (Leipzig) **30**: 157-165.
- WAGNER, T. (1992): Zur winterlichen Bodenkäferfauna des südlichen Bergischen Landes (Ins., Col.). - Mitt. Arb.Gem. Rhein. Koleopt. (Bonn) **2**(4): 123-130.
- WAGNER, Th. (1995): Faunistik der im Rheinland vorkommenden *Bolitochara*-Arten (Col., Staphylinidae). - Mitt. Arb.gem. Rhein. Koleopterologen (Bonn) **5**: 217-228.
- WAHLBRINK, D. & H. ZUCCHI (1995): Zur Besiedlung eines stadteinwärtsführenden Bahndamms durch Kurzflügelkäfer (Coleoptera: Staphylinidae). - Z. Ökol. Natursch. **4**: 61-73.
- WEBER, L. (1903): Verzeichnis der bei Cassel in einem Umkreis von ungefähr 25 Kilometern aufgefundenen Coleopteren. - Abh. u. Ber. Var. Naturkde. Kassel **67**: 97-212.
- WENZEL, E. (1988): Die Käferfauna des oberbergischen Ülfetals, Teil I. - Jber. Naturwiss. Ver. Wuppertal (Wuppertal) **41**: 35-52.
- WENZEL, E. (1989): Die Käferfauna des oberbergischen Ülfetales, Teil II. - Jber. Naturwiss. Ver. Wuppertal (Wuppertal) **42**: 18-37.
- WENZEL, E. (1991): Nachweis bemerkenswerter Käferarten aus dem Bergischen Land. - Mitt. Arb.Gem. Rhein. Koleopt. (Bonn) **1**(2): 35-42.
- WENZEL, E. (1994): Untersuchungen zur Ökologie und Phänologie laubwaldtypischer Koleopterenassoziationen im Bergischen Land bei Radevormwald. - Mitt. Arb.gem. Rhein. Koleopterologen (Bonn) **3**: 7-40.
- WENZEL, E. (1997): Die Uferkäferfauna (Coleoptera) der Bever-Talsperre bei Hückeswagen im Bergischen Land. - Decheniana Beih. (Bonn) **36**: 279-350.
- WESTHOFF, F. (1881): Die Käfer Westfalens 1. - Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westfalens (Bonn) **38**, Supplement: 1-140.
- WESTHOFF, F. (1882): Die Käfer Westfalens 2. - Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westfalens (Bonn) **38**, Supplement: 141-232.
- WESTHOFF, F. (1886): Augenblicklicher Stand der wissenschaftlichen Erforschung der westfälischen Käferfauna. - Jber. zool. Sekt. d. westf. Prov. Ver. f. wiss. u. Kunst **14**: 49-54. Münster.

Anschrift des Verfassers:

Dr. Klaus Renner, Wickenkamp 9a, D-33615 Bielefeld
e-Mail: klausrenner.bielefeld@t-online.de

VI. Verzeichnis der Arten

abdominalis (Oxypoda)	178	brevicollis (Phymatura)	39
acuminata (Homoeusa)	186	brevicornis (Myllaena)	9
acuminata (Oxypoda)	175	brevicornis (Oxypoda)	177
adscita (Placusa)	33	brevipennis (Aleochara)	193
aegra (Atheta)	98	britanniae (Atheta)	129
aeneicollis (Atheta)	122	brunnea (Plataraea)	74
aeneipennis (Atheta)	137	brunneipennis (Atheta)	116
aequata (Dinaraea)	72	cadaverina (Atheta)	106
aethiops (Calodera)	161	caerulea (Gnypeta)	52
affinis (Gyrophaena)	20	caesa (Falagria)	45
aliena (Phloeopora)	158	caesula (Ousipalia)	70
alpestris (Liogluta)	78	cambrica (Aloconota)	59
alternans (Oxypoda)	180	canaliculata (Drusilla)	148
amicorum (Atheta)	95	canaliculata (Thiasophila)	187
amicula (Atheta)	95	canescens (Atheta)	113
amplicollis (Atheta)	110	capitalis (Meotica)	168
analisis (Amischa)	63	carbonaria (Gnypeta)	53
anceps (Lyprocorrhe)	68	carbonaria (Oxypoda)	178
angulata (Thiasophila)	187	castanoptera (Atheta)	116
angustata (Gyrophaena)	27	castanoptera (Euryusa)	38
angustula (Dinaraea)	71	cauta (Atheta)	131
annularis (Oxypoda)	182	celata (Atheta)	114
apicatus (Holobus)	15	cinnamomea (Thamiaraea)	147
aquatica (Atheta)	121	cinnamoptera (Atheta)	136
aquatilis (Atheta)	120	circellaris (Geostiba)	70
arborea (Oxypoda)	180	clancula (Dochmonota)	69
arcana (Dinaraea)	73	clavigera (Rhopalocerina)	36
arctica (Atheta)	79	clientula (Atheta)	108
aterrima (Acrotona)	143	coarctata (Euryusa)	39
atomaria (Atheta)	99	coarctata (Tachyusa)	49
atra (Thinonoma)	50	cognatus (Zyras)	152
atramentaria (Atheta)	134	collaris (Zyras)	148
atrata (Placusa)	32	complanata (Placusa)	30
atricolor (Atheta)	97	complicans (Encephalus)	19
aubei (Schistoglossa)	56	concinna (Myrmecocephalus)	46
autumnalis (Atheta)	128	concolor (Brachyusa)	54
badia (Ocalea)	163	concolor (Ocalea)	166
balteata (Tachyusa)	49	concolor (Phloeopora)	156
basicornis (Atheta)	126	confragrosa (Myrmoeicia)	153
bella (Bolitochara)	41	confusa (Notothecta)	68
benicki (Acrotona)	144	congrua (Gyrophaena)	25
benickiella (Atheta)	94	consanguinea (Acrotona)	141
bennetti (Ilyobates)	158	constricta (Tachyusa)	48
bernhaueri (Phloeopora)	158	contristata (Atheta)	120
bicolor (Oxypoda)	183	coriaria (Atheta)	124
bifoveolata (Amischa)	63	corticalis (Phloeopora)	157
bihamata (Gyrophaena)	26	corticina (Dexiogyga)	186
bilineata (Aleochara)	201	corvina (Atheta)	93
binotata (Aleochara)	202	crassicornis (Atheta)	130
bipustulata (Aleochara)	202	cribrata (Atheta)	100
boleti (Gyrophaena)	29	cunctans (Hygropora)	171
boletophila (Atheta)	128	cuniculorum (Aleochara)	200
bonnairei (Amarochara)	163	currax (Aloconota)	60
boreella (Atheta)	100	curtipennis (Schistoglossa)	56
brachyptera (Oxypoda)	181	curtula (Aleochara)	191
brevicollis (Gymnusa)	6	curtula (Cyphea)	30

cuspidatus (Anomognathus)	34	fumida (Leptusa)	37
dadopora (Atheta)	112	funebri (Aleochara)	196
debilis (Atheta)	85	funebri (Oxyopoda)	176
decipiens (Amischa)	65	funestus (Zyras)	150
decumana (Euryalea)	191	fungi (Atheta)	109
deformis (Atheta)	86	fungicola (Atheta)	129
delicatula (Hydrosmecta)	57	fungivora (Atheta)	88
dentata (Dinarda)	155	fussi (Atheta)	108
deplanata (Taxicera)	71	gagatina (Atheta)	103
depressa (Placusa)	30	ganglbaueri (Atheta)	98
dilaticornis (Atheta)	101	gemina (Schistoglossa)	56
dimidiata (Hygronoma)	18	gentilis (Gyrophaena)	22
discoidea (Cypha)	17	gentilis (Haploglossa)	188
divisa (Atheta)	90	gilvicollis (Atheta)	111
doderoi (Oxyopoda)	178	glabricula (Atheta)	99
drusilloides (Schistoglossa)	56	gracilenta (Aleuonota)	145
dubia (Myllaena)	7	gracilicornis (Hydrosmecta)	57
dubiosa (Plataraea)	74	gracilicornis (Myllaena)	9
ebenina (Atheta)	119	gracilis (Myllaena)	10
egregia (Aleuonota)	145	gracilis (Tachyusida)	39
eichhoffi (Aloconota)	58	graminicola (Atheta)	119
elongata (Myllaena)	9	granaria (Oligota)	11
elongatula (Atheta)	79	granigera (Liogluta)	75
elongatula (Oxyopoda)	171	gregaria (Aloconota)	62
emarginata (Lomechusa)	154	gyllenhali (Atheta)	82
episcopalis (Atheta)	137	haematoptera (Aleochara)	192
eremita (Boreophilia)	57	haemoptera (Aleochara)	199
ermischi (Atheta)	117	haemorrhoea (Oxyopoda)	184
erosa (Deinopsis)	5	hagensii (Dinarda)	155
erraticus (Zyras)	149	hanseni (Cypha)	18
erythroptera (Aleochara)	201	hanseni (Atheta)	107
europaea (Atheta)	136	harwoodi (Atheta)	92
euryptera (Atheta)	89	haworthi (Zyras)	149
exarata (Tachyusa)	49	heeri (Aleochara)	198
excellens (Atheta)	89	hepatica (Enalodroma)	62
exigua (Acrotona)	139	heymesii (Atheta)	120
exigua (Brachida)	19	hospita (Thamiaraea)	148
exilis (Meotica)	167	humeralis (Zyras)	151
exillima (Meotica)	168	hybrida (Atheta)	105
eximia (Hydrosmecta)	57	hygrobia (Atheta)	79
exoleta (Oxyopoda)	179	hygrotopora (Atheta)	80
fallaciosa (Atheta)	87	hypnorum (Atheta)	115
fallax (Dacrila)	55	imitator (Cypha)	16
fasciata (Gyrophaena)	25	immersa (Dadobia)	73
ferruginea (Oxyopoda)	182	immigrata (Trichiusa)	146
filiformis (Oxyopoda)	182	impressa (Autalia)	43
fimorum (Atheta)	123	incana (Alianta)	145
flavicornis (Holobus)	14	incognita (Atheta)	121
flavicornis (Oxyopoda)	182	incompleta (Placusa)	32
flavipennis (Bohemiellina)	48	inconspicua (Aleochara)	194
flavipes (Notothecta)	67	inconspicua (Zoosetha)	170
forcipata (Amischa)	66	incrassata (Mniusa)	170
formiceticola (Oxyopoda)	183	indubia (Atheta)	99
formosa (Oxyopoda)	179	induta (Oxyopoda)	177
forticornis (Amarochara)	163	inexpectata (Oligota)	13
forticornis (Dexiogyra)	186	inflata (Oligota)	13
fragilis (Hydrosmecta)	57	infusata (Myllaena)	11
fulgidus (Zyras)	149	inhabilis (Paranopleta)	73
fumata (Aleochara)	199	inquilina (Thiasophila)	187

inquinula (Atheta)	97	major (Aleochara)	201
insecta (Aloconota)	61	malleus (Atheta)	83
intermedia (Atheta)	124	marchica (Meotica)	167
intermedia (Myllaena)	7	marchii (Thecturota)	36
intricata (Aleochara)	193	marcida (Atheta)	135
irmgardis (Rheochara)	203	marginalis (Haploglossa)	190
ischnocera (Atheta)	131	masoni (Myllaena)	11
jelineki (Pseudomicrodota)	36	maura (Ocyusa)	169
joyi (Gyrophaena)	26	melanaria (Atheta)	108
joyioides (Gyrophaena)	27	melanocera (Atheta)	82
kamila (Aleochara)	196	melichari (Aleochara)	201
kochi (Atheta)	94	micans (Liogluta)	76
korgei (Pronomaea)	11	microptera (Liogluta)	77
kraatzii (Myllaena)	8	mihoki (Aloconota)	60
kraatzii (Borboropora)	47	minima (Gyrophaena)	24
laevana (Atheta)	132	minuscula (Atheta)	99
laevigata (Aleochara)	199	minuta (Myllaena)	10
laeviuscula (Cypha)	16	miranda (Oxypoda)	181
languida (Disopora)	58	moerens (Aleochara)	199
lanuginosa (Aleochara)	197	moesta (Aleochara)	194
lata (Aleochara)	192	monticola (Atheta)	88
lateralis (Lypoglossa)	66	morion (Tinotus)	190
laticeps (Atheta)	87	mortuorum (Atheta)	101
laticollis (Atheta)	122	mul santi (Apimela)	167
laticollis (Zyras)	153	mul santi (Bolitochara)	41
laticornis (Aleochara)	192	munsteri (Gyrophaena)	24
latipennis (Ocalea)	166	muscorum (Acrotona)	142
latissima (Agaricochara)	29	mutata (Oxypoda)	180
lentula (Oxypoda)	177	myrmecobia (Atheta)	126
leonhardi (Atheta)	135	nana (Gyrophaena)	22
leucopus (Ischnopoda)	51	negligens (Atheta)	109
liliputana (Atheta)	100	nidicola (Atheta)	127
limbatus (Zyras)	150	nidicola (Haploglossa)	189
linearis (Dinaraea)	72	nigella (Pachnida)	146
liturata (Atheta)	93	nigerrima (Acrotona)	142
lividipennis (Nehemitropia)	67	nigra (Anaulacaspis)	47
longicollis (Disopora)	58	nigra (Atheta)	111
longicornis (Atheta)	138	nigricollis (Ilyobates)	159
longicornis (Autalia)	44	nigricornis (Atheta)	91
longicornis (Cypha)	15	nigrifrons (Plataraea)	74
longipes (Oxypoda)	174	nigripes (Atheta)	133
longitarsis (Chilomorpha)	162	nigrita (Calodera)	160
longitarsis (Parocytusa)	162	nigritula (Atheta)	93
longiuscula (Liogluta)	76	nigrocincta (Oxypoda)	182
longula (Hydrosmecha)	57	nigrofusca (Amischa)	64
lucens (Oxypoda)	180	nitella (Atheta)	94
lucida (Bolitochara)	42	nitida (Cypha)	18
lucidula (Gyrophaena)	26	nitidiventris (Ocyusa)	170
lugens (Zyras)	152	nitidiventris (Phloeopora)	157
lugubris (Oxypoda)	171	norvegica (Leptusa)	37
lurida (Oxypoda)	180	obfusca (Acrotona)	141
luridipennis (Atheta)	80	objecta (Tachyusa)	48
luteicornis (Tomoglossa)	70	obliqua (Bolitochara)	39
luteipes (Atheta)	87	oblita (Atheta)	127
lygaea (Aleochara)	198	obscura (Cordalia)	44
macella (Apimela)	167	obscura (Ischnoglossa)	185
macrocera (Atheta)	130	obscurus (Callicerus)	55
maculata (Aleochara)	199	obsoleta (Gyrophaena)	20
maerkelii (Dinarda)	155	obtusangula (Atheta)	84

occulta (Atheta)	88	ravilla (Atheta)	125
opaca (Oxypoda)	173	recondita (Oxypoda)	183
opaca (Phloeopora)	156	renneri (Taxicera)	70
optabilis (Euryusa)	38	rhenana (Atheta)	87
orbata (Atheta)	109	rigidicornis (Callicerus)	55
orphana (Atheta)	108	riparia (Calodera)	160
ovulum (Cypha)	17	ripicola (Atheta)	87
pagana (Liogluta)	75	ripicola (Gnypeta)	53
pallens (Meotica)	167	rivularis (Autalia)	44
palleola (Atheta)	94	rivularis (Ocalea)	166
pallidicornis (Atheta)	104	rosskotheni (Gyrophaena)	22
palustris (Atheta)	84	rostrata (Pronomaea)	11
paracrassicornis (Atheta)	130	rousi (Gyrophaena)	21
paradoxa (Lomechusa)	154	rubens (Ityocara)	162
paradoxa (Pycnota)	63	rubicunda (Parocyusa)	162
parapicipennis (Atheta)	138	rubiginosa (Silusa)	35
parca (Atheta)	86	rubra (Silusa)	36
parens (Acrotona)	142	rubrior (Gnypeta)	54
parva (Oligota)	12	rudiventris (Dochmonota)	70
parvula (Acrotona)	144	rufa (Oxypoda)	178
perfoliata (Taxicera)	71	rufescens (Calodera)	161
pervagata (Atheta)	101	ruficollis (Leptusa)	38
picata (Ocalea)	164	ruficornis (Aleochara)	200
picina (Deubelia)	169	rufotestacea (Aleuonota)	144
picipennis (Haploglossa)	190	rugipennis (Gyrophaena)	22
picipes (Atheta)	107	rugulosa (Oxypoda)	180
pilicornis (Atheta)	128	sanguinea (Aleochara)	198
pittionii (Atheta)	96	scapularis (Alaobia)	69
plana (Homalota)	33	scitula (Tachyusa)	50
planifrons (Aloconota)	59	scotica (Atheta)	86
plicata (Myrmoecia)	153	scribae (Phloeopora)	158
polita (Gyrophaena)	28	seminula (Cypha)	18
poweri (Gyrophaena)	23	semirufa (Stichoglossa)	185
praecox (Oxypoda)	180	septentrionum (Hydrosmecta)	58
pratensicola (Oxypoda)	183	sequanica (Atheta)	84
procerca (Atheta)	126	sericophila (Taxicera)	70
procerula (Oxypoda)	172	serrata (Atheta)	107
prolixa (Ischnoglossa)	185	setigera (Atheta)	132
propinquus (Ilyobates)	159	similis (Zyras)	152
prospera (Devia)	184	simoni (Leptusa)	38
protensa (Calodera)	161	sinuata (Euryusa)	39
pseudotenera (Acrotona)	142	skalitzkyi (Oxypoda)	177
puberula (Aleochara)	193	sodalis (Atheta)	101
puberula (Atheta)	94	soedermani (Atheta)	94
pubicollis (Lomechusa)	154	sordidula (Atheta)	113
pulchella (Gyrophaena)	20	soror (Oxypoda)	183
pulchella (Leptusa)	37	spadicea (Rheochara)	202
pulchra (Bolitochara)	42	sparsa (Aleochara)	195
pulicaria (Cypha)	18	spatula (Atheta)	89
pumilio (Oligota)	14	spectabilis (Oxypoda)	176
pumilio (Placusa)	33	spinifer (Phytosus)	36
puncticollis (Atheta)	131	spissicornis (Aleochara)	192
puncticollis (Autalia)	44	stichai (Aleochara)	196
punctipennis (Megaloscapa)	37	stiliformis (Calodera)	162
punctum (Cypha)	18	strandiella (Atheta)	128
pusillima (Oligota)	13	strictula (Gyrophaena)	28
putrida (Atheta)	136	strumosa (Lomechusoides)	153
pygmaea (Acrotona)	140	subglabra (Atheta)	107
pygmaea (Dinarda)	155	subgrandis (Aloconota)	62

subrugosa (Atheta)	133	trinotata (Atheta)	105
subsINUATA (Atheta)	111	tristis (Aleochara)	194
subterranea (Neohilara)	69	uliginosa (Calodera)	160
subtilis (Atheta)	98	ultima (Disopora)	58
subtilissima (Hydrosmeeta)	57	umbratica (Ischnopoda)	51
sulcatula (Falagria)	45	umbrosa (Amarochara)	162
sulcifrons (Aloconota)	61	vagepunctata (Aleochara)	198
suturalis (Crataraea)	188	validiuscula (Rhopalotella)	158
sylvicola (Acrotona)	139	variegata (Gymnusa)	6
tachyporoides (Placusa)	31	velata (Dasygynpeta)	52
talpa (Amidobia)	66	verna (Aleochara)	202
tarda (Oxypoda)	181	vestita (Atheta)	139
tarsalis (Cypha)	17	vicina (Oxypoda)	178
teres (Phloeopora)	155	viduata (Schistoglossa)	56
terminalis (Atheta)	81	vilis (Atheta)	87
testacea (Oxypoda)	180	villosa (Aleochara)	198
testacea (Phloeopora)	156	villosula (Haploglossa)	188
testaceipes (Atheta)	101	vittata (Oxypoda)	174
thoracica (Falagrioma)	46	voeslauensis (Atheta)	101
tibialis (Atheta)	107	volans (Atheta)	83
tmolosensis (Atheta)	82	williamsi (Gyrophaena)	25
togata (Oxypoda)	179	wuesthoffi (Liogluta)	77
transversalis (Gyrophaena)	26	xanthopus (Atheta)	118
triangulum (Atheta)	117	zosteræ (Atheta)	111

Zur „*Coleoptera Westfalica*“ sind bisher folgende Beiträge erschienen:

- ANT, H. (1971): *Coleoptera Westfalica*. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster **33**, Heft 2: 1-64. vergriffen.
- STÖVER, W. (1972): *Coleoptera Westfalica*: Familia *Cerambycidae*. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster **34**, Heft 3: 1-42. vergriffen.
- GRIES, B., D. MOSSAKOWSKI & F. WEBER (1973): *Coleoptera Westfalica*: Familia *Carabidae*, Genera *Cychnus*, *Carabus* und *Calosoma*. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster **35**, Heft 4: 1-80. vergriffen.
- GRIES, B. (1975): *Coleoptera Westfalica*: Familia *Cicindelidae*. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster **37**, Heft 2: 3-12. vergriffen.
- KROKER, H. (1975): *Coleoptera Westfalica*: Familia *Silphidae*. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster **37**, Heft 2: 13-41. vergriffen.
- RUDOLPH, R. (1976) *Coleoptera Westfalica*: Familia *Carabidae*, Genera *Leistus*, *Nebria*, *Notiophilus*, *Blethisa* und *Elaphrus*. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster **38**, Heft 2: 3-22. vergriffen.
- RUDOLPH, R. (1976): *Coleoptera Westfalica*: Familia *Carabidae*, Genera *Perileptus*, *Thalassophilus*, *Epaphius*, *Trechus*, *Trechoblemus* und *Lasiotrechus*. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster **38**, Heft 2: 23-30. vergriffen.
- KROKER, H. (1976): *Coleoptera Westfalica*: Familia *Leptinidae* und Familia *Catopidae*. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster **38**, Heft 4: 3-39.
- ALFES, C. & H. BILKE (1977): *Coleoptera Westfalica*: Familia *Dytiscidae*. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster **39**, Heft 3/4: 1-109. vergriffen.
- LUCHT, W. (1979): *Coleoptera Westfalica*: Familia *Cerophytidae* und Familia *Eucnemidae*. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster **41**, Heft 1: 29-38. vergriffen.
- KROKER, H. (1980): *Coleoptera Westfalica*: Familia *Elateridae*. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster **42**, Heft 3: 3-66.
- LUCHT, W. (1981): *Coleoptera Westfalica*: Familia *Trogositidae*. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster **43**, Heft 3: 35-42.
- ERBELING, L. & W. SCHULZE (1983): *Coleoptera Westfalica*: Familia *Oedemeridae*. - Abh. Westf. Mus. Naturk. Münster **45**, Heft 3: 3-19.
- TERLUTTER, H. (1984): *Coleoptera Westfalica*: Familia *Staphylinidae*, Subfamilie *Micropeplinae*, *Piestinae*, *Phloeocharinae*, *Metopsiinae*, *Proteininae*, *Omalinae*. - Abh. Westf. Mus. Naturk. Münster **46**, Heft 1: 3-46.
- KROKER, H. (1986): *Coleoptera Westfalica*: Familia *Chrysomelidae* (ohne Unterfamilie *Alticinae*). - Abh. Westf. Mus. Naturk. Münster **48**, Heft 4: 3-120.
- BALKENOHL, M. (1988): *Coleoptera Westfalica*: Familia *Carabidae*, Subfamilie *Scaritinae* et *Brosicinae*. - Abh. Westf. Mus. Naturk. **50**, Heft 4: 3-28.
- ERBELING, L. & W. SCHULZE (1988): *Coleoptera Westfalica*: Familia *Histeridae* und Familia *Sphaeritidae*. - Abh. Westf. Mus. Naturk. Münster **50**, Heft 4: 29-83.
- ERBELING, L. & K. HELLWEG (1989): *Coleoptera Westfalica*: Familie *Cleridae*, *Derodontidae* et *Lymexylidae* (*Lymexylonidae*). - Abh. Westf. Mus. Naturk. Münster **51**, Heft 4: 3-19.
- ASSMANN, T. & W. STARKE (1990): *Coleoptera Westfalica*: Familia *Carabidae*, Subfamilie *Callistinae*, *Oodinae*, *Licininae*, *Badistrinae*, *Panagaeinae*, *Colliurinae*, *Aephniinae*, *Lebiinae*, *Demetriinae*, *Cymindinae*, *Dromiinae* et *Brachininae*. - Abh. Westf. Mus. Naturk. Münster **52**, Heft 1: 3-61.
- SCHULZE, W. (1990) : *Coleoptera Westfalica*: Familie *Lycidae*, *Omalysidae* et *Lampyridae*. - Abh. Westf. Mus. Naturk. Münster **52**, Heft 2: 3-20.
- TERLUTTER, H. (1995): *Coleoptera Westfalica*: Familia *Staphylinidae*, Subfamilie *Oxytelinae*, *Oxyporinae*, *Steninae*, *Euaesthetinae*, *Paederinae*. - Abh. Westf. Mus. Naturk. Münster **57**, Heft 1: 3-84.
- ZICKLAM, H. & H. TERLUTTER (1998): *Coleoptera Westfalica*: Familia *Cerambycidae* (Nachtrag). - Abh. westf. Mus. Naturk. **60**, Heft 3: 3-52

