

Faunistische und floristische Mitteilungen 8

A. Zoologie

- Sinodendron cylindricum* L. (Kleiner Nashornkäfer). September 1951 in größerer Menge in verrotteten Sägespänen bei der Ziegelei am Bahnhof Reken, Krs. Borken. A. Schütz, Burlo.
- Charadrius dubius* Scopoli (Flußregenpfeifer). Am 24. 4. 1952 beobachtete ich von der Emsbrücke Schiffahrter Damm aus einen Flußregenpfeifer auf einer Sandfläche am Ufer der regulierten Ems. W. Vornefeld, Münster.
- Haematopus ostralegus* L. (Austernfischer). Am 3. 3. 1952 beobachtete ich 2 Austernfischer auf dem rechten, etwas überschwemmten Weserufer bei Petershagen. In Gesellschaft von 14 Bleßhühnern gründelten die beiden Tiere im seichten Wasser. F. Frielinghaus, Petershagen.

B. Botanik

- Botrydium granulatum*: September 1951 an der Ems an der Schiffahrt nördlich Münster. H. Kaja, Münster.
- Struthiopteris germanica* (Deutscher Straußfarn): im Volmetal bei Priorei. Längsausdehnung des Bestandes etwa 30 Schritte. Wahrscheinlich identisch mit dem bereits früher durch Herrn Brockhaus, Lüdenscheid, entdeckten Bestand. W. Langhorst, Hagen.
- Asplenium septentrionale* (Nordischer Streifenfarn): 31. 3. 49 Südhang eines Berges am Hengsteysee, Krs. Dortmund (neuer, in der Literatur nicht verzeichneter Standort). H. Neidhardt, Dortmund. — August 1951 in einem Steinbruch im Mäckinger-Bachtal bei Hagen 70 Exemplare von meist Handtellergröße gezählt (entdeckt von Frl. Hestermann). W. Langhorst, Hagen. — Mai 1951 Einzelvorkommen bis zu Beständen auf den Grauwackefelsen im Volmetal ober- und unterhalb Dahl, vereinzelt auch Neubesiedlung von Felsen, die in jüngerer Zeit bei Straßenerweiterungsarbeiten abgesprengt wurden (von Beckhaus mitgeteilt). W. Langhorst, Hagen. — Mai 1951 zwei handgroße Rasen am Klusenberg (Hengsteysee) auf Ruhsandstein, Südhang (Beckhaus erwähnt den nahegelegenen Sonnenstein als Fundort). W. Langhorst, Hagen.

- Osmunda regalis* (Königsfarn): 3. 8. 50 Weggraben in der Höster Mark, 5 km südöstlich Lengerich (Westf.). H. Neidhardt, Dortmund. — 23. 6. 51 1 km westlich Steinhorst (Krs. Paderborn) im südlichen Straßengraben. P. Graebner, Delbrück.
- Botrychium lunaria* (Mondraute): 1936 Hövelriege am Furlbach beim Jägerkrug, später nicht mehr. G. Pollkläsener, Hövelriege/Paderborn. — 13. 6. 48 Kalktriften an der Dechenhöhle, Krs. Iserlohn. H. Neidhardt, Dortmund.
- Lycopodium annotinum* (Sprossender Bärlapp): 1930—1935 in einem Kiefernwald in Hövelriege und im NSG Furlbachtal. G. Pollkläsener, Hövelriege/Paderborn. — 1951 im Revier Leiberg, Krs. Büren. A. Schrader, Wünnenberg. — 9. 9. 51 Elsebachtal bei Villigst/Ruhr. H. Dahlhaus, Dortmund-Wellinghofen. — Im Eilper Berg, Nähe Kuhweide. Erster Fund dieser Art im Hagener Gebiet. Kleiner Bestand von etwa 1 qm. W. Langhorst, Hagen.
- Zanichellia palustris* (Sumpfteichfaden, in Paderborn: Padergras): 1936 Lutterkolk bei Lippspringe. G. Pollkläsener, Hövelriege/Paderborn. — 7. 9. 50 Gräben und Bombentrichter in Dortmund-Huckarde. H. Neidhardt, Dortmund.
- Calla palustris* (Sumpf-Schlangenzur): um 1938 Klausheide im Apelteich und Hövelriege im Rixelteich, jetzt nur noch zwischen Hövelriege und Hof Bredemeier. G. Pollkläsener, Hövelriege/Paderborn. — September 1951 häufig in einem verlandenden Tümpel an der Wopel bei Gütersloh. H. Sakautzky, Gütersloh.
- Narthecium ossifragum* (Moorlilie): 1951 am Mesumer Damm zwischen Clemenshafen und Mesum. J. Bercks, Burgsteinfurt.
- Epipactis violacea*: Eine Überprüfung der Angaben in den faunistischen und floristischen Mitteilungen 4 (Natur u. Heimat 1950, 2. Heft, S. 95) ergab, daß die an der Straße Sennelager—Delbrück wachsenden Pflanzen zu der typischen Rasse (*platyphylla*) der *Epipactis latifolia* zu ziehen sind. P. Graebner, Delbrück.
- Polygonum bistorta* (Wiesenknöterich): 23. 5. 48 östl. Bhf. Elsen (Krs. Paderborn) neben der Bahn. P. Graebner, Delbrück. — Mai 1951 Ruhrtwasser bei Blankenstein. D. Steinhoff, Bochum.

- Trollius europaeus* (Trollblume): 30. 6. 51 Bremketal zwischen Mollseifen und Züschen. F. G. Schroeder, Dortmund-Kirchhörde.
- Aconitum Napellus* (Blauer Eisenhut): 11. 8. 51 im Ruhrtal oberhalb Niedersfeld (Krs. Brilon). Bestätigung des Fundes von Schemmann 1889. P. Graebner, Delbrück.
- Lepidium ruderale* (Schuttkresse): 1948 und 1949 ganze Trümmerflächen in Paderborn am Detmolder Tor und in der Kleppergasse bedeckend. J. Scholz, Bödexen.
- Thlaspi alpestre* (Alpenhellerkraut): 17. 4. 49 rasiger Südrand des Hengsteysees (Nähe des Verschiebebahnhofs), Krs. Hagen. H. Neidhardt, Dortmund. — Zahlreiche Exemplare Nähe „Barmer Baum“ an der Böschung des alten Bahnüberganges bei Hagen. (Bestätigung der Funde von Pries 1913). W. Langhorst, Hagen.
- Saxifraga granulata* (Körner-Steinbrech): 1951 bei Wünnenberg auf Weidekoppeln am Zünsdorfer Hang — 1951 an den Hängen am Weg von Wünnenberg nach Fürstenberg mehrfach. A. Schrader, Wünnenberg. — Mai 1951 zahlreiche Exemplare Nähe „Barmer Baum“ an der Böschung des alten Bahnüberganges bei Hagen. W. Langhorst, Hagen.
- Potentilla recta* (Aufrechtes Fingerkraut): August 1951 Hagen-Ambrock, Bahndamm a. d. Unterführung in Ambrock. K. Kühn, Hagen. — Im Volmetal zwischen Delstern und Oberhagen bei Hagen zahlreiche Exemplare. — Juli 1951 Goldbergkuppe bei Hagen, Nähe Bismarckturm, 2 Exemplare. W. Langhorst, Hagen.
- Coronilla varia* (Bunte Kronwicke): 1. 8. 50 an der Straße zwischen Rheine und Hörstel (Krs. Tecklenburg) eingeschleppt. H. Neidhardt, Dortmund. — Am rechten Volmeufer bei Hagen, Nähe Kalkwerk an der Flußböschung Bestand von mehreren qm. W. Langhorst, Hagen.
- Lathyrus tuberosus* (Erduß): 19. 6. 48 Bahnböschung am Volkspark südwestlich der Kampfbahn Rote Erde in Dortmund, zahlreich. — 22. 6. 49 am Massener Damm, Krs. Unna, Nähe der Bundesstr. 1, als Getreideunkraut. — 5. 8. 49 Mergelgrube bei Brandheide im Stadtkreis Castrop-Rauxel. H. Neidhardt, Dortmund. — 25. 7. 51 bei Dortmund-Reichsmark und Dortmund-Syburg. F. G. Schroeder, Dortmund-Kirchhörde. — Feldwege in der Hassleyer Feldflur bei Hagen bis Steinbruch mehrere kleine Bestände und Einzelexemplare 1951. W. Langhorst, Hagen.

- Andromeda polifolia* (Rosmarin-Heide): Seit 1936 Rixelteich und NSG Ramselteich bei Hövelriege. G. Pollkläsener, Hövelriege/Paderborn. — 28. 8. 51 Ahsener Fischteiche bei Haltern. H. Dahlhaus, Dortmund-Wellinghofen.
- Erica tetralix* (Glockenheide): 28. 8. 51 in der Brunsbecke bei Dahl/Volme. F. G. Schroeder, Dortmund-Kirchhörde.
- Gentiana ciliata* (Fransenezian): 17. 9. 50 Humphert bei Letmathe. F. G. Schroeder, Dortmund-Kirchhörde. September 1951 auf dem Höxberg bei Beckum sehr sparsam. W. Limpricht, Venne. — September 1951 in ziemlicher Menge auf dem Kleeberg bei Brochterbeck (Teutoburger Wald). H. Sakautzky, Gütersloh. — 1951 bei Wünnenberg, Krs. Büren. A. Schrader, Wünnenberg.
- Digitalis purpurea* (Roter Fingerhut): 1951 Wünnenberg, Krs. Büren. A. Schrader, Wünnenberg. — 1951 im Schützensteiner Busch in Herzeboholt. Natürlicher Standort. P. Heinrichs, Bocholt.
- Orobanchem minor* (Kleine Sommerwurz): 25. 7. 51 Klee-
feld an der Reichsmarkstraße bei Dortmund-Syburg. F. G. Schroeder, Dortmund-Kirchhörde. — 1951 auf einem Kleeacker bei Holthausen bei Hagen 8 Exemplare. — 1947 Kleeacker am Hölken bei Hagen 1 Exemplar (Bestätigung der von Pries 1916 in gleicher Gegend gemachten Funde). W. Langhorst, Hagen.
- Galium cruciatum* (Kreuzlabkraut): Mai 1949 Nacken bei Herdecke. H. Dahlhaus, Dortmund-Wellinghofen. — Am Hange des Kaisberges bei Hagen zu den Ruhrwiesen kleiner Bestand. W. Langhorst, Hagen. — 14. 7. 51 am Bahndamm zwischen Ascheberg und Capelle. F. G. Schroeder, Dortmund-Kirchhörde.
- Artemisia biennis* (Zweijähriger Beifuß): 21. 9. 50 mehrfach auf Schutt in Dortmund, wohl eingebürgert. Von Rektor Bierbrodt, Südkamen bei Hamm als Ackerunkraut beobachtet. H. Neidhardt, Dortmund.
- Arnica montana* (Wohlverleih): 1936 Truppenübungsplatz Senne auf einer Weide beim ehemaligen Forsthaus Taubenteich. G. Pollkläsener, Hövelriege/Paderborn. — 1951 an der Straße Sennelager — Lippspringe beim Albedyll-Turm. P. Graebner, Delbrück.